



HAL
open science

Génération de Données Synthétiques Corrélées

Juste Raimbault

► **To cite this version:**

Juste Raimbault. Génération de Données Synthétiques Corrélées. Rochebrune 2016, Journées d'Etude sur les Systèmes Complexes Naturels et Artificiels, Jan 2016, Mégève, France. halshs-01514415

HAL Id: halshs-01514415

<https://shs.hal.science/halshs-01514415v1>

Submitted on 26 Apr 2017

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Génération de Données Synthétiques Corrélées

Journées de Rochebrune 2016

JUSTE RAIMBAULT^{1,2}

¹ UMR CNRS 8504 Géographie-cités

² UMR-T IFSTTAR 9403 LVMT

L'utilisation de données synthétiques, au sens de populations statistiques d'individus générées aléatoirement sous la contrainte de reproduire certaines caractéristiques du système étudié, est une pratique méthodologique largement répandue dans de nombreuses disciplines, et particulièrement pour des problématiques liées aux systèmes complexes, telles que par exemple l'évaluation thérapeutique [Abadie et al., 2010], la géographie [Moeckel et al., 2003], ou l'apprentissage statistique [Bolón-Canedo et al., 2013]. Si le premier ordre est bien maîtrisé, il n'a à notre connaissance pas été proposé de méthode systématique permettant un contrôle au second ordre, c'est à dire où la structure de corrélation estimée sur les données générées est maîtrisée. Nous proposons une telle méthode ainsi que son application à deux exemples de systèmes complexes dans des domaines relativement éloignés.

Description générique de la méthode Soit un ensemble de processus stochastiques X_I (l'index pouvant être le temps ou l'espace par exemple). On se propose, à partir d'un jeu de réalisations $\mathbf{X} = (X_{i,j})$, de générer une population statistique $\tilde{\mathbf{X}} = \tilde{X}_{i,j}$ telle que d'une part un certain critère de proximité aux données est vérifié, i.e. étant donné une précision ε et un indicateur f , $\|f(\mathbf{X}) - f(\tilde{\mathbf{X}})\| < \varepsilon$, et d'autre part le niveau de corrélation est contrôlé, i.e. étant donné une matrice fixant une structure de covariance R , $\text{Var}[\tilde{X}_i] = R$, où la matrice de variance/covariance est estimée sur la population synthétique.

Application : séries temporelles financières Un premier domaine d'application proposé pour notre méthode est celui des séries temporelles financières, signaux typiques de systèmes complexes hétérogènes et multi-scalaires [Mantegna et al., 2000] et pour lesquels les corrélations ont fait l'objet d'abondants travaux (voir matrices aléatoires [Bouchaud and Potters, 2009], analyse de réseaux [Tumminello et al., 2005]).

Considérons un réseau d'actifs $(X_i(t))_{1 \leq i \leq N}$ échantillonnés à haute fréquence (typiquement 1s), vus comme la superposition de signaux à des multiples échelles temporelles : $X_i = \sum_{\omega} X_i^{\omega}$ sur lesquels est appliqué un modèle de prédiction de tendance à une échelle temporelle ω_0 donnée, représenté formellement comme un estimateur $M_{\omega_0} : (X_i) \mapsto \hat{X}_i$ dont l'objectif est la minimisation de l'erreur sur la tendance réelle $X_i^{\omega_0}$. Dans le cas d'estimateurs auto-regressifs multivariés, la performance dépendra entre autre des corrélations respectives entre actifs et on peut alors l'estimer en appliquant la méthode. On assume une dynamique de Black-Scholes pour les actifs : $dX = \sigma \cdot dW$ avec W processus de Wiener. Il est alors aisé de générer \tilde{X}_i tel que $\text{Var}[\tilde{X}_i^{\omega_0}] = \Sigma R$ (Σ variance estimée et R matrice de corrélation fixée), par la simulation de processus de Wiener au niveau de corrélation fixé et tel que $X_i^{\omega < \omega_0} = \tilde{X}_i^{\omega < \omega_0}$ (critère de proximité aux données : les composantes à plus basse fréquence sont identiques)¹. La méthode est testée sur un exemple de deux actifs du marché des devises (EUR/USD et EUR/GBP), sur la période de l'année 2014, permettant d'obtenir un bruit sur les corrélations finales négligeable. Le test sur une dimension plus grande doit encore être implémenté, ainsi que l'application à l'étude de la performance de modèle prédictif.

Application : données géographiques de densité et de réseaux En géographie, l'utilisation de données synthétiques est plutôt axée vers l'utilisation de population synthétiques au sein de modèles agents (mobilité, modèles *LUTI*) [Pritchard and Miller, 2009]. Il a récemment été proposé de contrôler systématiquement les effets de la configuration spatiale sur le comportement de modèles de simulation spatialisés [Cottineau et al., 2015b], méthodologie pouvant être interprétée comme un contrôle par données statistiques spatiales.

Dans notre cas, nous proposons de générer des systèmes de villes représentés par une densité spatiale de population $d(\vec{x})$ et la donnée d'un réseau de transport $n(\vec{x})$. L'utilisation d'un modèle D type aggrégation-diffusion [Batty, 2006] permet de générer une distribution discrete de densité. Le modèle est calibré pour des objectifs morphologiques M (entropie, hiérarchie, autocorrélation, densité) contre les valeurs calculées sur l'ensemble

¹si $W_1 \perp W_1^{\perp}$, alors $W_2 = \rho_{12}W_1 + \sqrt{1 - \rho_{12}^2}W_1^{\perp}$ est tel que $\rho(W_1, W_2) = \rho_{12}$. Les signaux suivants sont construits de la même manière par orthonormalisation de Gram. On isole alors la composante de la première fréquence $\omega_1 < \omega_0$ par filtrage, et on reconstruit les signaux synthétiques par $\tilde{X}_i = [\sum_{\omega < \omega_1} X_i^{\omega}] + \tilde{X}_i^{\omega_0}$

des grilles de taille 50km extraites de la grille européenne de densité [EUROSTAT, 2014]. D'autre part, on est capable de générer par un modèle N un réseau de transport planaire à une échelle équivalente, étant donné une distribution de densité. On distribue un nombre fixé de noeuds de manière aléatoire en suivant la loi de probabilité spatiale donnée par les valeurs de densité, puis un algorithme déterministe de connexion permet d'obtenir un réseau arborescent. Le réseau est ensuite étendu par la création de boucles locales dans un rayon de voisinage r_l ainsi que de raccourcis à une plus grande échelle r_g , aléatoirement selon un processus de rupture des potentiels gravitaires². A densité fixée, les premières explorations de l'espace des paramètres du modèle de réseau synthétique suggèrent une assez bonne flexibilité sur des indicateurs globaux G (diamètre, longueur cumulée, centralité moyenne, degré moyen). L'exploration systématique via le logiciel OpenMole [Reuillon et al., 2013] par calcul intensif est un travail en cours, ainsi que la calibration contre les mesures réelles calculées sur l'ensemble de l'Europe sur des zones identiques au modèle de densité, via les données de réseau routier d'OpenStreetMap. La connaissance très fine ainsi obtenue du comportement de N (distribution statistiques sur une grille fine de l'espace des paramètres à trois dimensions), devrait permettre, étant donné une population de configuration de densités \tilde{D} , de déterminer via $N^{<-1>}$ une population de réseau \tilde{N} telle que $\text{Cov}[M, G]$ a une structure fixée (via la détermination de la valeur des paramètres à utiliser pour chaque individu de \tilde{D}). On pourra éventuellement appliquer des algorithmes plus fins d'exploration pour atteindre des configurations exceptionnelles réalisant un niveau de corrélation voulu [Chérel et al., 2015]. Les indicateurs globaux devraient ainsi être corrélés à un niveau contrôlé, tandis que les densités et réseaux restent cohérents dans l'espace de par la forme du réseau, conditionnelle à la distribution de densité. Les applications géographiques potentielles de cette implémentation de la méthode incluent le contrôle statistique de l'effet des corrélations entre ville et réseaux sur des modèles de simulation spatiaux par exemple.

On a ainsi proposé une méthode abstraite de génération de données synthétiques corrélées à un niveau contrôlé. Son implémentation partielle dans deux domaines très différents montre sa flexibilité et l'éventail des applications potentielles. De manière générale, il est essentiel de généraliser de telles pratiques de validation systématique de modèles par étude statistique, en particulier pour les modèles agents pour lesquels la question de la validation reste encore relativement ouverte.

References

- [Abadie et al., 2010] Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490).
- [Batty, 2006] Batty, M. (2006). Hierarchy in cities and city systems. In *Hierarchy in natural and social sciences*, pages 143–168. Springer.
- [Bolón-Canedo et al., 2013] Bolón-Canedo, V., Sánchez-Marño, N., and Alonso-Betanzos, A. (2013). A review of feature selection methods on synthetic data. *Knowledge and information systems*, 34(3):483–519.
- [Bouchaud and Potters, 2009] Bouchaud, J. P. and Potters, M. (2009). Financial Applications of Random Matrix Theory: a short review. *ArXiv e-prints*.
- [Chérel et al., 2015] Chérel, G., Cottineau, C., and Reuillon, R. (2015). Beyond corroboration: Strengthening model validation by looking for unexpected patterns. *PLoS ONE*, 10(9):e0138212.
- [Cottineau et al., 2015a] Cottineau, C., Chapron, P., and Reuillon, R. (2015a). An incremental method for building and evaluating agent-based models of systems of cities.
- [Cottineau et al., 2015b] Cottineau, C., Le Néchet, F., Le Texier, M., and Reuillon, R. (2015b). Revisiting some geography classics with spatial simulation. In *Plurimondi. An International Forum for Research and Debate on Human Settlements*, volume 7.
- [EUROSTAT, 2014] EUROSTAT (2014). Eurostat geographical data.
- [Mantegna et al., 2000] Mantegna, R. N., Stanley, H. E., et al. (2000). *An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance*, volume 9. Cambridge university press Cambridge.
- [Moeckel et al., 2003] Moeckel, R., Spiekermann, K., and Wegener, M. (2003). Creating a synthetic population. In *Proceedings of the 8th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM)*.
- [Pritchard and Miller, 2009] Pritchard, D. R. and Miller, E. J. (2009). Advances in agent population synthesis and application in an integrated land use and transportation model. In *Transportation Research Board 88th Annual Meeting*, number 09-1686.
- [Reuillon et al., 2013] Reuillon, R., Leclaire, M., and Rey-Coyrehourcq, S. (2013). Openmole, a workflow engine specifically tailored for the distributed exploration of simulation models. *Future Generation Computer Systems*, 29(8):1981–1990.
- [Tero et al., 2006] Tero, A., Kobayashi, R., and Nakagaki, T. (2006). Physarum solver: a biologically inspired method of road-network navigation. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 363(1):115–119.
- [Tumminello et al., 2005] Tumminello, M., Aste, T., Di Matteo, T., and Mantegna, R. N. (2005). A tool for filtering information in complex systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102:10421–10426.

²Notons que ce choix est heuristique, et que d'autres types de modèles type réseau biologique auto-généré [Tero et al., 2006] par exemple pourraient également être envisagés, dans l'idée d'une architecture modulaire où le choix entre différentes implémentations d'une brique fonctionnelle peut être vue comme méta-paramètre [Cottineau et al., 2015a].