



HAL
open science

Mise en perspective des profils de répondants consommateurs d'une catégorie de substances selon qu'elles sont consommées hors ou en contexte sexuel.

Alain Al Léobon, Cloé Canivet, Eliane Ed Dussault, Evelyne Dussault

► To cite this version:

Alain Al Léobon, Cloé Canivet, Eliane Ed Dussault, Evelyne Dussault. Mise en perspective des profils de répondants consommateurs d'une catégorie de substances selon qu'elles sont consommées hors ou en contexte sexuel.: Rapport commandé au CNRS (UMR ESO) par l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies : " Exploitation secondaire des données du Net Gay Bi Trans Baromètre – édition 2018 ". [Rapport de recherche] Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 2019. halshs-02496245

HAL Id: halshs-02496245

<https://shs.hal.science/halshs-02496245>

Submitted on 4 Mar 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Mise en perspective des profils de répondants
consommateurs d'une catégorie de substances
selon qu'elles sont consommées hors ou en
contexte sexuel.

Rapport CNRS (UMR ESO) pour l'Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies : « Exploitation secondaire des données du Net Gay Bi Trans
Baromètre – édition 2018 »

Auteurs : Alain Léobon, chargé de recherche UMR ESO du CNRS, avec la contribution de
Cloé Canivet, Eliane Dussault et Evelyne Dussault, assistantes de recherche à l'UQÀM

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	1
La Santé des minorités sexuelles	1
Rappel : au sujet du Net Gay Bi Trans Baromètre 2018.....	1
Une enquête périodique sur les modes de vie et la santé des HSH.....	1
Les objectifs du Net Gay Bi Trans Baromètre	1
Le recrutement de l'édition française 2018.....	1
RESULTATS PRÉLIMINAIRES PRODUITS POUR LE 1 ^{er} Décembre.....	2
Profil sociodémographique	2
Profil sociosexuel.....	2
Pratiques sexuelles et réduction des risques.....	2
Santé sexuelle	2
Consommation d'alcool et de drogues.....	3
CONTEXTUALISATION	3
MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE POUR LE RAPPORT	3
TABLEAU 1 : mise en PERSPECTIVE de l'échantillon du rapport destiné à l'OFDT.....	4
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS.....	5
Tableau 1.1 : Profil sociodémographique et sociosexuel.....	5
Tableau 1.2 : Situation socioprofessionnelle	6
Tableau 1.3 : Situation familiale.....	7
Tableau 1.4: Type de ménage.....	7
Tableau 1.5 : Profil sociosexuel.....	8
Tableau 1.6 : Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social	9
Tableau 2.1 : Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet	9
Tableau 2.2 : Usage des applications de rencontre	9
Tableau 3.1 : Portrait des participants rapportant au moins un partenaire occasionnel masculin	10
Tableau 3.2 : Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels masculins.....	10
Tableau 3.3 : Statut sérologique des partenaires occasionnels masculins chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom	10
Tableau 3.4 : Participants ayant eu des partenaires occasionnelles féminines au cours des 12 derniers mois	11
Tableau 3.5 : Statut sérologique des partenaires occasionnelles féminines trans chez les répondants ayant eu au moins une relation sexuelle sans condom.....	11
Tableau 4.1 : Situation relationnelle.....	11
Tableau 4.2 : Statut sérologique du partenaire de couple testé	11
Tableau 4.3 : Statut VHC du partenaire de couple	12
Tableau 4.4 : Pénétration anale ou vaginale avec le partenaire de couple.....	12
Tableau 5 : Barebacking.....	12
Tableau 6.1 : Substances consommées.....	13
Tableau 6.2 : Injection de drogues.....	15
Tableau 6.3 : Partage d'instruments de consommation	15
Tableau 6.4 : Impact de la consommation	16
Tableau 7.1 a : Dépistage du VIH	16
Tableau 7.1 b : Interruptions et difficultés rencontrées avec le traitement.....	17
Tableau 7.2 : VHC, VPH et VHA	17
Tableau 7.3 : Autres ITSS au cours des 12 derniers mois	18
Tableau 7.4 : Stratégies de prévention des ITSS	19
Tableau 7.5 : Utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)	19
Tableau 8.1 : Santé globale : Votre moral.....	21
Tableau 8.2 : Discrimination et attitudes négatives.....	22
Tableau 8.3: Problèmes de santé physique	23
Tableau 8.4 : Difficultés psychologiques.....	24
Tableau 8.5 : Dépendances.....	25
RESULTATS	26
CONCLUSION.....	27

INTRODUCTION

La Santé des minorités sexuelles

Dans le cadre d'une convention avec le département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, Alain Léobon est responsable, à l'UMR ESO (Espaces et Sociétés) du Centre national de la recherche scientifique, de la thématique « santé des minorités sexuelles » et, pour cela, s'appuie, depuis 15 ans, sur la production d'enquêtes françaises et canadiennes « les Net Gay Baromètres ».

Ce travail amène une meilleure compréhension des modes de vie, de la sexualité, des problématiques de santé et du sentiment de discriminations des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes [et depuis peu des personnes trans] utilisant le réseau Internet à des fins de rencontres.

Ses travaux visent ainsi à démontrer que ces populations ont des besoins spécifiques en matière de santé, tant sur le plan de la santé physique ou mentale [dépression, anxiété, dépendances] que de la santé sexuelle [IST et VIH/SIDA] et qu'elles expérimentent différentes formes d'inégalités dans l'accès aux services de santé qu'Internet pourrait permettre d'atténuer.

Rappel : au sujet du Net Gay Bi Trans Baromètre 2018

Une enquête périodique sur les modes de vie et la santé des HSH

Le Net Gay Baromètre (NGB) est une étude périodique renouvelée tous les quatre ans depuis l'année 2004 sur les territoires français et canadiens. Avec plus de 8 sections, le NGB est l'une des enquêtes les plus exhaustives en ce qui a trait au mode de vie, à la sexualité et à la santé des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) en France et au Québec.

Le questionnaire aborde diverses thématiques, soit : 1) l'usage de la toile et des réseaux sociaux a) plus général (comprenant le dévoilement de l'orientation sexuelle) et b) à des fins de rencontres, 2) le développement ou maintien de relations sociales, affectives ou sexuelles avec des partenaires rencontrés (ou non) sur Internet, que ces partenaires soient a) de couple, b) occasionnels (féminins et/ou masculins) ou c) dans le cadre du travail du sexe, 3) le dévoilement de l'orientation sexuelle par rapport à l'entourage (famille, amis, collègues, médecin...), 4) les pratiques sexuelles et les comportements sexuels à risque développés rapportés (dont le « barebacking » et les relations dans le cadre du travail du sexe), 5) la consommation de substances psychoactives, 6) la santé physique et sexuelle, notamment par rapport a) aux tests de dépistage du VIH et VHC, le suivi et l'allègement des traitements, b) à la réduction des risques, la connaissance et l'appropriation de la prévention diversifiée et c) aux IST contractées dans les 12 derniers mois, 7) la santé psychologique, interpersonnelle et sociale, abordée notamment à travers a) l'image corporelle, b) la prise de risque dans la vie en général, c) les sentiments de discrimination ou perceptions d'attitudes négatives face à l'orientation sexuelle/au genre/au statut sérologique au VIH/aux origines ethnoculturelles, etc., le tout mesuré dans un cadre spatial et intersectoriel, d) les préoccupations questionnées par catégories et niveau d'intensité au regard de la santé physique, mentale, relationnelle ou sexuelle, ainsi que 8) le parcours médical et psychosocial lié au processus de transition des personnes trans qui peuvent compléter les éditions 2018-2019 du Baromètre.

Les objectifs du Net Gay Bi Trans Baromètre

L'édition 2018 de enquête s'adresse principalement aux HSH utilisant Internet à des fins sociales, affectives et/ou sexuelles, et a pour objectifs 1) D'amener une meilleure compréhension de leurs modes de vie, sexualités, problématiques de santé et sentiments de discrimination spécifiques, 2) De documenter l'évolution d'une édition à l'autre leur modes de vie, sexualités, problématiques de santé et sentiments de discrimination, 3) De dégager des pistes d'intervention adaptées à leurs besoins en matière de santé (physique, psychologique, sociale et sexuelle) pour les intervenants œuvrant dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA, du VHC et des toxicomanies (en particulier en termes de réduction des risques comportementaux et de prévention biomédicale), 4) Ultimement, de réduire les inégalités auxquelles font face ces communautés en matière d'accès aux différents services de santé (physique, psychologique, sociale et sexuelle).

Il est à noter que cette édition est en cours de révision pour se trouver plus inclusive au regard d'autres personnes de minorité sexuelle ou de genre,

Le recrutement de l'édition française 2018

Le recrutement des répondant(e)s s'appuie sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), sur les sites gays partenaires (essentiellement des sites de rencontres) dont la diversification permet de rendre compte des diverses cultures de sexe et, par ailleurs, sollicite la participation de médias ou d'organismes

GBTQ+ dans le but d'obtenir un échantillon de répondants où les orientations sexuelles ainsi que les identités de genre sont représentées. Les campagnes publicitaires sont proposées sous la forme de bannières et de messages sur les sites partenaires, alors que, pour le réseau social Facebook, elles passent par l'achat de campagnes (ciblées sur une liste d'intérêts définissant l'audience) basées sur le trafic, sur la conversion en actions (clics), ces campagnes se basant sur une ou plusieurs images, des diaporamas de petits clips vidéo. D'autres campagnes s'appuient sur l'animation de la page FB de l'étude et sont alors restreintes aux personnes qui aiment Le Net Gay Baromètre français et à leurs amis. Ces publicités se retrouvent placées en colonne de droite, dans le fil de discussion, sur Instagram, le support pouvant être limité aux ordinateurs de bureaux ou incluant les terminaux mobiles (tablettes, téléphones mobiles).

Ces campagnes mettent en avant les publications de la page et sont associées à des images ou des clips vidéo. La page FB est aimée par près de 8000 personnes qui la suivent. Depuis le 1^{er} Décembre 2018, la promotion de l'enquête est en pause dans l'attente de son actualisation visant à inclure en sus des HSH d'autres personnes appartenant à la diversité sexuelle et de genre. Cette version 2019 LGBTQ+ du Baromètre sera relancée en Juin 2019. Les données proposées dans ce document se basent sur 10.199 questionnaires complétés avec succès au 15 novembre 2018.

RESULTATS PRÉLIMINAIRES PRODUITS POUR LE 1^{er} Décembre

Des analyses préliminaires du NGB ont été réalisées pour le 1^{er} Décembre 2018 et portent sur 10.199 participants recrutés sur : 1) des réseaux sociaux (60 %), 2) de plusieurs sites gays de rencontres généralistes (22 %), 3) d'un site BDSM (15 %) et enfin 4) d'un site s'adressant à la culture de sexe bareback (3 %). Les 10 199 questionnaires remplis jusqu'à présent nous montrent que les participants ont en moyenne 38,8 ans, les hommes cisgenres (nés de sexe masculin et ayant un sentiment d'appartenance au genre masculin) représentant 96 % de l'échantillon. Les personnes trans et non binaires en représentent 3,7 %.

Profil sociodémographique

Les répondants sont 6,5 % à être nés à l'étranger (ailleurs qu'en France), 66,2 % ont complété des études universitaires, la moitié (50,2 %) ayant des revenus d'au moins 1 600 euros. Seuls 7,2 % sont sans emploi. Sur le plan de leur configuration relationnelle, la moitié (50,1 %) sont célibataires et 47 % demeurent seuls. Plus de trois quarts (77,4 %) se déclarent homosexuels, 17,2 % bisexuels et 71,5 % se disent solidaires à la cause LGBTQ+. La moitié (49,3 %) sont en couple avec un homme.

Profil sociosexuel

Leurs aventures avec des partenaires occasionnels masculins conduisent les participants à rapporter (en moyenne et pour les 12 derniers mois) 25 relations sexuelles (plans) pour 16 partenaires occasionnels masculins distincts dont 10 furent rencontrés en ligne. Les applications mobiles ou sites de type « responsive » sont des lieux privilégiés de recrutement de partenaires.

Pratiques sexuelles et réduction des risques

Lors de ces rencontres avec des partenaires occasionnels masculins, 41 % des participants pratiquent régulièrement des pénétrations anales (actives ou passives) non protégées par le préservatif. Cependant 60,6 % des répondants rapportent avoir développé (de parfois à toujours) des stratégies de réduction des risques au regard du VIH et des IST, les plus fréquemment rapportées étant l'utilisation de préservatifs et de lubrifiant (84 %) et le retrait avant l'éjaculation (52,5 %).

Les autres stratégies de réduction des risques (adaptation de l'usage du préservatif en fonction du type de partenaire, réduction du nombre de partenaires, sérotriage, consommation de substances à moindre risque, séropositionnement, considération de la charge virale, etc.) ont été adoptées par moins de la moitié de l'échantillon. Enfin, la PrEP (je suis ou mes partenaires « sont sous PrEP ») arrive en dernier, adoptée de parfois à toujours par 14 % des participants. Nous savons par ailleurs que 7,5 % des répondants utilisent la PrEP, dont plus de la moitié de façon continue.

Santé sexuelle

Sur le plan de la santé sexuelle, 24,3 % des participants ont déclaré contracter au moins une IST (excluant le VIH et l'hépatite C) dans les 12 derniers mois.

Si 55,9 % des répondants de l'échantillon reportent avoir fait un test de dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois, 16,1 % ne connaissent pas à ce jour, leur statut sérologique.

Parmi les personnes testées, 8,2 % d'entre elles se déclarent porteurs du VIH et 96,1 % d'entre eux reçoivent un traitement pour leur infection au VIH. Toujours dans ce groupe, 4,1 % déclarent une charge virale détectable. Si 43,1 % des participants ont fait un test de dépistage de l'hépatite C, parmi eux, 4,6 %

sont porteur du VHC. Enfin, 3,1 % des répondants de l'échantillon rapportent avoir eu recours à un traitement d'urgence de post-exposition.

Consommation d'alcool et de drogues

Si 32 % des répondants déclarent avoir consommé au moins une substance psychoactive, autre que l'alcool, plus d'un tiers d'entre eux rapportent avoir parfois ou souvent consommé plusieurs drogues à une même occasion. Au regard des précédentes éditions, le nombre de répondant ayant déclaré consommer au moins une substance autre que l'alcool est plus faible en 2018 du fait de l'introduction d'une question filtre (produisant un saut de section visant à optimiser la complétion de cette thématique). Cependant, une analyse comparée des deux bases de données (2013-2018) montre que, parmi ces répondants ayant consommé des substances psychoactives autres que l'alcool, la consommation a fortement augmenté sur l'ensemble des produits, la polyconsommation concernant plus du tiers de ces hommes, le quart ayant consommé en contexte sexuel de rarement à . Conséquemment à cette consommation, parmi ceux qui ont consulté un médecin en conséquence de cette consommation : 8,2 % des répondants de l'échantillon déclarent s'être infecté au VIH ou au VHC, 65,9 % rapportent avoir souffert de fragilité psychologique, 69,4 % de fatigue et 44,7 % ressentent une dépendance à certaines substances. Les tableaux 0.1 et 0.2 présentent cette mise en perspective entre les éditions 2013-18 par type de sites de recrutement (le recrutement identique).

CONTEXTUALISATION

L'OFDT nous demande de dresser un portrait des répondants ayant déclaré résider en France, avoir consommé aux moins 2 produits illicites (excluant les produits suivants : cannabis, viagra, poppers ou stéroïdes) au moins une fois par mois (ou une fois par semaine/tous les jours), en regardant sur quelles caractéristiques se distinguent en leur sein, ceux qui en consomment régulièrement en ou strictement hors contexte sexuel.

Avant d'aborder cette analyse, nous proposons TABLEAU 1 de mettre en perspective, sur une série de « variables clef », cet échantillon choisi par l'OFDT (Groupe 3, composé des 545 participants et sur lequel porte ce rapport) avec deux autres groupes : le Groupe 1 regroupant les répondants ne consommant pas de substances (autre que l'alcool). (N. = 6916), et le groupe 2 est constitué des participants ayant déjà consommé au moins une substance autre que l'alcool, à l'exclusion des participants qui composent le groupe 3 (N. = 2720).

Le tableau1 montre des différences significatives entre ces trois groupes sur ces variables clefs et que les répondants des groupes 2 et 3 se distinguent de ceux du groupe 1 par plus d'aventurismes, des prises de risques plus grandes au regard du VIH avec leurs partenaires occasionnels et par des indicateurs en santé sexuelle plus problématiques.

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE POUR LE RAPPORT

Les analyses proposées dans ce rapport ciblent de manière plus adéquate la question de la « consommation en contexte sexuel » et visent à dresser un portrait des répondants les plus impliqués dans cette pratique. Elles ont été menées à partir de la base de données extraite début novembre 2018 du Net Gay Bi Trans Baromètre, à travers l'utilisation du logiciel SPSS (v.25) et propose essentiellement des chis carrés et des test-t (indépendants samples).

L'échantillon sur lequel se basent les résultats suivants est composé de 545 participants masculins, qui résident en France et qui ont consommé aux moins 2 produits illicites (excluant les produits suivants : cannabis, viagra, poppers ou stéroïdes) au moins une fois par mois (ou une fois par semaine/tous les jours). Cet échantillon a ensuite été divisé en deux groupes soit : le groupe 1 (n1) qui est constitué des participants n'ayant pas pratiqué le CHEMSEX et le groupe 2 (n2) qui regroupe les participants ayant pratiqué le CHEMSEX (c.-à-d. utilisation de produits illicites en contexte sexuel).

Ces groupes ont été créés à partir des trois modalités suivantes : avoir consommé des produits illicites, 1) dans des soirées privées où le sexe se pratiquait, 2) dans des établissements privés où le sexe se pratiquait, ou 3) dans le cadre de chemparties où le SLAM (injection) se pratiquait.

Le groupe 1 (N = 266) est constitué des participants ayant répondu « jamais » ou « rarement » à chacune des trois modalités.

Le groupe 2 (N. = 279) est constitué des participants ayant répondu « parfois/souvent ou très souvent » à au moins UNE de ces modalités.

On notera que :

- La majorité des tableaux ci-dessous présente le nombre de participants (n) et le pourcentage (%) pour les deux groupes (non-chemsex et chemsex) sur diverses variables psychosexuelles (ex., pratiques sexuelles, santé sexuelle/psychologique, etc.).
- Quelques tableaux reflètent la moyenne de chaque groupe sur des variables continues (ex., âge, nombre de partenaires sexuels) ces analyses sont indiquées par un *.
- Une valeur de moins de 0,05 dans la colonne Sig indique une différence significative entre les groupes, **les différences significatives révélées par les analyses post-hoc (analyses des résidus) sont indiquées en gras** dans les tableaux.
- Dû au nombre de participants limité, il se peut que pour certaines variables un des niveaux de réponse (ex., jamais, toujours) soit manquant, le cas échéant ceci sera indiqué dans le tableau concerné par des « -- » dans les cellules. Ceci est dû au fait qu'il n'y avait aucun participant pour ce niveau de réponse et le logiciel a donc débouté l'analyse.

TABLEAU 1 : mise en PERSPECTIVE de l'échantillon du rapport destiné à l'OFDT

Caractéristiques	Groupe 1		Groupe 2		Groupe 3	
	n	%	n	%	n	%
	6916		2720		545	
Site web provenance						
Réseaux sociaux	3831	55,6	1915	71,0	364	67,0
Sites de rencontres	1746	25,4	393	14,6	54	9,9
Sites BDSM	1183	17,2	315	11,7	69	12,7
Sites bareback	126	1,8	75	2,8	56	10,3
Âge						
16 - 24 ans	1245	18,0	919	33,8	93	17,1
25 - 29 ans	2012	29,2	1025	37,7	225	41,4
40 - 59 ans	2796	40,5	661	24,3	201	37,0
60 ans et plus	845	12,2	112	4,1	24	4,4
Études universitaires						
Oui	5651	81,6	2396	88,0	476	87,3
Non	1274	18,4	326	12,0	69	12,7
Réside en région parisienne	1633	23,6	757	27,8	230	42,2
Membre d'une minorité visible	465	6,8	289	10,7	55	10,2
Orientation sexuelle						
Homosexuel	5259	75,9	2127	78,1	469	86,1
Bisexuel	1348	19,5	377	13,9	47	8,6
Hétérosexuel	29	0,4	11	0,4	2	0,4
Autre	289	4,2	207	7,6	27	5
Statut VIH						
Séronégatif, pense encore l'être	4884	85,0	1910	81,8	330	64,1
Séronégatif, plus certain	215	3,7	122	5,2	37	7,2
Séropositif	535	9,3	262	11,2	139	27,0
En attente	44	0,8	31	1,3	5	1,0
Ne veux pas savoir	45	0,8	8	0,3	3	0,6
Actuellement en couple	3401	49,1	1032	37,9	221	40,6
Fréquentation lieux LGBTI	3607	52,1	1661	61,0	423	77,6
Fréquentation de lieux de rencontres sexuels ^a	1994	28,8	871	32,0	305	56,0
Nombre de partenaires sexuels (moyennes des groupes)	6916	14,1	2720	18,3	545	37,7
Pratiques sexuelles marginales	2758	46,2	1186	48,1	388	74,3
Pénétrations anales non protégées par le préservatif avec un partenaire occasionnel	2579	56,4	1336	65,1	385	81,7
Pratique le barebacking	2997	43,3	1545	56,8	396	72,7
Échange du sexe contre de l'argent, drogue, service, etc.	659	9,5 %	356	13,1	108	19,8
A contracté une IST	1418	20,5	758	27,9	286	52,6

^a Saunas et sexe clubs ^b Gang-bang en tant que passif, urophilie, scatophilie, pratiques de fist fucking.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Les tableaux sont organisés par thèmes et suivent les sections de l'enquête NGbtB 2018, mais se limitent aux questions retenues par l'OFDT. Certaines sections de l'étude ne sont donc pas présentées.

Les analyses semblent dégager les spécificités du groupe 2 (Chemsexers) dont les caractéristiques dessinent un profil de vulnérabilité plus alarmant et des besoins qui devront être pris en compte dans les interventions.

Tableau 1.1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

* M = Moyenne, ET = Écart type

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Type de site de recrutement							
Réseaux sociaux	210	79,6	154	55,2	364	67,0	< ,001
Sites de rencontre généralistes	27	10,2	27	9,7	54	9,9	
Sites de rencontre BDSM	23	8,7	46	16,5	69	12,7	
Sites de rencontre bareback	4	1,5	52	18,6	56	10,3	
	n1	M(ET) n1	n2	M(ET) n2	F	t	Sig
Âge*							
Âge moyen des répondants	265	33,5	278	40,8	0,10	-7,27	< ,001
Catégories							
	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Âge							
16 à 24 ans	69	26,0	24	8,6	93	17,1	< ,001
25 à 29 ans	123	46,4	102	36,7	225	41,4	
40 à 59 ans	66	24,9	135	48,6	201	37,0	
60 ans et plus	7	2,6	17	6,1	24	4,4	
Lieu de résidence							
Habite en région parisienne	108	40,6%	122	43,7%	230	42,2%	,460
Identité de genre							
Homme cis	259	97,4	277	99,3	536	98,3	,080
Homme trans	7	2,6	3	1,1	10	1,8	,176

Tableau 1.2 : Situation socioprofessionnelle

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Scolarité (niveau complété le plus haut)							
Collège	9	3,4	3	1,1	12	2,2	,322
Lycée	7	2,6	9	3,2	16	2,9	
CAP ou BEP	19	7,1	22	7,9	41	7,5	
Baccalauréat	43	16,2	30	10,8	73	13,4	
1er cycle universitaire / BTS	50	18,8	53	19,0	103	18,9	
2ème cycle universitaire / équivalent	64	24,1	79	28,3	143	26,2	
3ème cycle universitaire ou Grandes écoles	72	27,1	82	29,4	154	28,3	
Autre	2	0,8	1	0,4	3	0,6	
Études universitaires	186	70	214	76,7	400	73,4	
Revenu mensuel net							
Moins de 600€	39	14,7	17	6,1	56	10,3	< ,001
De 600€ à 999€	26	9,8	18	6,5	44	8,1	
De 1.000€ à 1599€	70	26,3	64	22,9	134	24,6	
De 1600€ à 2999€	89	33,5	91	32,6	180	33,0	
De 3000€ à 4999€	29	13	57	32	86	15,8	
Plus de 5000€	13	4,9	32	11,5	45	8,3	
Revenu mensuel fort (au moins 1600€)	131	51,4	180	76,1	311	57,1	
Situation professionnelle							
Retraite	4	1,5	7	2,5	11	2	,001
Études à temps partiel	6	2,3	2	0,7	8	1,5	
Études à temps plein	52	19,5	20	7,2	72	13,2	
Travail salarié à temps partiel	28	10,5	28	10,0	56	10,3	
Travail salarié à temps plein	113	42,5	160	57,3	273	50,1	
Chef d'entreprise / indépendant	21	7,9	25	9,0	46	8,4	
Sans emploi	24	9,0	22	7,9	46	8,4	
Congé de maladie	3	1,1	3	1,1	6	1,1	
Autre	15	5,6	12	4,3	27	5,0	
Sources de revenus							
Emploi à temps plein	148	55,6	198	71,0	346	63,5	< ,001
Emploi à temps partiel	57	21,4	36	12,9	93	17,1	,008
Prêt étudiant / bourse d'études	29	10,9	6	2,2	35	6,4	,000
Assurance emploi	23	8,6	20	7,2	43	7,9	,522
Prestation d'incapacité / invalidité	4	1,5	10	3,6	14	2,6	,125
Revenu de retraite	6	2,3	5	1,8	11	2,0	,701
Soutien d'un proche	57	21,4	32	11,5	89	16,3	,002
Travail du sexe	16	6,0	15	5,4	31	5,7	,748
Source de revenu non déclarée	20	7,5	12	4,3	32	5,9	,110
Source de revenu illégal	9	3,4	7	2,5	16	2,9	,545
Mendicité	1	0,4	0	0,0	1	0,2	,305
Autre	10	3,8	9	3,2	19	3,5	,734

Tableau 1.3 : Situation familiale

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
État matrimonial actuel							
Célibataire	153	57,5	153	54,8	306	56,1	,006
En relation de couple	82	30,8	65	23,3	147	27,0	
Pacsé	11	4,1	20	7,2	31	5,7	
Marié	9	3,4	30	10,8	39	7,2	
Séparé	2	0,8	4	1,4	6	1,1	
Divorcé	5	1,9	1	0,4	6	1,1	
Veuf	3	1,1	3	1,1	6	1,1	
Autre	1	0,4	3	1,1	4	0,7	
Genre partenaire actuel							
Homme	96	92,3	105	90,5	201	91,4	,615
Femme	8	7,7	10	8,6	18	8,2	
Homme trans	0	0,0	1	0,9	1	0,5	
Enfants							
Non	257	96,6	258	92,5	515	94,5	,105
Oui, à la maison	4	1,5	9	3,2	13	2,4	
Oui, ailleurs qu'à la maison	5	1,9	12	4,3	17	3,1	
Enfants d'une relation précédente ou antérieure							
Oui	6	46,2	18	81,8	24	68,6	,028
Non, adoptés	0	0,0	2	9,1	2	5,7	
Non, il s'agit des enfants de mon conjoint	3	23,1	1	4,5	4	11,4	

Tableau 1.4: Type de ménage

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Type de ménage ou habitation principale							
Seul	127	47,7	149	53,4	276	50,6	,186
En couple	56	21,1	86	30,8	142	26,1	,009
Amis / colocation	45	16,9	24	8,6	69	12,7	,004
Père et/ou mère	40	15,0	21	7,5	61	11,2	,005
Autre membre de la famille	7	2,6	1	0,4	8	1,5	,027
Centre d'accueil / d'hébergement	2	0,8	2	0,7	4	0,7	,962
Sans domicile fixe	3	1,1	2	0,7	5	0,9	,615
Autre	3	1,1	2	0,7	5	0,9	,615
Ce contexte de vie est:							
Désiré / choisi	163	61,5	187	67,0	350	64,3	,545
Circonstancier	70	26,4	60	21,5	130	23,9	
Imposé	7	2,6	7	2,5	14	2,6	
Subi	24	9,1	25	9,0	49	9,0	
Circonstancier	1	0,4	0	0,0	1	0,2	

Tableau 1.5 : Profil sociosexuel

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 +n2	Sig
Attrirance et désirs sexuels							
Exclusivement par les hommes	185	69,5	216	77,4	401	73,6	,003
Surtout par les hommes	54	20,3	54	19,4	108	19,8	
Autant par les hommes que par les femmes	20	7,5	6	2,2	26	4,8	
Surtout par les femmes	6	2,3	0	0,0	6	1,1	
Exclusivement par les femmes	1	0,4	1	0,4	2	0,4	
En questionnement	0	0,0	2	0,7	2	0,4	
Orientation sexuelle							
Homosexuelle	217	81,6	252	90,3	469	86,1	,011
Bisexual	32	81,6	15	90,3	47	8,6	
Hétérosexuel	1	0,4	1	0,4	2	0,4	
Queer, pansexuel, allosexuel ou en fluctuation	8	3,0	8	2,9	16	2,9	
Incertain / en questionnement	3	1,1	1	0,4	4	0,7	
Préfère ne pas répondre	0	0	2	0,7	2	0,4	
Autre	5	1,9	0	0	5	0,9	
Comportements sexuels							
Exclusivement avec les hommes	212	79,7	245	87,8	457	83,9	,025
Surtout avec les hommes	29	10,9	25	9,0	54	9,9	
Autant avec les hommes que avec les femmes	17	6,4	8	2,9	25	4,6	
Surtout avec les femmes	7	2,6	1	0,4	8	1,5	
Exclusivement avec les femmes	--	--	--	--	--	--	
En questionnement	1	0,4	0	0,0	1	0,2	
Attrirance sexuelle pour les trans							
Aucune	196	73,7	202	72,4	398	73,0	,736
Oui, pour les hommes trans	41	15,4	38	13,6	79	14,5	,552
Oui, pour les femmes trans	19	7,1	17	6,1	36	6,6	,622
En questionnement	29	10,9	40	14,3	69	12,7	,228
Comportements sexuels avec les trans							
Aucun	241	90,6	237	84,9	478	87,7	,044
Oui, avec hommes trans	21	7,9	23	8,2	44	8,1	,881
Oui, avec femmes trans	10	3,8	20	7,2	30	5,5	,081
En questionnement	0	0,0	6	2,2	6	1,1	,016

Tableau 1.6 : Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gaie							
Oui	137	51,5	158	56,6	295	54,1	,486
Non	92	34,6	86	30,8	178	32,7	
Ne sait pas	37	13,9	35	12,5	72	13,2	
Solidaire à la communauté	217	81,6	217	77,8	434	79,6	,271

Détails sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gaie							
Impliqué dans la communauté	80	30,1	59	21,1	139	25,5	,017
Participer aux activités est positif	73	27,4	73	26,2	146	26,8	,736
Faire partie de la communauté est important pour mon identité	79	29,7	73	26,2	152	27,9	,358
Aucune de ces propositions me concernent	39	14,7	43	15,4	82	15,0	,806
Connaissance des relations sexuelles et affectives avec des hommes par l'entourage							
Un ou plusieurs parents	203	76,3	224	80,3	427	78,3	,261
Frères et sœurs	188	70,7	212	76,0	400	73,4	,161
Plupart des amis hétérosexuels	231	86,8	234	83,9	465	85,3	,327
Collègues au travail	171	64,3	184	65,9	355	65,1	,684
Médecin	166	62,4	222	79,6	388	71,2	<,001

Tableau 2.1 : Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet

	n1	M(ET) n1	n2	M(ET) n2	F	t	Sig
Moyenne d'heures d'utilisation: sexuel *	248	6,7	267	10,8	7,20	-3,73	<,001

*M= Moyenne, ET = Écart type

Tableau 2.2 : Usage des applications de rencontre

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Avoir un compte sur les applications de rencontre	210	78,9	232	83,2	442	81,1	,210
Fréquence d'utilisation des applications de rencontre							
Plusieurs fois par jour	61	28,9	104	44,8	165	37,2	<,001
Plusieurs fois par semaine	78	37,0	84	36,2	162	36,6	
Plusieurs fois par mois	35	16,6	31	13,4	66	14,9	
Moins d'une fois par mois / de manière irrégulière	37	17,5	13	5,6	50	11,3	

Tableau 3.1 : Portrait des participants rapportant au moins un partenaire occasionnel masculin

	n1	M(ET) n1	n2	M(ET) n2	F	t	Sig
Nombre de relations sexuelles avec partenaires occasionnels masculins *	266	38,6(73,5)	279	90,1(297,6)	6,02	-2,80	,005
Nombre de partenaires occasionnels masculins *	266	21,7(43,2)	279	52,9 (62,1)	31,33	-6,81	< ,001
Nombre de partenaires occasionnels masculins rencontrés en ligne *	266	16,1 (30,2)	279	36,2 (46,1)	34,02	-6,06	< ,001
Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 +n2	Sig
Nombre de partenaires occasionnels masculins rencontrés via applications mobiles							
Aucun	72	27,1	38	13,6	110	20,2	,001
Quelques-uns	41	15,4	50	17,9	91	16,7	
Un grand nombre	35	13,2	56	20,1	91	16,7	
La majorité	117	44,0	135	48,4	252	46,2	

*M = moyenne, ET= Écart type

Tableau 3.2 : Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels masculins

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Refuser du sexe anal en raison du statut sérologique							
Jamais	46	18,9	30	10,8	76	14,6	< ,001
Rarement	160	65,6	228	82,0	388	74,3	
Parfois	38	15,6	20	7,2	58	11,1	
Pénétration anale avec partenaires occasionnels							
Oui	204	83,6	267	96,0	471	90,2	< ,001
Non	40	16,4	11	4,0	51	9,8	
Pénétration anale sans condom avec partenaires occasionnels							
Jamais	70	34,3	16	6,0	86	18,2	< ,001
Rarement	40	19,6	24	9,0	64	13,6	
Parfois	45	22,1	52	19,4	97	20,6	
Souvent	35	17,2	111	41,4	146	30,9	
Toujours	13	6,4	65	24,3	78	16,5	

Tableau 3.3 : Statut sérologique des partenaires occasionnels masculins chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Partenaire de statut sérologique incertain / inconnu							
Régulièrement	15	11,3	46	18,3	61	15,9	< ,001
Occasionnellement	42	31,6	78	31,1	120	31,3	
Jamais	45	33,8	41	16,3	86	22,4	
Ne sait pas	31	23,3	86	34,3	117	30,5	

Tableau 3.4 : Participants ayant eu des partenaires occasionnelles féminines au cours des 12 derniers mois

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Sexe anal et/ou vaginal sans condom avec partenaires cis							
Jamais	9	29,0	3	21,4	12	26,7	,704
Rarement	6	19,4	1	7,1	7	15,6	
Parfois	6	19,4	4	28,6	10	22,2	
Souvent	6	19,4	2	14,3	8	17,8	
Toujours	3	9,7	3	21,4	6	13,3	
Sexe anal et/ou vaginal avec partenaires trans							
Jamais	6	75,0	5	38,5	11	52,4	,361
Rarement	0	0,0	2	15,4	2	9,5	
Parfois	--	--	--	--	--	--	
Souvent	2	25,0	3	23,1	5	23,8	
Toujours	0	0,0	2	15,4	2	9,5	

Tableau 3.5 : Statut sérologique des partenaires occasionnelles féminines trans chez les répondants ayant eu au moins une relation sexuelle sans condom

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Partenaire trans de statut sérologique incertain / inconnu							
Régulièrement	--	--	--	--	--	--	,013
Occasionnellement	2	9,5	1	8,3	3	9,1	
Jamais	14	66,7	2	16,7	16	48,5	
Je ne sais pas	5	23,8	9	75,0	14	42,4	

Tableau 4.1 : Situation relationnelle

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Durée de la relation							
Plus d'un an	80	56,7	93	72,1	173	64,1	,036
Plusieurs mois	49	34,8	26	20,2	75	27,8	
Plusieurs semaines	11	7,8	10	7,8	21	7,8	
Situation actuelle							
La relation de couple dure encore	95	67,4	93	72,1	188	69,6	,475

Tableau 4.2 : Statut sérologique du partenaire de couple testé

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Statut sérologique du partenaire de couple (selon test)							
Séronégatif	99	88,4	75	68,2	174	78,4	<,001
Séropositif	11	9,8	35	31,8	46	20,7	
Ne sait pas	2	1,8	0	0,0	2	0,9	

Tableau 4.3 : Statut VHC du partenaire de couple

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Statut du VHC du partenaire de couple							
Séronégatif	116	82,9	111	86,0	227	84,4	,302
N'est plus certain d'être séronégatif	0	0,0	2	1,6	2	0,7	
Séropositif	1	0,7	1	0,8	2	0,7	
Ne sait pas	23	16,4	14	10,9	37	13,8	

Tableau 4.4 : Pénétration anale ou vaginale avec le partenaire de couple

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Pénétration anale / vaginale avec partenaire de couple	122	87,1	103	80,5	225	84,0	,137
Pénétration anale / vaginale sans condom avec partenaire de couple							
Jamais	16	13,2	7	6,8	23	10,3	,501
Rarement	6	5,0	6	5,8	12	5,4	
Parfois	6	5,0	7	6,8	13	5,8	
Souvent	6	5,0	8	7,8	14	6,3	
Très souvent	87	71,9	75	72,8	162	72,3	

Tableau 5 : Barebacking

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Relation anale intentionnellement sans condom	150	56,4	246	88,2	396	72,7	< ,001
En association avec la consommation de substances							
Jamais	19	23,8	8	4,1	27	9,7	< ,001
Rarement	14	17,5	10	5,1	24	8,7	
Parfois	30	37,5	51	24,9	81	29,2	
Souvent	7	8,8	95	48,2	102	36,8	
Toujours	7	8,8	30	15,2	37	13,4	
Non-concerné	3	3,8	3	1,5	6	2,2	
Dans le cadre d'un slam party							
Jamais	50	62,5	80	40,6	130	46,9	< ,001
Rarement	4	5,0	29	14,7	33	11,9	
Parfois	2	2,5	32	16,2	34	12,3	
Souvent	0	0,0	26	13,2	26	9,4	
Toujours	0	0,0	10	5,1	10	3,6	
Non-concerné	24	30,0	20	10,2	44	15,9	
Dans le cadre d'une tournante où le répondant était le passif							
Jamais	58	72,5	94	47,7	152	54,9	,003
Rarement	7	8,8	28	14,2	35	12,6	
Parfois	3	3,8	29	14,7	32	11,6	
Souvent	3	3,8	22	11,2	25	9,0	
Toujours	1	1,3	7	3,6	8	2,9	
Non-concerné	8	10,0	17	8,6	25	9,0	

Tableau 6.1 : Substances consommées

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Alcool 5 verres d'alcool ou plus							
Jamais	30	11,3	43	15,4	73	13,4	<,001
Moins d'une fois par mois	26	9,8	60	21,5	86	15,8	
Une fois par mois	38	14,3	53	19,0	91	16,7	
Une fois par semaine	68	25,6	62	22,2	130	23,9	
Plusieurs fois par semaine	86	32,3	54	19,4	140	25,7	
Tous les jours ou presque	18	6,8	7	2,5	25	4,6	
Cannabis							
Jamais	64	24,1	67	24,0	131	24,0	,154
1 ou 2 fois	28	14,3	63	22,6	101	18,5	
Plus de 2 fois	48	18,0	40	14,3	88	16,1	
Au moins une fois par mois	40	15,0	45	16,1	85	15,6	
Au moins une fois par semaine	32	12,0	28	10,0	60	11,0	
Tous les jours	44	16,5	36	12,9	80	14,7	
Poppers							
Jamais	41	15,4	16	5,7	57	10,5	<,001
1 ou 2 fois	31	11,7	14	5,0	45	8,3	
Plus de 2 fois	59	22,2	30	10,8	89	16,3	
Au moins une fois par mois	84	31,6	90	32,3	174	31,9	
Au moins une fois par semaine	45	16,9	118	42,3	163	29,9	
Tous les jours	6	2,3	11	3,9	17	3,1	
Ecstasy							
Jamais	110	41,4	126	45,2	236	43,3	,001
1 ou 2 fois	22	8,3	47	16,8	69	12,7	
Plus de 2 fois	44	16,5	32	11,5	76	13,9	
Au moins une fois par mois	74	27,8	60	21,5	134	24,6	
Au moins une fois par semaine	8	3,0	13	4,7	21	3,9	
Tous les jours	8	3,0	1	0,4	9	1,7	
Cocaïne							
Jamais	83	31,2	80	28,7	163	29,9	,042
1 ou 2 fois	29	10,9	51	18,3	80	14,7	
Plus de 2 fois	36	13,5	51	18,3	87	16,0	
Au moins une fois par mois	85	32,0	70	25,1	155	28,4	
Au moins une fois par semaine	26	9,8	24	8,6	50	9,2	
Tous les jours	7	2,6	3	1,1	10	1,8	
Crack							
Jamais	244	91,7	254	91,4	498	91,5	,332
1 ou 2 fois	9	3,4	10	3,6	19	3,5	
Plus de 2 fois	2	0,8	7	2,5	9	1,7	
Au moins une fois par mois	2	0,8	3	1,1	5	0,9	
Au moins une fois par semaine	2	0,8	2	0,7	4	0,7	
Tous les jours	7	2,6	2	0,7	9	0,7	
Speed / amphétamines							
Jamais	164	61,7	172	61,6	336	61,7	,021
1 ou 2 fois	40	15,0	34	12,2	74	13,6	
Plus de 2 fois	31	11,7	33	11,8	64	11,7	
Au moins une fois par mois	17	6,4	32	11,5	49	9,0	
Au moins une fois par semaine	6	2,3	8	2,9	14	2,6	
Tous les jours	8	3,0	0	0,0	8	1,5	

MDMA							
Jamais	121	45,5	97	34,9	218	40,1	,001
1 ou 2 fois	34	12,8	64	23,0	98	18,0	
Plus de 2 fois	53	19,9	50	18,0	103	18,9	
Au moins une fois par mois	43	16,2	58	20,9	101	18,6	
Au moins une fois par semaine	8	3,0	9	3,2	17	3,1	
Tous les jours	7	2,6	0	0,0	7	1,3	
Crystal meth							
Jamais	247	92,9	191	68,7	438	80,5	<,001
1 ou 2 fois	8	3,0	40	14,4	48	8,8	
Plus de 2 fois	1	0,4	21	7,6	22	4,0	
Au moins une fois par mois	3	1,1	20	7,2	23	4,2	
Au moins une fois par semaine	0	0,0	6	2,2	6	1,1	
Tous les jours	7	2,6	0	0,0	7	1,3	
GHB							
Jamais	201	75,8	88	31,5	289	53,1	<,001
1 ou 2 fois	21	7,9	53	19,0	74	13,6	
Plus de 2 fois	19	7,2	43	15,4	62	11,4	
Au moins une fois par mois	16	6,0	70	25,1	86	15,8	
Au moins une fois par semaine	1	0,4	24	8,6	25	4,6	
Tous les jours	7	2,6	1	0,4	8	1,5	
Kétamine							
Jamais	198	74,4	185	66,3	383	70,3	,004
1 ou 2 fois	34	12,8	48	17,2	82	15,0	
Plus de 2 fois	9	3,4	24	8,6	33	6,1	
Au moins une fois par mois	17	6,4	15	5,4	32	5,9	
Au moins une fois par semaine	1	0,4	6	2,2	7	1,3	
Tous les jours	7	2,6	1	0,4	8	1,5	
Héroïne							
Jamais	251	94,4	257	92,1	508	93,2	,045
1 ou 2 fois	1	0,4	6	2,2	7	1,3	
Plus de 2 fois	1	0,4	6	2,2	7	1,3	
Au moins une fois par mois	4	1,5	7	2,5	11	2,0	
Au moins une fois par semaine	1	0,4	1	0,4	2	0,4	
Tous les jours	8	3,0	2	0,7	10	1,8	
Viagra							
Jamais	205	77,1	106	38,0	311	57,1	<,001
1 ou 2 fois	17	6,4	37	13,3	54	9,9	
Plus de 2 fois	21	7,9	42	15,1	63	11,6	
Au moins une fois par mois	11	4,1	62	22,2	73	13,4	
Au moins une fois par semaine	3	1,1	29	10,4	32	5,9	
Tous les jours	9	3,4	3	1,1	12	2,2	
Médicaments psychotropes							
Jamais	156	58,6	221	79,2	377	69,2	<,001
1 ou 2 fois	9	3,4	6	2,2	15	2,8	
Plus de 2 fois	14	5,3	11	3,9	25	4,6	
Au moins une fois par mois	27	10,2	19	6,8	46	8,4	
Au moins une fois par semaine	20	7,5	13	4,7	33	6,1	
Tous les jours	40	15,0	9	3,2	49	9,0	
Cathinones							
Jamais	210	78,9	74	26,5	284	52,1	

1 ou 2 fois	17	6,4	18	6,5	35	6,4	<,001
Plus de 2 fois	13	4,9	28	10,0	41	7,5	
Au moins une fois par mois	12	4,5	111	39,8	123	22,6	
Au moins une fois par semaine	7	2,6	46	16,5	53	9,7	
Tous les jours	7	2,6	2	0,7	9	1,7	
Stéroïdes anabolisants							
Jamais	251	94,4	272	97,5	523	96,0	,137
1 ou 2 fois	0	0,0	1	0,4	1	0,2	
Plus de 2 fois	2	0,8	1	0,4	3	0,6	
Au moins une fois par mois	4	1,5	4	1,4	8	1,5	
Au moins une fois par semaine	2	0,8	0	0,0	2	0,4	
Tous les jours	7	2,6	1	0,4	8	1,5	
Autre							
Jamais	39	68,4	34	75,6	73	71,6	,054
1 ou 2 fois	6	10,5	2	4,4	8	7,8	
Plus de 2 fois	11	19,3	3	6,7	14	13,7	
Au moins une fois par mois	1	1,8	5	11,1	6	5,9	
Au moins une fois par semaine	0	0,0	1	2,2	1	1,0	
Tous les jours	--	--	--	--	--	--	
Polyconsommation							
Jamais	75	28,2	55	19,7	130	23,9	,001
Oui, parfois	132	49,6	123	44,1	255	46,8	
Oui, souvent	50	18,8	94	33,7	144	26,4	
Non concerné	9	3,4	7	2,5	16	2,9	

Tableau 6.2 : Injection de drogues

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Certaines de ces substances ont été injectées	13	4,9	71	25,4	84	15,4	<,001
Façon dont la substance a été injectée							
Moi-même	10	71,4	47	66,2	57	67,1	,482
Une autre personne	4	28,6	45	63,4	49	57,6	,020
Autre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	,835
Lieux où la consommation substance a eu lieu							
Sexe parties	4	30,8	55	76,4	59	69,4	,002
Plans à 2	3	23,1	57	79,2	60	70,6	<,001
Visite de sites porn ou de cams	1	7,7	11	15,3	12	14,1	,415
Autre contexte	6	46,2	4	5,6	10	11,8	,001

Tableau 6.3 : Partage d'instruments de consommation

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Partage de paille ou de pipe	97	36,5	116	41,6	213	39,1	,222
Partage de seringue	1	0,4	11	3,9	12	2,2	,006
Partage de produit à partir de la même seringue	2	0,8	13	4,7	15	2,8	,007
Partage de petit matériel	4	1,5	35	12,5	39	7,2	<,001

Tableau 6.4 : Impact de la consommation

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Effets de la consommation							
A favorisé son épanouissement personnel ou élargi sa sociabilité	135	50,8	111	39,8	246	45,1	,010
A permis d'améliorer ses performances sexuelles	52	19,5	162	58,1	214	39,3	<,001
A augmenté sa confiance et sa performance à l'école ou aux études	25	9,4	30	10,8	55	10,1	,600
A diminué sa confiance et sa performance à l'école ou au travail	54	20,3	49	17,6	103	18,9	,414
A eu un impact négatif sur la réalisation de ses tâches quotidiennes	82	30,8	73	26,2	155	28,4	,228
A eu un impact négatif sur ses relations interpersonnelles	53	19,9	65	23,3	118	21,7	,339
A causé des problèmes avec la justice	8	3,0	10	3,6	18	3,3	,706
A causé des problèmes financiers	44	16,5	56	20,1	100	18,3	,287
A renforcé/maintenu une sexualité compulsive	53	19,9	128	45,9	181	33,2	<,001
A causé une forte sensation de dépendance	42	15,8	57	20,4	99	18,2	,160
... des problèmes de santé imposant de consulter	18	6,8	27	9,7	45	8,3	,217

Tableau 7.1 a : Dépistage du VIH

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Dépistage(s) VIH							
Oui, au cours de l'année	181	68,0	194	69,5	375	68,8	,354
Oui, il y a plus d'un an	66	24,8	73	26,2	139	25,5	
Non, jamais	19	7,1	12	4,3	31	5,7	
Traitement d'urgence TPE							
Oui, suite à un risque de contamination	17	6,4	15	5,4	32	5,9	<,001
Oui, comme PrEP	8	3,0	19	6,8	27	5,0	
Non, pas de situations à risque	136	51,1	78	28,0	214	38,3	
Non, mais situation à risque	61	22,9	52	18,6	113	20,7	
Non concerné	44	16,5	115	41,2	159	29,2	
Statut du VIH							
Séronégatif, pense encore l'être	193	78,1	137	51,1	330	64,1	<,001
Séronégatif, plus certain de l'être	18	7,3	19	7,1	37	7,1	
Séropositif	29	11,7	110	41,0	139	27,0	
En attente de résultats	4	1,6	1	0,4	5	1,0	
N'a pas souhaité savoir	3	1,2	0	0,0	3	0,6	
Traitement pour l'infection au VIH	28	93,3	103	93,6	131	93,6	,192

Tableau 7.1 b : Interruptions et difficultés rencontrées avec le traitement

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Difficultés rencontrées pour prendre le traitement	3	10,7	9	8,7	12	9,2	,748
Raisons pour ces difficultés rencontrées							
Je dois me cacher	1	33,3	1	11,1	2	16,7	,371
Je ressens des effets indésirables qui me gênent	2	66,7	2	22,2	4	33,3	,236
J'oublie de les prendre	1	33,3	8	88,9	9	75,0	,127
J'en ai marre de les prendre	0	0,0	5	55,6	5	41,7	,159

Tableau 7.2 : VHC, VPH et VHA

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Dépistage VHC							
Oui, au cours des 12 derniers mois	148	55,6	200	71,7	348	63,9	<,001
Oui, avant	57	21,4	53	19,0	110	20,2	
Non, jamais	35	13,2	15	5,4	50	9,2	
Ne sait pas	26	9,8	11	3,9	37	6,8	
A déjà eu un diagnostic positif au VHC							
Positif	6	2,9	40	15,8	46	10,0	<,001
Négatif	193	94,1	206	81,4	399	87,1	
Ne sait pas	6	2,9	7	2,8	13	2,8	
Statut actuel du VPH							
Positif	1	16,7	6	14,6	7	14,9	,875
Négatif suite à un traitement	4	66,7	26	63,4	30	63,8	
Négatif sans avoir suivi de traitement	1	16,7	5	12,2	6	12,8	
Ne sait pas	0	0,0	4	9,8	4	8,5	
Nombre de fois que vous avez contracté le VPH							
Jamais	0	0,0	4	10,0	4	8,7	,619
Une fois	4	66,7	29	72,5	33	71,7	
2 fois	2	33,3	6	15,0	8	17,4	
Plus de 3 fois	0	0,0	1	2,5	1	2,2	
Vaccin contre l'hépatite A							
Oui	110	41,5	158	56,6	268	49,3	<,001
Non, mais a les anticorps suite une infection	14	5,3	49	17,6	63	11,6	
Non	64	24,2	44	15,8	108	19,9	
Ne sait pas	77	29,1	28	10,0	105	19,3	

Tableau 7.3 : Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	
Syphilis							
Non	244	91,7	181	64,9	425	78,0	<,001
1 fois	18	6,8	82	29,4	100	18,3	
2 à 3 fois	2	0,8	12	4,3	14	2,6	
3 fois	2	0,8	4	1,4	6	1,1	
Gonococcie rectale							
Non	241	90,9	228	81,7	469	86,2	,015
1 fois	20	7,5	40	14,3	60	11,0	
2 à 3 fois	3	1,1	10	3,6	13	2,4	
3 fois	1	0,4	1	0,4	2	0,4	
Gonococcie							
Non	228	86,0	190	68,1	418	76,8	<,001
1 fois	31	11,7	57	20,4	88	16,2	
2 à 3 fois	3	1,1	26	9,3	29	5,3	
3 fois	3	1,1	6	2,2	9	1,7	
LGV							
Non	263	99,2	272	97,5	535	98,3	,141
1 fois	1	0,4	5	1,8	6	1,1	
2 à 3 fois	0	0,0	2	0,7	2	0,4	
3 fois	1	0,4	0	0,0	1	0,2	
Chlamydia							
Non	235	88,7	192	68,8	427	78,5	<,001
1 fois	27	10,2	55	19,7	82	15,1	
2 à 3 fois	2	0,8	29	10,4	31	5,7	
3 fois	1	0,4	3	1,1	4	0,7	
Herpès							
Non	257	97,0	256	91,8	513	94,3	,009
1 fois	6	2,3	8	2,9	14	2,6	
2 à 3 fois	0	0,0	11	3,9	11	2,0	
3 fois	2	0,8	4	1,4	6	1,1	
Hépatite A							
Non	260	98,1	261	93,5	521	95,8	,021
1 fois	4	1,5	17	6,1	21	3,9	
2 à 3 fois	0	0,0	1	0,4	1	0,2	
3 fois	1	0,4	0	0,0	1	0,2	
Hépatite B							
Non	263	99,2	275	98,6	538	98,9	,743
1 fois	1	0,4	2	0,7	3	0,6	
2 à 3 fois	0	0,0	1	0,4	1	0,2	
3 fois	1	0,4	1	0,4	2	0,4	
Shigellose							
Non	261	98,5	275	98,6	536	98,5	,571
1 fois	3	1,1	3	1,1	6	1,1	
2 à 3 fois	0	0,0	1	0,4	1	0,2	
3 fois	1	0,4	0	0,0	1	0,2	

Tableau 7.4 : Stratégies de prévention des ITSS

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Préservatif et lubrifiant							
Stratégie inconnue de moi	2	0,8	2	0,7	4	0,7	<,001
Connue sans être appliquée	14	5,3	77	27,6	91	16,7	
Connue parfois appliquée	65	24,4	115	41,2	180	33,0	
Connue souvent/toujours appliquée	174	65,4	74	26,5	248	45,5	
Non concerné	11	4,1	11	3,9	22	4,0	
Considération de la charge virale							
Stratégie inconnue de moi	50	18,8	22	7,9	72	13,2	<,001
Connue sans être appliquée	58	21,8	97	34,8	155	28,4	
Connue parfois appliquée	36	13,5	63	22,6	99	18,2	
Connue souvent/toujours appliquée	28	10,5	66	23,7	94	17,2	
Non concerné	94	35,3	31	11,1	125	29,2	
PrEP							
Stratégie inconnue de moi	34	12,8	24	8,6	58	10,6	<,001
Connue sans être appliquée	111	41,7	97	34,8	208	38,2	
Connue parfois appliquée	14	5,3	38	13,6	52	9,5	
Connue souvent/toujours appliquée	26	9,8	78	28,0	104	19,1	
Non concerné	81	30,5	42	15,1	123	22,6	

Tableau 7.5 : Utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Utilisation de la PrEP au moins une fois	25	12,2	70	44,9	95	26,3	<,001
Moyen d'obtention de la PrEP							
Prescription médicale d'un médecin	22	84,6	61	82,4	83	83,0	,799
Prescription médicale d'un tiers pour usage curatif	0	0,0	1	1,4	1	1,1	,551
Traitements contre le VIH prescrits comme TPE/PEP	1	3,8	6	8,1	7	7,0	,464
Association ou organisme communautaire	3	11,5	7	9,5	10	10,0	,761
Par le biais d'un ami séropositif	1	3,8	3	4,1	4	4,0	,963
Par le biais d'un participant à un essai clinique de PrEP	1	3,8	4	5,4	5	5,0	,754
Par le biais d'un autre utilisateur de la PrEP	2	7,7	4	5,4	6	6,0	,649
En l'achetant sur Internet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	--
En achetant des génériques à l'étranger	0	0,0	0	0,0	0	0,0	--
En l'achetant dans la rue	0	0,0	0	0,0	0	0,0	--
Autre	0	0,0	1	1,4	1	1,0	,740

Durée d'utilisation de la PrEP							
Je ne l'utilise plus en ce moment	6	23,1	7	9,5	13	13,0	,262
Depuis moins de 3 mois	5	19,2	6	8,1	11	11,0	
Depuis 3 à 6 mois	3	11,5	13	17,6	16	16,0	
Depuis 7 à 12 mois	4	15,4	17	23,0	21	21,0	
Depuis plus d'un an	7	26,9	27	36,5	34	34,0	
Difficultés rencontrées pour suivi médical en lien avec la PrEP	5	20,0	5	7,0	10	10,4	,164
Type de difficultés rencontrées pour le suivi médical							
Horaires du lieu de prescription	3	60,0	3	60,0	6	60,0	1,00
Fréquence aux 3 mois trop élevée	1	20,0	3	60,0	4	40,0	,524
Déplacement au lieu de prescription	1	20,0	3	60,0	4	40,0	,524
Examens non remboursés	1	20,0	0	0,0	1	10,0	1,00
Devoir parler à un médecin de ma sexualité	2	40,0	1	20,0	3	30,0	1,00
Ambiance d'hôpital	2	40,0	1	20,0	3	30,0	1,00
Attitudes jugeantes	2	40,0	0	0,0	2	20,0	,444
Autre	1	20,0	2	40,0	3	30,0	1,00
Dicibilité : amis en général							
Oui	15	60,0	42	59,2	57	59,4	,951
Non	9	36,0	25	35,2	34	35,4	
Non applicable	1	4,0	4	5,6	5	5,2	
Dicibilité : amis gais, bi ou trans							
Oui	21	84,0	63	88,7	84	87,5	,743
Non	3	12,0	5	7,0	8	8,3	
Non applicable	1	4,0	3	4,2	4	4,2	
Dicibilité : amis séropositifs							
Oui	17	68,0	57	80,3	74	77,1	,452
Non	3	12,0	5	7,0	8	8,3	
Non applicable	5	20,0	9	12,7	14	14,6	
Dicibilité : famille							
Oui	8	32,0	16	22,5	24	25,0	,615
Non	14	56,0	47	66,2	61	63,5	
Non applicable	3	12,0	8	11,3	11	11,5	
Dicibilité : partenaire sexuel principal							
Oui	14	56,0	58	81,7	72	75,0	,028
Non	2	8,0	4	5,6	6	6,3	
Non applicable	9	36,0	9	12,7	18	18,8	
Dicibilité : partenaire sexuel occasionnels							
Oui	23	92,0	62	87,3	85	88,5	,759
Non	1	4,0	6	8,5	7	7,3	
Non applicable	1	4,0	3	4,2	4	4,2	
Dicibilité : médecin ou autre personnel soignant							
Oui	20	80,0	62	87,3	82	85,4	,568
Non	4	16,0	6	8,5	10	10,4	
Non applicable	1	4,0	3	4,2	4	4,2	
Dicibilité : membres association / groupe communautaire							
Oui	9	36,0	38	54,3	47	49,5	,285
Non	9	36,0	19	27,1	28	29,5	
Non applicable	7	28,0	13	18,6	20	21,1	
L'affiche ouvertement sur des sites ou applications de rencontre	12	48,0	42	59,2	54	56,3	,619
Plaide pour la PrEP							
Oui	8	32,0	36	50,7	44	45,8	,052
Non	16	64,0	26	36,6	42	43,8	
Non applicable	1	4,0	9	12,7	10	10,4	

Tableau 8.1 : Santé globale : Votre moral

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Satisfaction face à son apparence physique	195	73,3	207	74,5	402	73,9	,760
Aime faire face à des défis (12 derniers mois)							
Entièrement en désaccord	15	5,7	13	4,7	28	5,2	,813
Plutôt en désaccord	27	10,2	26	9,4	53	9,8	
Ni en accord ou en désaccord	58	21,9	65	23,4	123	22,7	
Plutôt d'accord	115	43,4	112	40,3	227	41,8	
Entièrement en accord	50	18,9	62	22,3	112	20,6	
Recherche les sensations fortes (12 derniers mois)							
Entièrement en désaccord	13	4,9	9	3,2	22	4,1	,011
Plutôt en désaccord	39	14,7	20	7,2	59	10,9	
Ni en accord ou en désaccord	65	24,5	57	20,5	122	22,5	
Plutôt d'accord	95	35,8	117	42,1	212	39,0	
Entièrement en accord	53	20,0	75	27,0	128	23,6	
C'est senti déprimé (12 derniers mois)							
Entièrement en désaccord	51	19,3	66	23,7	117	21,6	,003
Plutôt en désaccord	26	9,8	34	12,2	60	11,1	
Ni en accord ou en désaccord	36	13,6	50	18,0	86	15,9	
Plutôt d'accord	83	31,4	93	33,5	176	32,5	
Entièrement en accord	68	25,8	35	12,6	103	19,0	
C'est senti seul (12 derniers mois)							
Entièrement en désaccord	55	20,8	79	28,4	134	24,7	,084
Plutôt en désaccord	35	13,3	33	11,9	68	12,5	
Ni en accord ou en désaccord	43	16,3	47	16,9	90	16,6	
Plutôt d'accord	65	24,6	73	26,3	138	25,5	
Entièrement en accord	66	25,0	46	16,5	112	20,7	
Eu des pensées/idées suicidaires (12 derniers mois)							
Entièrement en désaccord	134	50,8	166	59,7	300	55,4	,011
Plutôt en désaccord	33	12,5	40	14,4	73	13,5	
Ni en accord ou en désaccord	23	8,7	28	10,1	51	9,4	
Plutôt d'accord	41	15,5	29	10,4	70	12,9	
Entièrement en accord	33	12,5	15	5,4	48	8,9	
Au cours du derniers mois, je me suis senti nerveux.							
Jamais	21	7,9	28	10,0	49	9,0	,042
Rarement	33	12,4	48	17,2	81	14,9	
Parfois	115	43,2	132	47,3	247	45,3	
La plupart du temps	83	31,2	56	20,1	139	25,5	
Tout le temps	14	5,3	15	5,4	29	5,3	
Au cours du derniers mois, je me suis senti désespéré.							
Jamais	72	27,1	117	41,9	189	34,7	,003
Rarement	78	29,3	73	26,2	151	27,7	
Parfois	75	28,2	62	22,2	137	25,1	
La plupart du temps	30	11,3	23	8,2	53	9,7	
Tout le temps	11	4,1	4	1,4	15	2,8	
Au cours du derniers mois, je me suis senti agité ou incapable de tenir en place.							
Jamais	52	19,5	63	22,6	115	21,1	,071
Rarement	59	22,2	78	28,0	137	25,1	
Parfois	106	39,8	106	38,0	212	38,9	
La plupart du temps	37	13,9	28	10,0	65	11,9	
Tout le temps	12	4,5	4	1,4	16	2,9	
Au cours du derniers mois, je me suis senti si déprimé que plus rien ne pouvait me mettre de bonne humeur.							

Jamais	108	40,6	135	48,4	243	44,6	,100
Rarement	57	21,4	62	22,2	119	21,8	
Parfois	64	24,1	54	19,4	118	21,7	
La plupart du temps	25	9,4	24	8,6	49	9,0	
Tout le temps	12	4,5	4	1,4	16	2,9	
Au cours du derniers mois, je me suis senti à ce point fatigué que tout était un effort.							
Jamais	67	25,2	88	31,7	155	28,5	,053
Rarement	67	25,2	76	27,3	143	26,3	
Parfois	86	32,3	86	30,9	172	31,6	
La plupart du temps	31	11,7	23	8,3	54	9,9	
Tout le temps	15	5,6	5	1,8	20	3,7	

Tableau 8.2 : Discrimination et attitudes négatives

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Injurié en raison de l'orientation sexuelle	98	36,8	85	30,5	183	33,6	,115
Agressé en raison de l'orientation sexuelle	25	9,4	13	4,7	38	7,0	,031
Discrimination en raison de l'orientation sexuelle							
Non	166	62,4	195	69,9	361	66,2	,065
Oui, à l'école	26	9,8	14	5,0	40	7,3	,033
Oui, au travail	22	8,3	31	11,1	53	9,7	,263
Oui, dans mon quartier	22	8,3	18	6,5	40	7,3	,416
Oui, dans le milieu gay	15	5,6	12	4,3	27	5,0	,472
Oui, sur Internet	30	11,3	23	8,2	53	9,7	,232
Oui, dans l'espace public	61	22,9	50	17,9	111	20,4	,146
Discrimination en raison de l'identité de genre							
Non	256	96,2	270	96,8	526	96,5	,734
Oui, à l'école	1	0,4	3	1,1	4	0,7	,339
Oui, au travail	3	1,1	1	0,4	4	0,7	,293
Oui, dans mon quartier	1	0,4	2	0,7	3	0,6	,591
Oui, dans le milieu gay	6	2,3	4	1,4	10	1,8	,475
Oui, sur Internet	7	2,6	3	1,1	10	1,8	,176
Oui, dans l'espace public	3	1,1	3	1,1	6	1,1	,953
Discrimination en raison du VIH							
Non	252	94,7	224	80,3	476	87,3	< ,001
Oui, à l'école	0	0,0	2	0,7	2	0,4	,167
Oui, au travail	2	0,8	6	2,2	8	1,5	,175
Oui, dans mon quartier	1	0,4	2	0,7	3	0,6	,591
Oui, dans le milieu gay	10	3,8	31	11,1	41	7,5	,001
Oui, sur Internet	9	3,4	33	11,8	42	7,7	< ,001
Oui, dans l'espace public	1	0,4	8	2,9	9	1,7	,023

Tableau 8.3: Problèmes de santé physique

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
VIH							
Problème non rencontré	217	81,6	166	59,5	383	70,3	< ,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	14	5,3	57	20,4	71	13,0	
Peu préoccupé par ce problème	9	3,4	21	7,5	30	5,5	
Assez préoccupé par ce problème	12	4,5	20	7,2	32	5,9	
Très préoccupé par ce problème	14	5,3	15	5,4	29	5,3	
VHC							
Problème non rencontré	249	93,6	240	86,0	489	89,7	,063
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	4	1,5	7	2,5	11	2,0	
Peu préoccupé par ce problème	6	2,3	13	4,7	19	3,5	
Assez préoccupé par ce problème	5	1,9	15	5,4	20	3,7	
Très préoccupé par ce problème	2	0,8	4	1,4	6	1,1	
Anxiété							
Problème non rencontré	88	33,1	107	38,4	195	35,8	,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	23	8,6	44	15,8	67	12,3	
Peu préoccupé par ce problème	28	10,5	35	12,5	68	11,6	
Assez préoccupé par ce problème	71	26,7	64	22,9	135	24,8	
Très préoccupé par ce problème	56	21,1	29	10,4	85	15,6	
Depression							
Problème non rencontré	117	44,0	148	53,0	265	48,6	,072
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	25	9,4	28	10,0	53	9,7	
Peu préoccupé par ce problème	31	11,7	35	12,2	65	11,9	
Assez préoccupé par ce problème	45	16,9	40	14,3	85	15,6	
Très préoccupé par ce problème	48	18,0	29	10,4	77	14,1	
Troubles alimentaires							
Problème non rencontré	161	60,5	161	57,9	322	59,2	,397
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	17	6,4	18	6,5	35	6,4	
Peu préoccupé par ce problème	16	6,0	29	10,4	45	8,3	
Assez préoccupé par ce problème	41	15,4	44	15,8	85	15,6	
Très préoccupé par ce problème	31	11,7	26	9,4	57	10,5	

Tableau 8.4 : Difficultés psychologiques

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Acceptation de son orientation sexuelle							
Problème non rencontré	192	72,2	238	85,3	430	78,9	< ,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	19	7,1	18	6,5	37	6,8	
Peu préoccupé par ce problème	22	8,3	7	2,5	29	5,3	
Assez préoccupé par ce problème	21	7,9	15	5,4	36	6,6	
Très préoccupé par ce problème	12	4,5	1	0,4	13	2,4	
Acceptation de son identité de genre							
Problème non rencontré	242	91,0	270	96,8	512	93,9	,062
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	7	2,6	4	1,4	11	2,0	
Peu préoccupé par ce problème	8	3,0	2	0,7	10	1,8	
Assez préoccupé par ce problème	4	1,5	2	0,7	6	1,1	
Très préoccupé par ce problème	5	1,9	1	0,4	6	1,1	
Image corporelle							
Problème non rencontré	107	40,2	136	48,7	243	44,6	,019
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	30	11,3	39	14,0	69	12,7	
Peu préoccupé par ce problème	38	14,3	31	11,1	69	12,7	
Assez préoccupé par ce problème	61	22,9	60	21,5	121	22,2	
Très préoccupé par ce problème	30	11,3	13	4,7	43	7,9	
Processus de sortie/coming out							
Problème non rencontré	187	70,3	246	88,2	433	79,4	< ,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	20	7,5	7	2,5	27	5,0	
Peu préoccupé par ce problème	23	8,6	16	5,7	39	7,2	
Assez préoccupé par ce problème	23	8,6	7	2,5	30	5,5	
Très préoccupé par ce problème	13	4,9	3	1,1	16	2,9	
Solitude/ Isolement							
Problème non rencontré	117	44,0	145	52,0	262	48,1	,132
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	27	10,2	30	10,8	57	10,5	
Peu préoccupé par ce problème	33	12,4	36	12,9	69	12,7	
Assez préoccupé par ce problème	55	20,7	48	17,2	103	18,9	
Très préoccupé par ce problème	34	12,8	20	7,2	54	9,9	
Idées ou tentatives suicidaires							
Problème non rencontré	166	62,4	204	73,1	370	67,9	,021
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	22	8,3	17	6,1	39	7,2	
Peu préoccupé par ce problème	18	6,8	21	7,5	39	7,2	
Assez préoccupé par ce problème	36	13,5	27	9,7	63	11,6	
Très préoccupé par ce problème	24	9,0	10	3,6	34	6,2	

Acceptation de l'activité de travail du sexe							
Problème non rencontré	246	92,5	261	93,5	507	93,0	,483
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	9	3,4	9	3,2	18	3,3	
Peu préoccupé par ce problème	3	1,1	6	2,2	9	1,7	
Assez préoccupé par ce problème	6	2,3	2	0,7	8	1,5	
Très préoccupé par ce problème	2	0,8	1	0,4	3	0,6	

Tableau 8.5 : Dépendances

Catégories	n1	% n1	n2	% n2	Total n1 + n2	Total % n1 + n2	Sig
Sexualité compulsive							
Problème non rencontré	114	42,9	71	25,4	185	33,9	< ,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	55	20,7	71	25,4	126	23,1	
Peu préoccupé par ce problème	47	17,7	56	20,1	103	18,9	
Assez préoccupé par ce problème	36	13,5	63	22,6	99	18,2	
Très préoccupé par ce problème	14	5,3	18	6,5	32	5,9	
Dépendance à Internet							
Problème non rencontré	79	29,7	78	28,0	157	28,8	,390
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	74	27,8	76	27,2	150	27,5	
Peu préoccupé par ce problème	48	18,0	47	16,8	95	17,4	
Assez préoccupé par ce problème	43	16,2	62	22,2	105	19,3	
Très préoccupé par ce problème	22	8,3	16	5,7	38	7,0	
Dépendance aux images érotiques							
Problème non rencontré	110	41,4	124	44,4	234	42,9	,260
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	55	20,7	69	24,7	124	22,8	
Peu préoccupé par ce problème	53	19,9	41	14,7	94	17,2	
Assez préoccupé par ce problème	33	12,4	36	12,9	69	12,7	
Très préoccupé par ce problème	15	5,6	9	3,2	24	4,4	
Consommation d'alcool							
Problème non rencontré	77	28,9	120	43,0	197	36,1	,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	61	22,9	70	25,1	131	24,0	
Peu préoccupé par ce problème	52	19,5	41	14,7	93	17,1	
Assez préoccupé par ce problème	52	19,5	37	13,3	89	16,3	
Très préoccupé par ce problème	24	9,0	11	3,9	35	6,4	
Consommation de drogue							
Problème non rencontré	53	19,9	47	16,8	100	18,3	,299
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	66	24,8	83	29,7	149	27,3	
Peu préoccupé par ce problème	67	25,2	57	20,4	124	22,8	
Assez préoccupé par ce problème	51	19,2	66	23,7	117	21,5	

Très préoccupé par ce problème	29	10,9	26	9,3	55	10,1	
Tabagisme							
Problème non rencontré	72	27,1	129	46,2	201	36,9	< ,001
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	55	20,7	47	16,8	102	18,7	
Peu préoccupé par ce problème	31	11,7	25	9,0	56	10,3	
Assez préoccupé par ce problème	53	19,9	55	19,7	108	19,8	
Très préoccupé par ce problème	55	20,7	23	8,2	78	14,3	
Jeu compulsif							
Problème non rencontré	236	88,7	245	87,8	481	88,3	,817
Problème rencontré sans qu'il ne préoccupe	11	4,1	14	5,0	25	4,6	
Peu préoccupé par ce problème	11	4,1	8	2,9	19	3,5	
Assez préoccupé par ce problème	7	2,6	10	3,6	17	3,1	
Très préoccupé par ce problème	1	0,4	2	0,7	3	0,6	

RESULTATS

L'enquête Net Gay Baromètre conduite auprès de 10 199 HSH et personnes transgenres en 2018 a permis d'explorer deux profils de HSH ayant une consommation de substances psychoactives intensive en contextes sexuel ou bien dans d'autres contextes non spécifiquement orientés vers les pratiques sexuelles (voir précisions annexe 4).

Afin de caractériser les publics ayant les pratiques les plus à risque, on a volontairement retenu des indicateurs attestant d'un usage de substances en polyconsommations (hors cannabis, poppers, viagra, stéroïdes et anabolisants) dans le mois précédant l'enquête. De ce fait, les deux publics de HSH comparés ont une consommation de substances illicites plus marquée que celles de l'ensemble des répondants au NGB et recouvrent des profils très minoritaires dans l'échantillon global (respectivement 266 HSH usagers intensifs de drogues hors contextes sexuels et 279 chemsexer).

Bien que la majorité des deux groupes considérés a été recrutée au travers des réseaux sociaux, le recrutement via les sites de rencontre BDSM et bareback est plus marqué parmi les chemsexer que parmi les usagers intensifs hors contexte sexuel (HCS) (35 % vs. 10 %, $p < 0,001$). Les chemsexers passent plus de temps sur internet en vue de rencontres à des fins sexuelles (11 heures d'utilisation en moyenne par semaine contre 7 heures $p < 0,001$ pour les HSH usagers de drogues HCS). Près de la moitié des chemsexer (45 %) déclarent utiliser des applications de rencontre plusieurs fois par jour, contre 29 % ($p < 0,001$) des usagers intensifs HCS. Dans cet échantillon d'HSH, les chemsexers sont plus âgés que les usagers intensifs HCS (41 ans versus 34 ans de moyenne, $p < 0,001$).

Par ailleurs, les deux groupes ne se différencient pas tant par leur situation professionnelle que par la répartition de leurs ressources mensuelles, les chemsexer se révélant financièrement plus favorisés : seuls 6% d'entre eux disent percevoir moins de 600 € par mois alors que 15 % des HSH usagers intensifs HCS se déclarent dans cette situation. À l'opposé, les répondants qui déclarent percevoir plus de 5 000 € par mois représentent 12 % des chemsexers contre 5% des usagers hors cadre sexuel ($p < 0,001$). S'agissant de leur situation familiale, les chemsexers déclarent moins souvent être en couple (23 % vs. 31 % $p < 0,006$).

Trois facteurs spécifiques aux pratiques sexuelles au cours des 12 derniers mois distinguent clairement les chemsexers des autres HSH usagers de drogues HCS : le nombre de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels masculins (90 relations en moyenne vs. 37), le nombre de partenaires occasionnels (53 partenaires en moyenne contre 22) ainsi que le nombre de partenaires rencontrés en ligne (36 en moyenne vs. 16). Par ailleurs, les chemsexers sont plus nombreux à refuser rarement les pratiques de sexe anal en raison du statut sérologique (82 % vs. 66 %, $p < 0,001$) et à pratiquer la pénétration anale sans préservatif avec des partenaires occasionnels (66 % vs. 24 %, $p < 0,001$). L'injection des drogues est plus fréquemment rapportée par les chemsexers de l'échantillon (25 vs. 5%, $p < 0,001$). Comparés aux HSH usagers de drogues hors contextes sexuels, les chemsexers se révèlent ainsi plus impliqués dans des pratiques sexuelles à risques et plus vulnérables aux dommages associés.

Près d'un tiers d'entre eux (32%) indiquent avoir été diagnostiqués séropositifs pour le VIH contre 10 % des HSH usagers hors chemsex. Pour autant, il est notable que les pratiques de dépistage s'agissant du VHC sont plus marquées parmi les chemsexers (72 % vs 56 % au cours des 12 derniers mois) de même que les démarches de vaccination en matière d'hépatite A (57 % vs. 42 % au cours des 12 derniers mois).

Dans cet échantillon, une minorité de chemsexers déclarent des difficultés psychologiques et celles-ci sont moins marquées chez eux que chez les HSH usagers de drogues HCS. Ainsi, seuls 5 % des chemsexers de l'échantillon déclarent avoir eu des pensées ou idées suicidaires au cours de l'année passée contre 13 % des HSH usagers de drogues HCS ($p < 0,011$). De même, 4 % des chemsexer disent avoir été très préoccupés par ces idées ou tentatives au cours des 12 derniers mois contre 9% des usagers HCS.

Au final, à consommation de drogues équivalente, les profils de HSH déclarant ces usages en contextes sexuels ou hors contextes sexuels se différencient clairement par leur utilisation des applications de rencontre –plus fréquente parmi les chemsexer-, par leur âge –plus élevé- et leurs pratiques sexuelles, plus à risques parmi les chemsexer. Ces résultats sont en cohérence avec les données de la littérature exposés plus haut.

L'enquête souligne deux points d'intérêts non investigués par ailleurs : comparés aux HSH usagers de drogues hors contextes sexuels, les chemsexer ont des pratiques de dépistage plus marquées et se disent moins affectés au plan psychologique.

CONCLUSION

À consommation de drogues équivalente, les chemsexers se différencient des chemclubbers par un âge plus élevé, de plus forts revenus, un usage plus intense des applications de rencontre, un nombre de partenaires plus élevé (53 versus 22) et un plus fort engagement dans la culture de sexe bareback (88 vs 56 %). 5 fois plus nombreux à s'injecter les substances consommées (25 vs 5 %), ils sont plus vulnérables aux dommages associés, avec une forte prévalence du VIH (41 %), du VHC (15,8 %), compensé par un plus fort engagement dans la PrEP (44,9 % des Chemsexers HIV -).

Déclarant une forte dépendance à la sexualité, les Chemsexers semblent plus résilients sur d'autres plans, une minorité d'entre eux avançant des difficultés psychologiques en lien avec leur consommation.

Parmi les utilisateurs d'une même catégorie de substances, dont les parcours peuvent se croiser entre Night-Life et sexe-party, les chemsexers se distinguent par un profil en santé sexuelle préoccupant. Des interventions de réduction des risques adaptés visant à réduire l'incidence du VIH et du VHC et leur sentiment de dépendance à la sexualité devraient leur être proposées.