



HAL
open science

Le Net Gay Baromètre 2014 : source de mobilisation des connaissances et des communautés au regard des HGBTQ/HRSH des différentes régions administratives au Québec.

A. Leobon, Eliane Ed Dussault, Joanne Otis, Riyas Fadel, Gabriel Daunais-Laurin

► To cite this version:

A. Leobon, Eliane Ed Dussault, Joanne Otis, Riyas Fadel, Gabriel Daunais-Laurin. Le Net Gay Baromètre 2014 : source de mobilisation des connaissances et des communautés au regard des HGBTQ/HRSH des différentes régions administratives au Québec.. [Rapport de recherche] Université du Québec à Montréal; Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 2018, pp.401. halshs-03759217

HAL Id: halshs-03759217

<https://shs.hal.science/halshs-03759217v1>

Submitted on 23 Aug 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Le Net Gay Baromètre 2014 : source de mobilisation des connaissances et des communautés au regard des HGBTQ/HRSH des différentes régions administratives au Québec.

Ce document de 400 p présente les résultats du NGB 2014 selon les régions administratives du Québec.

Alain Léobon, Eliane Dussault, Joanne Otis, Gabriel Daunais-Laurin, Riyas Fadel

Introduction

SLITSS dans le cadre du programme de subvention en santé publique a proposé des fonds pour des analyses secondaires

Contexte épidémiologique

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de toute orientation sexuelle et de tout genre (HGBTQ/HRSH) sont particulièrement touchés par le VIH au Canada, constituant en 2014, 54,4 % des infections (Agence de santé publique du Canada, 2013). Au Québec, en 2016, la proportion d'HRSH parmi les nouveaux diagnostics chez les hommes atteignait 66,0 %, dont la majorité était à Montréal (Institut national de santé publique, 2017). Les enquêtes périodiques montrent par ailleurs qu'une importante part des HGBTQ/HRSH a des pratiques sexuelles à risque et soulignent de profonds changements dans les stratégies de réduction des risques adoptées par ces hommes, compte tenu des avancées technologiques importantes en matière de prévention (Otis et al., 2015). Alors que les données épidémiologiques et les travaux sur la santé des HGBTQ/HRSH montrent un certain essoufflement des efforts de prévention (Blanchard et Aral, 2011), plusieurs lacunes furent exprimées lors de la première rencontre québécoise de recherche communautaire sur le VIH en 2013, telles que le besoin de mieux saisir les spécificités des sous- groupes parmi les HGBTQ/HRSH dans une perspective syndémique et intersectionnelle. En misant sur les facteurs de résilience tout en tenant compte des intersections entre l'âge, l'appartenance culturelle, le lieu de résidence, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et le statut sérologique au VIH dans la compréhension de la vulnérabilité à l'infection, les membres ont aussi souligné la sous- exploitation des données probantes existantes pour éclairer les actions préventives en particulier dans la transmission des ITSS. En effet, les données issues d'enquêtes récentes sur la santé des HGBTQ/HRSH sont peu nombreuses au Québec et leurs effectifs ne permettent pas, pour la plupart, d'effectuer des analyses approfondies de la spécificité de certains sous-groupes plus vulnérables.

En 2016, la Direction de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (DLITSS) du ministère de la Santé et des Services sociaux a soutenu l'équipe de l'étude Net Gay Baromètre.

Enquête Net Gay Baromètre

La 3e édition du Net Gay Baromètre québécois (NGB) s'est déroulée du mois d'août 2013 au mois d'août 2014. Il s'agit d'une enquête en ligne comportementale qui a recruté, en 2014, plus de 5 000 répondants au Canada, dont 3 653 au Québec (sur la base d'une sélection de sites de rencontre gais, du magazine Fugues, de sites d'informations générales et du réseau social Facebook). Une proportion de 65 % des participants déclare résider à l'extérieur de la région de Montréal, dont 401 dans des milieux ruraux. La distribution des répondants selon leur lieu de résidence montre que l'ensemble du territoire québécois est couvert par l'étude. Le NGB aborde les modes de vie et la sexualité des HGBTQ/HRSH.

L'enquête permet donc à ces hommes de rapporter leurs expériences sur : 1) leur usage d'Internet et des réseaux sociaux à des fins de rencontres ; 2) le développement ou maintien de relations sociales, affectives ou sexuelles avec des partenaires rencontrés (ou non) sur Internet ; 3) le dévoilement de leur orientation sexuelle par rapport aux proches et aux amis, en particulier sur les réseaux sociaux ; 4) l'appartenance à des minorités visibles, 5) leur vie de couple 6) les relations développées avec des partenaires occasionnels masculins ou féminins ; 7) les pratiques sexuelles et les comportements sexuels à risque rapportés ; 8) les contextes de développement du « *barebacking* » ; 9) la consommation de substances psychoactives ; 10) l'engagement dans des relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe ; 11) le dépistage du VIH et VHC et le suivi de traitements ; 12) les ITSS contractées dans les 12 derniers mois, 13) leur sentiment de discrimination ou leur perception d'attitudes négatives à l'égard de l'orientation sexuelle (ex. : homophobie, biphobie), de l'identité de genre (transphobie), du statut sérologique positif au VIH (sérophobie), des origines ethnoculturelles (racisme), etc., mesuré sous un angle spatial (à l'école, au travail, dans le milieu gai, etc.) additif ou intersectionnel; et 14) leurs préoccupations questionnées par catégorie et niveau d'intensité à l'égard de la santé physique, mentale, relationnelle ou sexuelle.

La mouture 2013/2014 de l'enquête aborde donc des enjeux vécus plus particulièrement par les plus jeunes, les travailleurs du sexe et les hommes séropositifs, ainsi que les questions de lutte contre l'homophobie et, plus généralement, contre les discriminations rapportées par certains groupes de répondants. Par ailleurs, à moins qu'il y ait précision contraire, lorsque les participants ont répondu au questionnaire, on leur a demandé de se référer à leurs habitudes et comportements **au cours des 12 derniers mois**.

Distribution géographique des répondants québécois selon leur tranche d'âge

Sur plus près de 5000 questionnaires complétés au Canada, 3653 concernent des résidents de la province du Québec et 3379 ont pu être géocodés à partir de la déclaration de leur code postal. Les représentations cartographiques des répondants québécois, issus de l'enquête canadienne, montrent sur ce territoire l'influence de la métropolisation.


Nous voyons, Figure 1, que la plupart des répondants résident dans une région métropolitaine ou dans une zone à influence métropolitaine élevée ou forte. La figure 2 représente la distribution géographique de l'ensemble des répondants puis des répondants âgés de 16 à 24 ans à l'échelon municipal, pour l'ensemble du Québec puis pour l'aire métropolitaine de Montréal. Les Jeunes HSH (16-24ans) sont un peu moins nombreux (54,6 % versus 57.7) à résider dans la grande région de Montréal (Montréal, Laval, Lanaudière, Montérégie et Laurentides), mais sont surtout moins présents dans l'île de Montréal, vivant plus souvent dans sa banlieue.

On constate, Figure 3, des variations de la distribution par quartiers de résidence de l'ensemble des répondants et des répondants âgés de 16 à 24 ans pour la municipalité de Montréal.

Figure 1

Municipalités de résidence des répondants québécois suivant le gradient des zones d'influence métropolitaine


n = 3379 répondants



Source : Statistique Canada, 2011 ; Net Gay Baromètre 2013, Québec

Figure 2


Municipalités de résidence des répondants et des âgés de 16 à 24 ans au Québec et dans l'aire métropolitaine de Montréal



Source : Net Gay Baromètre 2013, Québec

Figure 3

Quartiers* de résidence de l'ensemble des répondants et des âgés de 16 à 24 ans pour la municipalité de Montréal



Présentation des résultats par région administrative

Les analyses produites dans ce rapport présentent les résultats par région administrative du Québec.

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux croisés, réalisés à partir d'analyses de khi- deux.

Abitibi-Témiscamingue

Les Abitibiens comptent moins du cinquième de l'échantillon total ($n = 60$) et ont une médiane d'âge de 32,5 ans. Ils ont plus souvent été recrutés en tant que participants à l'étude sur Facebook (tableau 1.1). Dans près de la moitié des cas de l'ensemble de l'échantillon, ils ont complété des études universitaires (tableau 1.3). Ils sont plus nombreux à travailler à temps plein ou à temps partiel et moins nombreux à être retraités (tableau 1.3). Ils sont plus souvent en relation avec un homme ou divorcés, de même qu'à avoir des enfants ne demeurant pas avec eux (tableau 1.4). Ils demeurent plus souvent en couple avec un homme (tableau 1.5). Ils sont plus nombreux à se dire surtout attirés par les hommes (tableau 1.6). Ils ont aussi plus souvent dévoilé leur orientation sexuelle à leur entourage. Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Au niveau de leur utilisation d'Internet à des fins sociales ou sexuelles, ils utilisent davantage ce dernier pour socialiser entre amis (tableau 2.3). Dans la presque totalité des cas, ils ont un compte sur les réseaux sociaux et plus souvent, ils échangent plusieurs fois par jour sur ces derniers. Les amis sur ces réseaux sont plus souvent surtout hétérosexuels (tableau 2.4). Ils se disent moins dépendants aux interactions en ligne et à la pornographie, mais plus aux rencontres en ligne et au cybersexe (tableau 2.5).

Ceux ayant déclaré au moins un partenaire occasionnel ont eu un nombre de partenaires plus petit que les Québécois en général, mais ont eu plus de relations sexuelles par partenaire. Ceux-ci ont en moyenne moins été rencontrés via Internet (tableau 3.1). Dans le double de la proportion de l'échantillon total, ils ont développé des sentiments régulièrement pour ces derniers. Dans une plus grande proportion, ils n'ont pas eu de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels alors qu'en couple (tableau 3.2). Au niveau de leurs pratiques et comportements sexuels avec ces derniers, ils se sont plus souvent faits sucer et pénétrer, ont plus souvent pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) ou utilisé régulièrement le condom lors des fellations, mais ont moins adopté de pratiques sexuelles alternatives (tableau 3.3). Ceux ayant eu au moins une partenaire occasionnelle ont moins souvent développé des sentiments envers ces dernières et ont plus souvent eu des relations non-protégées de façon régulière avec elles (tableau 3.6).

Les Abitibiens ont été en couple dans une plus grande proportion que l'ensemble des Québécois, en plus que cette relation dure plus souvent encore au moment de répondre (tableau 4.1). Les partenaires de couple ayant été dépistés pour le VIH sont plus souvent séronégatifs (tableau 4.3). Les répondants pratiquent plus souvent la pénétration anale, qu'elle soit protégée ou non, avec ce type de partenaire (tableau 4.4).

Concernant la pratique de relations anales intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*), les Abitibiens sont moins nombreux à l'avoir pratiquée avec les partenaires occasionnels uniquement, mais plus nombreux à l'avoir pratiquée dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels à la fois (tableau 5.1). Afin de rencontrer, ces hommes fréquentent plus souvent des lieux ou établissements mixtes ou hétéros, des lieux extérieurs (parcs, toilettes, etc.), des peep shows et des associations culturelles ou de loisirs (tableau 6.1). Par contre, ils utilisent moins d'applications et de sites de rencontre gais géolocalisants. Ceux en faisant usage s'y identifient plus souvent en mettant une photo de leur visage (tableau 6.2).

Du côté de leur consommation de substances, ils sont plus nombreux à avoir consommé 5 verres d'alcool ou plus moins d'une fois par mois (tableau 7.1), mais ont moins souvent consommé au moins 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue au cours de la dernière année (tableau 7.2). Cela indique donc qu'ils consomment davantage d'alcool, mais moins de drogues.

Par ailleurs, moins de ces hommes ont eu une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe et dans tous les cas, ils ont proposé une compensation (tableau 8.1).

Du côté de leur santé sexuelle, les Abitibiens ont plus souvent été dépistés pour le VIH au cours des 12 derniers mois (tableau 9.1) et pour le VHC (tableau 9.3). Par ailleurs, ils ont moins souvent eu au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois (tableau 9.4).

En ce qui concerne leur santé mentale, ils accordent moins d'importance à l'apparence physique de leur partenaire, en plus d'être plus satisfaits de la leur (tableau 10.1). Ils se sont moins sentis déprimés et seuls, alors qu'ils croient plus souvent faire les choses aussi bien que les autres et être aussi valables que les autres (tableau 10.2). Du côté de leurs préoccupations, ils sont plus préoccupés par leur relation de couple, leurs relations familiales (tableau 12.1), l'anxiété (tableau 12.2), la dépendance à Internet et le tabagisme (tableau 12.4).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	32,5
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	3,3%
	Facebook	38,7%	45,0%
	Sites de rencontre	52,0%	51,7%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	95,0%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	0,0%
	Né à l'étranger	6,9%	5,0%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	0,0%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	20,0%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	57,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	5,0%
	Études à temps plein	21,4%	18,3%
	Travail à temps partiel	17,5%	25,0%
	Travail à temps plein	46,2%	53,3%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	8,3%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	3,3%
	Congé de maladie	1,8%	1,7%
	Retraite	11,6%	5,0%
	Autre	2,3%	1,7%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	36,7%
	En relation avec un homme	28,8%	43,3%
	En relation avec une femme	6,1%	5,0%
	Divorcé	5,0%	11,7%
	Marié avec une femme	3,9%	1,7%
	Marié avec un homme	2,9%	1,7%
	En union civile avec un homme	2,8%	3,3%
	Séparé	1,7%	1,7%
	Veuf	0,9%	0,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,7%
Enfants			
	Non	80,6%	69,5%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	27,1%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	3,4%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	35,0%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	35,0%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	8,3%
	Habite en colocation/amis	14,0%	15,0%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	6,7%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	8,3%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	0,0%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	18,45 ± 7,19
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	71,7%
Surtout envers les hommes	16,0%	21,7%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	5,0%
Surtout envers les femmes	3,3%	1,7%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	80,0%
Surtout avec des hommes	11,0%	10,0%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	8,3%
Surtout avec des femmes	4,2%	1,7%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	81,7%
Bisexuelle	17,4%	16,7%
En questionnement	2,6%	0,0%
Hétérosexuelle	0,7%	0,0%
Queer	0,7%	0,0%
Autres	0,6%	1,7%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	53,3%
Oui	32,6%	33,3%
Ne sait pas	11,7%	13,3%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	76,7%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	68,3%
À la fratrie	61,5%	68,3%
Aux collègues de travail	52,5%	58,3%
Au médecin	48,7%	53,3%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	56,7%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	40,0%
Majoritairement homosexuel	9,7%	1,7%
Sans amis	2,1%	0,0%
Autres	1,1%	1,7%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	68,3%
Ordinateur portable	61,2%	65,0%
Téléphone mobile	49,2%	45,0%
Tablette	23,0%	18,3%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	6,7%
Télé numérique	4,3%	3,3%
Autres	0,7%	0,0%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	1,7%
6 à 12 mois	3,7%	0,0%
1 à 3 ans	16,8%	18,3%
4 à 6 ans	21,8%	30,0%
7 ans et plus	55,1%	50,0%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	8,38 ± 8,95 / 6,50
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	78,3%
Pour du contenu pornographique	58,5%	56,7%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	31,7%
Pour des raisons affectives	23,1%	18,3%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	15,0%
Pour du cybersexe	14,8%	13,3%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	15,0%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	5,0%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60

Proportion de l'échantillon		100%	1,6%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux			
	Oui	89,0%	98,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux</i>		N = 3 240	n = 59
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux			
	Plusieurs fois par jour	48,9%	54,2%
	Plusieurs fois par semaine	28,1%	23,7%
	Plusieurs fois par mois	9,5%	3,4%
	Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	18,6%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux			
	Majoritairement hétérosexuel	47,2%	59,3%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	37,3%
	Majoritairement homosexuel	7,6%	3,4%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon		100%	1,6%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	73,3%
	Rencontres en ligne	42,4%	55,0%
	Interactions en ligne	34,0%	28,3%
	Pornographie	30,2%	23,3%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon		100%	1,6%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	18,3%
	Plutôt positif	41,7%	36,7%
	Aucun effet	30,3%	33,3%
	Plutôt négatif	11,5%	10,0%
	Négatif	1,5%	1,7%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon		100%	1,6%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	85,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>		N = 3 183	n = 51
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels	9,45 ± 18,49 /	4,12 ± 3,13

(moyenne ± écart-type / médiane)	5,00	/ 3,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	25,90 ± 41,91
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	13,47 ± 32,98
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	2,84 ± 2,85
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,67 ± 0,54

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 51
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	32,48 ± 10,98
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	40,0%
Plus jeunes	23,4%	18,0%
Plus âgés	20,3%	26,0%
D'âges variés	16,2%	16,0%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	70,0%
Bisexuels	20,1%	22,0%
Hétérosexuels	3,8%	0,0%
Ne sait pas	5,7%	8,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	42,0%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	28,6%
Non (relation exclusive)	18,9%	30,6%
Non (pas en couple)	48,3%	40,8%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 51
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	88,0%
Se faire sucer	73,9%	86,0%
S'embrasser	69,0%	72,0%
Masturbation réciproque	67,9%	68,0%
Se masser	32,7%	48,0%
Se faire pénétrer	32,6%	38,0%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	36,0%

Pénétrer	26,5%	30,0%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	20,0%
Sexe en groupe	4,4%	8,0%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	20,0%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	2,0%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	2,0%
Fist-fucking	1,3%	2,0%
Urophilie	1,6%	0,0%
Scatophilie	0,3%	0,0%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	14,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	28,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	22,0%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 51
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	72,0%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	55,6%
Régulièrement	16,6%	27,8%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 20
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	5,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	20,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	80,0%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	11,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 7
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,15 ± 0,44 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	14,3%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	28,6%
Régulièrement	37,0%	45,9%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 2
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif		
Oui	51,3%	100,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu		
Oui	17,2%	0,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)		
Oui	51,7%	65,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 39

Âge du dernier partenaire de couple	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	34,15 ± 12,98
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple	Sur Internet	58,4%	51,3%
Durée de la dernière relation de couple	Plus d'un an	62,2%	64,1%
	Plusieurs mois	27,8%	23,1%
	Plusieurs semaines	10,0%	12,8%
Situation actuelle	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	82,1%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 39
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
	Oui	63,0%
	Non	18,7%
	Ne sait pas	18,4%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 25
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
	Séronégatif	89,5%
	Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%
	Séropositif	6,6%
	Ne sait pas	3,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 14
Statut sérologique du partenaire de couple (présumé par le répondant)		
	Séronégatif	66,5%
	Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%
	Séropositif	0,6%
	Ne sait pas	30,5%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 39
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	84,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 33
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	90,9%
Régulièrement	58,2%	66,7%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 39
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	36,4%
Non	45,8%	45,5%
Ne sait pas	21,6%	18,2%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (<i>barebacking</i> dans le questionnaire)		
Non	66,3%	66,7%
Oui	33,7%	33,3%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	11,7%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	3,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	18,3%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple</i>	N = 350	n = 7
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	85,7%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	83,3%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	42,9%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	75,0%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom</i> (plusieurs réponses s'appliquent)	N = 436	n = 2
Séroconvergent	85,9%	100,0%
Séroinconnu	67,7%	100,0%
Sérodivergent	24,9%	0,0%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	0,0%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	50,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	50,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	50,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	99,4	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	5,0%	0,0%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	0,0%
En association avec la consommation de substances	32,0%	0,0%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	50,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	0,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels	N = 442	n = 11
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	70,0%
Séroinconnu	58,1%	40,0%
Sérodivergent	27,1%	27,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	20,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	63,6%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	54,5%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	63,6%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	81,8%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	22,2%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	11,1%
En association avec la consommation de substances	33,3%	40,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	33,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	0,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	0,0%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Lieux ou établissements « gais »		
Régulièrement	14,7%	8,3%
Occasionnellement	41,4%	28,3%
Jamais	43,9%	63,3%
Lieux ou établissements « mixtes »		
Régulièrement	7,8%	15,0%
Occasionnellement	29,0%	26,7%
Jamais	63,2%	58,3%
Lieux ou établissements « hétéros »		
Régulièrement	10,0%	21,7%
Occasionnellement	26,2%	28,3%
Jamais	63,8%	50,0%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	40,0%
	Occasionnellement	32,7%	45,0%
	Jamais	14,3%	15,0%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	18,3%
	Occasionnellement	39,3%	36,7%
	Jamais	44,8%	45,0%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	10,0%
	Occasionnellement	25,9%	28,3%
	Jamais	67,5%	61,7%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	3,3%
	Occasionnellement	24,0%	13,3%
	Jamais	68,0%	83,3%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	6,7%
	Occasionnellement	20,5%	31,7%
	Jamais	73,8%	61,7%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	0,0%
	Occasionnellement	11,0%	21,7%
	Jamais	86,8%	78,3%
Sex club / backroom			
	Régulièrement	2,9%	1,7%
	Occasionnellement	8,3%	1,7%
	Jamais	88,8%	96,7%
Clubs échangistes			
	Régulièrement	1,5%	0,0%
	Occasionnellement	2,4%	3,3%
	Jamais	96,2%	96,7%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)			
	Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	46,7%
	Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	65,0%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	26,7%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 16

Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	93,8%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	0,0%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	6,3%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	23,3%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	40,0%
	Une fois par mois	17,3%	15,0%
	Une fois par semaine	15,7%	15,0%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	5,0%
	Tous les jours ou presque	1,4%	1,7%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	68,3%
	1 à 2 fois	12,2%	3,3%
	3 à 9 fois	8,0%	6,7%
	10 fois et plus	16,2%	21,7%
Poppers			
	Jamais	75,2%	83,3%
	1 à 2 fois	9,9%	5,0%
	3 à 9 fois	6,2%	5,0%
	10 fois et plus	8,6%	6,7%
Viagras / Cialis			
	Jamais	80,0%	86,7%
	1 à 2 fois	7,5%	6,7%
	3 à 9 fois	6,2%	3,3%
	10 fois et plus	6,3%	3,3%
Amphétamines			
	Jamais	90,1%	93,3%
	1 à 2 fois	4,8%	1,7%
	3 à 9 fois	2,6%	5,0%
	10 fois et plus	2,6%	0,0%
Ecstasy			
	Jamais	90,4%	91,7%
	1 à 2 fois	5,9%	8,3%
	3 à 9 fois	2,3%	0,0%
	10 fois et plus	1,4%	0,0%
Cocaïne			
	Jamais	91,7%	91,7%
	1 à 2 fois	4,3%	6,7%
	3 à 9 fois	2,2%	0,0%
	10 fois et plus	1,9%	1,7%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)			
	Jamais	94,6%	98,3%
	1 à 2 fois	1,6%	0,0%
	3 à 9 fois	0,8%	0,0%
	10 fois et plus	3,0%	1,7%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
MDMA			
Jamais		94,7%	96,7%
1 à 2 fois		3,5%	3,3%
3 à 9 fois		1,1%	0,0%
10 fois et plus		0,6%	0,0%
GHB			
Jamais		95,2%	98,3%
1 à 2 fois		2,7%	1,7%
3 à 9 fois		1,2%	0,0%
10 fois et plus		0,9%	0,0%
Kétamine			
Jamais		97,5%	100,0%
1 à 2 fois		1,4%	0,0%
3 à 9 fois		0,6%	0,0%
10 fois et plus		0,5%	0,0%
Crystal Meth			
Jamais		97,9%	100,0%
1 à 2 fois		1,0%	0,0%
3 à 9 fois		0,5%	0,0%
10 fois et plus		0,5%	0,0%
Crack			
Jamais		98,6%	100,0%
1 à 2 fois		0,9%	0,0%
3 à 9 fois		0,2%	0,0%
10 fois et plus		0,4%	0,0%
Héroïne			
Jamais		99,6%	100,0%
1 à 2 fois		0,1%	0,0%
3 à 9 fois		0,1%	0,0%
10 fois et plus		0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 60 1,6%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
Oui		58,7%	48,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
N = 657			n = 14
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois			
Oui		2,5%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
N = 2 988			n = 29
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)			
À la maison ou en privé		63,5%	52,0%
Dans des soirées / établissements		24,0%	16,0%

Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	12,0%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	4,0%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	2,0%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,0%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	3,3%
Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 327	n = 2
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	100,0%
Contre des services	15,0%	0,0%
Contre des cadeaux	13,8%	50,0%
Contre de la drogue	8,3%	0,0%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	0,0%
Compensation proposée	49,2%	100,0%
Autres configurations	12,8%	0,0%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe	N = 123	n = 0
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	n/a
Non	76,6%	n/a
Souhaite ne pas répondre	8,6%	n/a

8.2 Répondants travailleurs du sexe, N/A

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	2,00 ± 1,41
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	20,00 ± 0,00
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	100,0%

Environ du même âge	15,4%	0,0%
Plus âgés	5,6%	0,0%
D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	0,0%
Bisexuels	24,8%	50,0%
Hétérosexuels	5,6%	0,0%
Ne sait pas	11,2%	50,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	50,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	0,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	50,0%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	50,0%
Par des sites spécialisés	12,3%	50,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	50,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	50,0%
Relation anale	49,7%	50,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	100,0%
Régulièrement	25,6%	100,0%
Consentie sans conditions	59,6%	0,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	100,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	0,0%
Non	69,6%	100,0%

Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%
--	------	------

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	100,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	51,7%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	28,3%
Non, jamais	29,7%	20,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 48
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	89,6%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	4,2%
Séropositif	7,0%	2,1%
En attente des résultats	2,0%	2,1%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	2,1%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 12
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	83,3%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	8,3%
Pense être séropositif	2,5%	0,0%
Ne veut pas savoir	15,8%	8,3%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	0,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	20,0%
Parfois	17,9%	21,7%
Toujours	38,7%	38,3%
Non concerné	21,2%	20,0%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	21,7%
Parfois	25,4%	18,3%
Toujours	28,8%	30,0%
Non concerné	20,9%	30,0%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	30,0%
Parfois	20,2%	18,3%
Toujours	12,4%	16,7%
Non concerné	22,2%	35,0%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	41,7%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	20,0%
Non, jamais	30,8%	21,7%
Ne sait pas	11,6%	16,7%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 37
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	2,7%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
Séronégatif	90,4%	94,6%
Ne sait pas	4,2%	2,7%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois		
Oui	14,5%	8,3%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)		
Condylomes (VPH)	4,8%	0,0%
Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	5,0%
Chlamydia	4,2%	3,3%
Syphilis	3,0%	0,0%
Herpès génital	2,8%	0,0%
Gonococcie rectale	1,0%	1,7%
Hépatite B	1,0%	0,0%
Hépatite A	0,9%	0,0%
LGV	0,4%	0,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	81,7%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	75,0%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	13,3%
Assez importante	53,4%	58,3%
Très importante	32,4%	23,3%
Extrêmement importante	9,1%	5,0%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	35,6%
Je me suis senti déprimé	35,5%	30,5%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	10,2%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	96,6%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	91,4%
J'aime faire face à des défis	73,9%	71,2%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	75,9%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	37,3%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	30,5%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	18,6%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	13,6%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	0,0%
Surpoids	17,4%	13,6%
Manières	10,6%	6,8%
VIH+	3,5%	0,0%
Origine ethnoculturelle	3,4%	1,7%
Identité de genre	2,1%	0,0%
Travail du sexe	1,5%	0,0%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 11
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	36,4%
Au travail	27,5%	27,3%
Dans le milieu gai	9,5%	0,0%
Sur Internet	25,5%	27,3%
Ailleurs ou en général	50,4%	27,3%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 8
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	25,0%
Au travail	13,4%	25,0%
Dans le milieu gai	55,0%	50,0%
Sur Internet	50,9%	50,0%
Ailleurs ou en général	34,8%	25,0%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	25,0%
Au travail	24,7%	50,0%
Dans le milieu gai	23,4%	50,0%
Sur Internet	24,1%	50,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	25,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	100,0%
Au travail	31,4%	100,0%
Dans le milieu gai	28,9%	100,0%
Sur Internet	33,9%	100,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	100,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	n/a
Au travail	22,4%	n/a
Dans le milieu gai	17,1%	n/a
Sur Internet	35,5%	n/a
Ailleurs ou en général	40,8%	n/a

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	12,7%	n/a
Dans le milieu gai	45,2%	n/a
Sur Internet	46,0%	n/a
Ailleurs ou en général	43,7%	n/a

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe</i>	N = 54	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	14,8%	n/a
Dans le milieu gai	27,8%	n/a
Sur Internet	40,7%	n/a
Ailleurs ou en général	40,7%	n/a

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	40,7%
Relations de couple	27,2%	40,7%
Rupture d'une relation	22,1%	27,1%
Relations familiales	21,4%	42,4%
Recherche d'amis	18,0%	30,5%
Violence dans le couple	3,0%	3,4%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	44,1%
Dépression	20,0%	39,0%
Troubles de l'alimentation	18,5%	20,3%
VIH	5,2%	6,8%
Hépatite C	1,6%	3,4%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	33,9%
Solitude / isolement	22,7%	33,9%
<i>Coming out</i>	11,9%	20,3%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	22,0%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	16,9%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	11,9%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,7%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	45,8%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	39,0%
Sexualité compulsive	16,0%	27,1%
Tabagisme	15,4%	32,2%
Consommation d'alcool	7,8%	15,3%
Consommation de drogues	5,1%	11,9%
Jeu compulsif	1,3%	3,4%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	32,2%
Prévention VIH	19,5%	30,5%
Dépistage VIH	19,1%	28,8%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	28,8%
Traitement des ITSS	11,8%	22,0%

Capitale-Nationale

Cette région comporte le deuxième nombre de participants le plus important après celle de Montréal en représentant près de 15% de l'échantillon (n = 545). La médiane d'âge des répondants est de 38 ans. Sur la plupart des variables sociodémographiques, ces hommes ressemblent à l'ensemble de l'échantillon (tableaux 1.1 à 1.7). Une plus grande proportion de ces répondants a été recrutée via des sites de rencontres (tableau 1.1). Du point de vue de leurs amis, les HSH provenant de la Capitale-Nationale sont moins nombreux à avoir des amis majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Ils rapportent plus souvent avoir développé une forme de dépendance à Internet, qu'il s'agisse des rencontres en ligne, des interactions en ligne ou de la pornographie (tableau 2.5).

Parmi ceux rapportant au moins un partenaire occasionnel masculin au cours de la dernière année, ils ont généralement davantage de relations sexuelles avec un même partenaire. Ils sont moins nombreux à pratiquer la pénétration anale non-protégée (PANP) régulièrement avec ces derniers (tableau 3.4). Chez les participants ayant pratiqué la PANP au moins une fois avec ce type de partenaire, ils l'ont moins souvent pratiquée avec un partenaire dont ils connaissaient le statut sérologique, puisqu'ils déclarent avoir adopté la pratique dans une plus petite proportion avec un partenaire séropositif, séroinconnu ou séronégatif (tableau 3.5). Ceux ayant eu une partenaire occasionnelle féminine sont moins nombreux à avoir eu des relations sexuelles non protégées (vaginales ou anales) avec ces dernières (tableau 3.6). Ils connaissent moins souvent le statut sérologique des partenaires avec qui ils ont adopté cette pratique (tableau 3.7).

Dans un autre ordre d'idées, les répondants ayant eu un partenaire stable ou de couple masculin au cours des 12 derniers mois sont plus nombreux à dire que ce partenaire n'a pas eu d'autres partenaires sexuels (tableau 4.5).

Ceux ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou barebacking) uniquement dans le cadre d'un couple sont moins nombreux à rapporter l'éjaculation du partenaire en eux lors de l'adoption de cette pratique, mais sont plus nombreux à ce qu'eux-mêmes ou les partenaires se soient retirés avant d'éjaculer lors de ces rapports sexuels (tableau 5.2). Chez ceux ayant adopté cette pratique uniquement avec des partenaires occasionnels, ces partenaires

étaient moins souvent de statut sérodivergent (tableau 5.3). Les partenaires de ceux ayant pratiqué la RAISC uniquement avec les partenaires occasionnels ainsi que dans le cadre d'un couple et avec partenaires occasionnels se sont plus souvent retirés pour ne pas éjaculer en eux (tableaux 5.3 et 5.4). Les répondants ayant adopté la pratique avec ces deux types de partenaires ont plus souvent été plusieurs dans un contexte privé, et un peu plus souvent lors de relations dans le cadre du travail du sexe (tableau 5.4).

Ils utilisent moins souvent des applications ou sites de rencontres gays géolocalisants (tableau 6.2). Les hommes de la région de Québec consomment moins de cannabis (tableau 7.1).

Parmi ceux ayant eue des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe, ils sont plus nombreux à avoir échangé ces dernières contre de l'argent. Chez les travailleurs du sexe, ils sont plus nombreux à ce que cette activité n'ait pas représenté une large part de leur revenu (tableau 8.1).

Concernant leur santé sexuelle, ces hommes ressemblent le plus souvent à l'ensemble de l'échantillon. Chez les répondants n'ayant jamais été dépistés pour le VIH, ils sont près de 4 fois moins nombreux à penser être encore séronégatifs (tableau 9.1). Ils sont un peu plus nombreux à avoir contracté au moins une ITSS au cours de la dernière année alors que le plus souvent, les hommes vivant à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal sont moins nombreux à en avoir contracté une ITSS (tableau 9.4).

Au niveau de leur santé mentale, ils sont moins nombreux à s'être sentis déprimés ou seuls au cours des 12 derniers mois (tableau 10.2).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	38
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	7,2%
	Facebook	38,7%	33,0%
	Sites de rencontre	52,0%	59,9%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	93,8%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	1,8%
	Né à l'étranger	6,9%	4,4%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	1,5%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	35,8%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	59,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	4,2%
	Études à temps plein	21,4%	19,1%
	Travail à temps partiel	17,5%	17,4%
	Travail à temps plein	46,2%	49,2%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	6,4%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	2,4%
	Congé de maladie	1,8%	1,3%
	Retraite	11,6%	15,4%
	Autre	2,3%	1,1%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	53,8%
	En relation avec un homme	28,8%	30,3%
	En relation avec une femme	6,1%	6,1%
	Divorcé	5,0%	4,4%
	Marié avec une femme	3,9%	2,8%
	Marié avec un homme	2,9%	2,8%
	En union civile avec un homme	2,8%	3,7%
	Séparé	1,7%	2,2%
	Veuf	0,9%	0,6%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,6%
Enfants			
	Non	80,6%	82,0%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	11,7%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	6,2%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	41,3%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	25,1%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	10,5%
	Habite en colocation/amis	14,0%	16,0%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	7,9%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	2,2%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,2%
	Autres	0,9%	1,1%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,55 ± 8,26
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	69,5%
Surtout envers les hommes	16,0%	16,9%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	9,0%
Surtout envers les femmes	3,3%	4,6%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	78,0%
Surtout avec des hommes	11,0%	9,7%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	7,7%
Surtout avec des femmes	4,2%	4,6%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	78,2%
Bisexuelle	17,4%	17,1%
En questionnement	2,6%	3,3%
Hétérosexuelle	0,7%	0,4%
Queer	0,7%	0,4%
Autres	0,6%	0,7%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	58,7%
Oui	32,6%	29,9%
Ne sait pas	11,7%	11,4%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	69,2%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	63,1%
À la fratrie	61,5%	58,9%
Aux collègues de travail	52,5%	51,0%
Au médecin	48,7%	47,5%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	43,5%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	43,1%
Majoritairement homosexuel	9,7%	11,2%
Sans amis	2,1%	1,5%
Autres	1,1%	0,7%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	72,8%
Ordinateur portable	61,2%	58,7%
Téléphone mobile	49,2%	47,7%
Tablette	23,0%	22,4%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	5,7%
Télé numérique	4,3%	4,4%
Autres	0,7%	0,6%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,0%
6 à 12 mois	3,7%	2,8%
1 à 3 ans	16,8%	15,8%
4 à 6 ans	21,8%	23,5%
7 ans et plus	55,1%	56,0%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 60
Proportion de l'échantillon	100%	1,6%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	9,20 ± 12,32 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	60,6%
Pour du contenu pornographique	58,5%	55,8%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	33,0%
Pour des raisons affectives	23,1%	21,5%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	14,7%
Pour du cybersexe	14,8%	16,1%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	10,6%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	2,9%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	89,7%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 489
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	47,7%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	28,5%
Plusieurs fois par mois	9,5%	10,5%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	13,3%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	44,1%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	48,4%
Majoritairement homosexuel	7,6%	7,6%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	58,3%
Rencontres en ligne	42,4%	45,9%
Interactions en ligne	34,0%	37,8%
Pornographie	30,2%	33,8%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	16,7%
Plutôt positif	41,7%	40,2%
Aucun effet	30,3%	31,2%
Plutôt négatif	11,5%	11,0%
Négatif	1,5%	0,9%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 475
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	87,3%
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	8,47 ± 14,22 / 5,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	28,25 ± 47,71
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	8,31 ± 31,84
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	5,88 ± 12,16
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,69 ± 0,38

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 475
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	36,64 ± 51,24
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	42,8%
Plus jeunes	23,4%	23,7%
Plus âgés	20,3%	19,5%
D'âges variés	16,2%	14,0%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	71,4%
Bisexuels	20,1%	20,1%
Hétérosexuels	3,8%	2,1%
Ne sait pas	5,7%	6,4%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	21,4%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	31,5%
Non (relation exclusive)	18,9%	19,2%
Non (pas en couple)	48,3%	49,2%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 475
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	83,5%
Se faire sucer	73,9%	72,5%
S'embrasser	69,0%	68,9%
Masturbation réciproque	67,9%	68,0%
Se masser	32,7%	29,0%
Se faire pénétrer	32,6%	28,6%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	31,1%
Pénétrer	26,5%	25,8%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	10,2%
Sexe en groupe	4,4%	3,2%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	29,7%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	2,5%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	2,3%
Fist-fucking	1,3%	0,8%
Urophilie	1,6%	0,8%
Scatophilie	0,3%	0,2%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	8,5%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	21,2%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	22,9%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 475
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	72,0%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	54,0%
Régulièrement	16,6%	9,7%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 183
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	5,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	41,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	48,1%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	13,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 74
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,40 ± 1,69 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	28,4%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	52,7%
Régulièrement	37,0%	31,4%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 39
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	46,2%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	10,3%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>			
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	53,2%
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	35,03 ± 14,31
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	58,1%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	63,1%
	Plusieurs mois	27,8%	26,6%
	Plusieurs semaines	10,0%	10,3%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	74,5%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>			
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
	Oui	63,0%	61,0%
	Non	18,7%	20,0%
	Ne sait pas	18,4%	19,0%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 177
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	90,4%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	5,1%
Ne sait pas	3,6%	4,5%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 113
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	68,1%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	5,3%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	26,5%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 290
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	72,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 210
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	81,3%
Régulièrement	58,2%	59,8%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 290
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	31,6%
Non	45,8%	51,2%
Ne sait pas	21,6%	17,2%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	68,9
Oui	33,7%	31,1%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	10,5%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	10,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	10,3%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple</i>	N = 350	n = 57
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	72,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	80,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	63,8%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	67,3%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 56
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	88,9%
Séroinconnu	67,7%	69,8%
Sérodivergent	24,9%	12,2%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	34,0%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		

Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	58,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	58,8%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	56,4%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	74,4%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	96,4%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	55,6%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	36,4%
En association avec la consommation de substances	32,0%	26,7%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	23,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	11,4%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	11,6%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	11,9%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 56
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	88,5%
Séroinconnu	58,1%	59,3%
Sérodivergent	27,1%	19,1%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	26,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	76,0
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	81,1
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	69,6
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	73,1
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	38,5%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	24,0%
En association avec la consommation de substances	33,3%	32,1%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	64,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	14,3%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	20,8%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	14,6%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	14,9%
	Occasionnellement	41,4%	41,7%
	Jamais	43,9%	43,5%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	7,2%
	Occasionnellement	29,0%	26,6%
	Jamais	63,2%	66,2%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	9,2%
	Occasionnellement	26,2%	26,2%
	Jamais	63,8%	64,6%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	53,6%
	Occasionnellement	32,7%	31,6%
	Jamais	14,3%	14,9%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	15,6%
	Occasionnellement	39,3%	40,2%
	Jamais	44,8%	44,2%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	7,2%
	Occasionnellement	25,9%	23,7%
	Jamais	67,5%	69,2%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	7,2%
	Occasionnellement	24,0%	27,5%
	Jamais	68,0%	65,3%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	3,7%
	Occasionnellement	20,5%	19,5%
	Jamais	73,8%	76,8%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	1,3%
	Occasionnellement	11,0%	10,1%
	Jamais	86,8%	88,6%
Sex club / backroom			
	Régulièrement	2,9%	2,0%
	Occasionnellement	8,3%	8,3%
	Jamais	88,8%	89,7%
Clubs échangistes			
	Régulièrement	1,5%	0,9%
	Occasionnellement	2,4%	2,4%
	Jamais	96,2%	96,7%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)			
	Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	44,8%

	N = 3 669	n = 545
Région socio-sanitaire	100%	14,9%
Proportion de l'échantillon		
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	58,5%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	30,6%
<i>Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant</i>	N = 1 283	n = 167
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	79,5%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	11,1%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	9,4%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	30,1%
Moins d'une fois par mois	26,2%	23,7%
Une fois par mois	17,3%	18,2%
Une fois par semaine	15,7%	18,7%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	8,8%
Tous les jours ou presque	1,4%	0,6%
Cannabis		
Jamais	63,6%	69,0%
1 à 2 fois	12,2%	11,9%
3 à 9 fois	8,0%	6,4%
10 fois et plus	16,2%	12,7%
Poppers		
Jamais	75,2%	77,8%
1 à 2 fois	9,9%	9,9%
3 à 9 fois	6,2%	4,2%
10 fois et plus	8,6%	8,1%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	80,6%
1 à 2 fois	7,5%	7,9%
3 à 9 fois	6,2%	6,4%
10 fois et plus	6,3%	5,1%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Amphétamines			
	Jamais	90,1%	89,2%
	1 à 2 fois	4,8%	4,8%
	3 à 9 fois	2,6%	2,4%
	10 fois et plus	2,6%	3,7%
Ecstasy			
	Jamais	90,4%	90,8%
	1 à 2 fois	5,9%	6,4%
	3 à 9 fois	2,3%	1,5%
	10 fois et plus	1,4%	1,3%
Cocaïne			
	Jamais	91,7%	92,8%
	1 à 2 fois	4,3%	4,4%
	3 à 9 fois	2,2%	2,4%
	10 fois et plus	1,9%	0,4%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)			
	Jamais	94,6%	93,6%
	1 à 2 fois	1,6%	2,2%
	3 à 9 fois	0,8%	0,9%
	10 fois et plus	3,0%	3,3%
MDMA			
	Jamais	94,7%	97,1%
	1 à 2 fois	3,5%	2,4%
	3 à 9 fois	1,1%	0,4%
	10 fois et plus	0,6%	0,2%
GHB			
	Jamais	95,2%	97,1%
	1 à 2 fois	2,7%	2,0%
	3 à 9 fois	1,2%	0,6%
	10 fois et plus	0,9%	0,4%
Kétamine			
	Jamais	97,5%	99,3%
	1 à 2 fois	1,4%	0,6%
	3 à 9 fois	0,6%	0,0%
	10 fois et plus	0,5%	0,2%
Crystal Meth			
	Jamais	97,9%	99,4%
	1 à 2 fois	1,0%	0,2%
	3 à 9 fois	0,5%	0,0%
	10 fois et plus	0,5%	0,4%
Crack			
	Jamais	98,6%	99,4%
	1 à 2 fois	0,9%	0,4%
	3 à 9 fois	0,2%	0,2%
	10 fois et plus	0,4%	0,0%
Héroïne			
	Jamais	99,6%	100,0%
	1 à 2 fois	0,1%	0,0%
	3 à 9 fois	0,1%	0,0%
	10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	56,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 73
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 305
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	58,1%
Dans des soirées / établissements	24,0%	19,5%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	14,3%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	3,4%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	2,9%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,2%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	9,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 51
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	94,1%
Contre des services	15,0%	7,8%
Contre des cadeaux	13,8%	13,7%
Contre de la drogue	8,3%	7,8%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	3,9%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	41,2%
Compensation proposée	49,2%	49,0%
Autres configurations	12,8%	9,8%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 21
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	9,5%
Non	76,6%	90,5%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 21
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	5,10 ± 10,71
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	40,63 ± 11,40
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	19,0%
Plus âgés	69,4%	71,4%
D'âges variés	12,1%	9,5%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	38,1%
Bisexuels	28,2%	38,1%
Hétérosexuels	9,7%	9,5%
Ne sait pas	15,3%	14,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	4,8%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	61,9%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	52,4%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	14,3%
Par des sites spécialisés	13,7%	9,5%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	9,5%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	9,5%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	4,8%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 21
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	9,5%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	28,6%

Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	23,8%
Relation anale	73,2%	85,7%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 18
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	44,4%
Régulièrement	30,0%	16,7%
Consentie sans conditions	51,0%	62,5%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	25,0%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	12,5%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	38,9%
Non	52,2%	55,6%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	5,6%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 90	n = 18
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	16,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	16,7%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 25
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	3,20 ± 2,54
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	30,00 ± 8,61

Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	84,0%
	Environ du même âge	15,4%	12,0%
	Plus âgés	5,6%	4,0%
	D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	52,0%
	Bisexuels	24,8%	20,0%
	Hétérosexuels	5,6%	8,0%
	Ne sait pas	11,2%	20,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	4,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	68,0%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	44,0%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	16,0%
	Par des sites spécialisés	12,3%	20,0%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	4,0%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	4,0%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	8,0%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 25
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	12,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	20,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	12,0%
Relation anale	49,7%	52,0%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 13
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	38,5%
Régulièrement	25,6%	30,8%
Consentie sans conditions	59,6%	80,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	20,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%

Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels			
	Oui	27,8%	15,4%
	Non	69,6%	84,6%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel		2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>		N = 79	n = 13
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	24,1%	23,1%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon		100%	14,9%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	42,8%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	27,7%
	Non, jamais	29,7%	29,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>		N = 2 554	n = 384
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	85,2%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	5,7%
	Séropositif	7,0%	3,9%
	En attente des résultats	2,0%	3,1%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	2,1%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>		N = 1 079	n = 161
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	78,1%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	4,4%
	Pense être séropositif	2,5%	1,3%
	Ne veut pas savoir	15,8%	18,8%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	1,5%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	24,0%
Parfois	17,9%	19,1%
Toujours	38,7%	36,0%
Non concerné	21,2%	20,9%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	26,1%
Parfois	25,4%	25,1%
Toujours	28,8%	26,1%
Non concerné	20,9%	22,8%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	47,9%
Parfois	20,2%	17,6%
Toujours	12,4%	9,9%
Non concerné	22,2%	24,6%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	32,5%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	27,7%
Non, jamais	30,8%	29,7%
Ne sait pas	11,6%	10,1%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 328
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	3,7%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,9%
Séronégatif	90,4%	89,3%
Ne sait pas	4,2%	6,1%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	17,8%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	5,9%
	Gonococcie, blennorrhagie, chaude pisse	4,3%	5,0%
	Chlamydia	4,2%	5,1%
	Syphilis	3,0%	3,1%
	Herpès génital	2,8%	4,4%
	Gonococcie rectale	1,0%	1,3%
	Hépatite B	1,0%	2,0%
	Hépatite A	0,9%	1,3%
	LGV	0,4%	0,6%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	71,5%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	85,1%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	4,1%
	Assez importante	53,4%	53,4%
	Très importante	32,4%	34,1%
	Extrêmement importante	9,1%	8,5%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 545 14,9%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	34,8%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	30,0%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	9,9%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	91,0%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	88,7%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	72,9%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	75,1%

Je recherche les sensations fortes	40,7%	38,9%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	32,5%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	18,3%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	14,2%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	1,7%
Surpoids	17,4%	19,8%
Manières	10,6%	9,3%
VIH+	3,5%	2,8%
Origine ethnoculturelle	3,4%	2,6%
Identité de genre	2,1%	1,9%
Travail du sexe	1,5%	1,9%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 99
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	20,2%
Au travail	27,5%	26,3%
Dans le milieu gai	9,5%	8,1%
Sur Internet	25,5%	29,3%
Ailleurs ou en général	50,4%	46,5%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 107
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	15,0%
Au travail	13,4%	10,3%
Dans le milieu gai	55,0%	54,2%
Sur Internet	50,9%	48,6%
Ailleurs ou en général	34,8%	31,8%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 50
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	24,0%
Au travail	24,7%	20,0%
Dans le milieu gai	23,4%	28,0%
Sur Internet	24,1%	24,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	48,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 14
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	0,0%
Au travail	31,4%	14,3%
Dans le milieu gai	28,9%	7,1%
Sur Internet	33,9%	35,7%
Ailleurs ou en général	46,3%	50,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 10
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	10,0%
Au travail	22,4%	10,0%
Dans le milieu gai	17,1%	20,0%
Sur Internet	35,5%	50,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	50,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 15
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	13,3%
Dans le milieu gai	45,2%	40,0%
Sur Internet	46,0%	33,3%
Ailleurs ou en général	43,7%	40,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe</i>	N = 54	n = 10
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	0,0%
Dans le milieu gai	27,8%	10,0%
Sur Internet	40,7%	60,0%
Ailleurs ou en général	40,7%	50,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	43,9%
Relations de couple	27,2%	40,2%
Rupture d'une relation	22,1%	28,9%
Relations familiales	21,4%	31,4%
Recherche d'amis	18,0%	33,0%
Violence dans le couple	3,0%	5,4%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	34,1%
Dépression	20,0%	25,9%
Troubles de l'alimentation	18,5%	26,3%
VIH	5,2%	5,4%
Hépatite C	1,6%	2,6%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	41,7%
Solitude / isolement	22,7%	29,1%
<i>Coming out</i>	11,9%	18,6%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	19,0%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	11,7%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	7,6%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	2,2%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	39,8%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	35,9%
Sexualité compulsive	16,0%	31,4%
Tabagisme	15,4%	17,8%
Consommation d'alcool	7,8%	16,3%
Consommation de drogues	5,1%	9,9%
Jeu compulsif	1,3%	2,8%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 545
Proportion de l'échantillon	100%	14,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	31,1%
Prévention VIH	19,5%	27,5%
Dépistage VIH	19,1%	28,1%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	27,7%
Traitement des ITSS	11,8%	19,5%

Chaudière-Appalaches

Les répondants de cette région constituent moins du vingtième de l'échantillon (n = 143), alors que leur médiane d'âge est de 44 ans. Comparativement à l'ensemble de l'échantillon, ils ont davantage été recrutés à partir de sites de rencontres (tableau 1.1). Ils se déclarent moins souvent en relation avec un homme (tableau 1.4) et demeurent plus souvent avec leurs parents (tableau 1.5). Ils ont moins le sentiment de faire partie de la communauté gaie et ont moins souvent dévoilé leur orientation sexuelle à l'entourage. Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7). Du côté de leur utilisation d'Internet, ils recherchent plus souvent des aventures sexuelles sur ce dernier (tableau 2.3).

Ceux rapportant au moins un partenaire occasionnel au cours des 12 derniers mois ont en moyenne eu moins de partenaires et de relations sexuelles par partenaire (tableau 3.1). Ceux-ci se présentaient plus souvent comme des bisexuels (tableau 3.2). Par ailleurs, ils ont moins souvent pratiqué la relation anale avec ceux-ci (pénétrer ou se faire pénétrer, pratiquer la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC)) (tableau 3.3). Ceux ayant eu une partenaire occasionnelle féminine ont plus souvent développé des sentiments envers elles et ont plus souvent eu au moins une relation vaginale non protégée avec ces dernières (tableau 3.6).

Parmi ceux ayant eu un partenaire stable ou de couple dans les 12 derniers mois, celui-ci a moins souvent été dépisté pour le VIH (tableau 4.2). Ces partenaires ont plus souvent pratiqué l'exclusivité sexuelle dans leur relation de couple. Les répondants ont moins souvent pratiqué la pénétration anale avec ceux-ci (tableau 4.4) et ont plus souvent été dans des relations stables exclusives (tableau 4.5). Ils ont également moins pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) (tableau 5.1). Ceux ayant adopté cette pratique ont en général pris moins de risques dans ce cadre, que ce soit au niveau du statut sérologique des partenaires impliqués, des comportements sexuels survenus lors de la pratique, ou des contextes de pratique (tableaux 5.2 à 5.4).

Ces répondants fréquentent aussi moins de lieux, quels soient-ils, dans le but de rencontrer des partenaires potentiels. Ils sont moins nombreux à faire usage d'applications ou de sites de rencontres gais géolocalisants (tableau 6.2). Globalement, les hommes de cette région fréquentent moins de lieux en général dans la but de rencontrer (tableau 7.1).

Ceux ayant eu une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont plus souvent proposé une compensation, alors que ces relations sexuelles ont plus souvent été échangées contre des services ou contre de l'argent pour de la drogue (tableau 8.1).

Parmi les hommes demeurant la région de Chaudière-Appalaches, une proportion plus petite d'entre eux a été dépistée pour le VIH (tableau 9.1) et le VHC (tableau 9.3). Ceux ayant été dépistés au cours des 12 derniers mois sont plus souvent de statut séronégatif (tableau 10.1). Ils discutent moins de leur statut sérologique avec l'entourage que l'ensemble des Québécois (tableau 9.2). Ils ont moins souvent contracté une ITSS au cours de la dernière année (tableau 9.4).

Du côté de leur santé mentale, ils accordent moins d'importance à l'apparence physique de leurs partenaires et se sont moins sentis déprimés (tableau 10.1). D'un autre côté, ils aiment plus faire face à des défis, recherchent plus les sensations fortes, prennent plus de risques dans la vie et sont plus satisfaits d'eux-mêmes dans l'ensemble (tableau 10.2). Dans l'ensemble, ces hommes se sont également moins sentis discriminés (tableau 11.1). Au niveau de leurs préoccupations, ces participants sont moins préoccupés par leurs relations de couple (tableau 12.1), l'anxiété, la dépression (tableau 12.2), le tabagisme (tableau 12.4) et leur santé sexuelle (tableau 12.5). Ils sont cependant davantage préoccupés de leur *coming out* et de l'acceptation de leur orientation sexuelle (tableau 12.3).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon		100%	3,9%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	44
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	7,0%
	Facebook	38,7%	28,7%
	Sites de rencontre	52,0%	64,3%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon		100%	3,9%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	98,6%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	0,7%
	Né à l'étranger	6,9%	0,7%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	2,1%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon		100%	3,9%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	33,6%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	58,0%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	1,4%
	Études à temps plein	21,4%	25,9%
	Travail à temps partiel	17,5%	21,7%
	Travail à temps plein	46,2%	46,9%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	7,7%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	4,2%
	Congé de maladie	1,8%	1,4%
	Retraite	11,6%	11,2%
	Autre	2,3%	1,4%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	57,3%
	En relation avec un homme	28,8%	22,4%
	En relation avec une femme	6,1%	6,3%
	Divorcé	5,0%	6,3%
	Marié avec une femme	3,9%	4,9%
	Marié avec un homme	2,9%	1,4%
	En union civile avec un homme	2,8%	6,3%
	Séparé	1,7%	2,1%
	Veuf	0,9%	0,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,0%
Enfants			
	Non	80,6%	77,6%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	18,2%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	4,2%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	36,4%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	21,7%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	21,0%
	Habite en colocation/amis	14,0%	11,2%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	11,2%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	6,3%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	0,7%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	20,41 ± 9,31
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	69,2%
Surtout envers les hommes	16,0%	18,9%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	7,0%
Surtout envers les femmes	3,3%	4,9%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	77,6%
Surtout avec des hommes	11,0%	10,5%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	7,7%
Surtout avec des femmes	4,2%	4,2%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	78,3%
Bisexuelle	17,4%	17,5%
En questionnement	2,6%	2,8%
Hétérosexuelle	0,7%	0,7%
Queer	0,7%	0,0%
Autres	0,6%	0,7%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	65,7%
Oui	32,6%	18,2%
Ne sait pas	11,7%	16,1%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	57,3%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	58,0%
À la fratrie	61,5%	54,5%
Aux collègues de travail	52,5%	43,4%
Au médecin	48,7%	43,4%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	54,5%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	37,8%
Majoritairement homosexuel	9,7%	4,9%
Sans amis	2,1%	2,8%
Autres	1,1%	0,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	72,0%
Ordinateur portable	61,2%	54,5%
Téléphone mobile	49,2%	42,0%
Tablette	23,0%	17,5%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	0,7%
Télé numérique	4,3%	2,1%
Autres	0,7%	2,1%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	3,5%
6 à 12 mois	3,7%	3,5%
1 à 3 ans	16,8%	22,4%
4 à 6 ans	21,8%	17,5%
7 ans et plus	55,1%	53,1%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	11,26 ± 13,06 / 7,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	57,3%
Pour du contenu pornographique	58,5%	55,2%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	39,9%
Pour des raisons affectives	23,1%	22,4%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	13,3%
Pour du cybersexe	14,8%	18,2%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	8,4%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	4,2%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	86,7%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 124
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	46,0%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	25,0%
Plusieurs fois par mois	9,5%	12,9%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	16,1%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	55,6%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	34,7%
Majoritairement homosexuel	7,6%	9,7%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	59,4%
Rencontres en ligne	42,4%	41,3%
Interactions en ligne	34,0%	31,5%
Pornographie	30,2%	33,6%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	11,9%
Plutôt positif	41,7%	45,5%
Aucun effet	30,3%	32,2%
Plutôt négatif	11,5%	9,1%
Négatif	1,5%	1,4%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	88,8%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 127
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	6,10 ± 10,46 / 3,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	15,33 ± 26,14
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	3,99 ± 9,87
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	3,80 ± 5,43
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,67 ± 0,39

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 127
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	36,65 ± 13,16
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	39,8%
Plus jeunes	23,4%	26,0%
Plus âgés	20,3%	20,3%
D'âges variés	16,2%	13,8%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	62,6%
Bisexuels	20,1%	29,3%
Hétérosexuels	3,8%	4,9%
Ne sait pas	5,7%	3,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	24,4%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	27,3%
Non (relation exclusive)	18,9%	21,5%
Non (pas en couple)	48,3%	51,2%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 127
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	85,4%
Se faire sucer	73,9%	71,5%
S'embrasser	69,0%	69,9%
Masturbation réciproque	67,9%	69,1%
Se masser	32,7%	39,8%
Se faire pénétrer	32,6%	25,2%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	30,1%
Pénétrer	26,5%	14,6%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	10,6%
Sexe en groupe	4,4%	2,4%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	34,1%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	2,4%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	3,3%
Fist-fucking	1,3%	4,9%
Urophilie	1,6%	1,6%
Scatophilie	0,3%	0,8%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	5,7%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	22,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	21,1%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 127
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	70,7%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	54,0%
Régulièrement	16,6%	12,6%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 47
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	8,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	34,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	59,6%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	7,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 11
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,17 ± 0,86 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	27,3%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	81,8%
Régulièrement	37,0%	33,0%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 9
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	55,6%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	11,1%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon		100%	3,9%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	50,3%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme		N = 1 882	n = 72
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	37,62 ± 16,70
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	58,3%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	56,9%
	Plusieurs mois	27,8%	29,2%
	Plusieurs semaines	10,0%	13,9%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	70,8%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon		100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme		N = 1 882	n = 72
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
	Oui	63,0%	57,7%
	Non	18,7%	18,3%
	Ne sait pas	18,4%	23,9%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 41
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	92,7%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	2,4%
Ne sait pas	3,6%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 31
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	51,6%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	48,4%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 72
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	59,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 42
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	71,4%
Régulièrement	58,2%	54,8%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 72
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	26,2%
Non	45,8%	59,5%
Ne sait pas	21,6%	14,3%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	71,3%
Oui	33,7%	28,7%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	9,1%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	12,6%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	7,0%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 13
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	76,9%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	84,6%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	38,5%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	53,8%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels	N = 436	n = 18
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	85,7%
Séroinconnu	67,7%	52,9%
Sérodivergent	24,9%	23,1%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	30,8%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		

Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	58,8%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	47,1%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	68,8%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	69,2%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	66,7%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	21,4%
En association avec la consommation de substances	32,0%	7,7%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	28,6%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	26,7%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	14,3%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	7,1%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 10
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	88,9%
Séroinconnu	58,1%	55,6%
Sérodivergent	27,1%	25,0%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	44,4%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	75,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	90,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	25,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	50,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	90,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	25,0%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	50,0%
En association avec la consommation de substances	33,3%	25,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	50,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	25,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	50,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	25,0%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Lieux ou établissements « gais »		
Régulièrement	14,7%	8,4%
Occasionnellement	41,4%	29,4%
Jamais	43,9%	62,2%
Lieux ou établissements « mixtes »		
Régulièrement	7,8%	7,0%
Occasionnellement	29,0%	14,7%
Jamais	63,2%	78,3%
Lieux ou établissements « hétéros »		
Régulièrement	10,0%	10,5%
Occasionnellement	26,2%	19,6%
Jamais	63,8%	69,9%
Sites de rencontre sur Internet		
Régulièrement	53,1%	50,3%
Occasionnellement	32,7%	37,8%
Jamais	14,3%	11,9%
Discothèques, bars ou cafés		
Régulièrement	16,0%	10,5%
Occasionnellement	39,3%	35,0%
Jamais	44,8%	54,5%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)		
Régulièrement	6,6%	4,2%
Occasionnellement	25,9%	29,4%
Jamais	67,5%	66,4%
Saunas		
Régulièrement	8,0%	8,4%
Occasionnellement	24,0%	15,4%
Jamais	68,0%	76,2%
Associations culturelles ou de loisir		
Régulièrement	5,6%	3,5%
Occasionnellement	20,5%	14,7%
Jamais	73,8%	81,8%
Peep show / sex shop		
Régulièrement	2,2%	2,8%
Occasionnellement	11,0%	7,7%
Jamais	86,8%	89,5%
Sex club / backroom		
Régulièrement	2,9%	2,8%
Occasionnellement	8,3%	9,1%
Jamais	88,8%	88,1%
Clubs échangistes		
Régulièrement	1,5%	2,1%
Occasionnellement	2,4%	0,7%
Jamais	96,2%	97,2%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)		
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	42,0%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	46,9%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	25,9%
<i>Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant</i>	N = 1 283	n = 37
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	67,6%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	27,0%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	5,4%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	35,0%
Moins d'une fois par mois	26,2%	31,5%
Une fois par mois	17,3%	14,0%
Une fois par semaine	15,7%	13,3%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	5,6%
Tous les jours ou presque	1,4%	0,7%
Cannabis		
Jamais	63,6%	68,5%
1 à 2 fois	12,2%	7,0%
3 à 9 fois	8,0%	6,3%
10 fois et plus	16,2%	18,2%
Poppers		
Jamais	75,2%	76,9%
1 à 2 fois	9,9%	12,6%
3 à 9 fois	6,2%	6,3%
10 fois et plus	8,6%	4,2%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	85,3%
1 à 2 fois	7,5%	7,7%
3 à 9 fois	6,2%	2,8%
10 fois et plus	6,3%	4,2%
Amphétamines		

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Jamais	90,1%	91,6%
1 à 2 fois	4,8%	0,7%
3 à 9 fois	2,6%	1,4%
10 fois et plus	2,6%	6,3%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	96,5%
1 à 2 fois	5,9%	2,1%
3 à 9 fois	2,3%	0,7%
10 fois et plus	1,4%	0,7%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	95,1%
1 à 2 fois	4,3%	2,8%
3 à 9 fois	2,2%	1,4%
10 fois et plus	1,9%	0,7%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	92,3%
1 à 2 fois	1,6%	1,4%
3 à 9 fois	0,8%	2,8%
10 fois et plus	3,0%	3,5%
MDMA		
Jamais	94,7%	99,3%
1 à 2 fois	3,5%	0,0%
3 à 9 fois	1,1%	0,0%
10 fois et plus	0,6%	0,7%
GHB		
Jamais	95,2%	98,6%
1 à 2 fois	2,7%	0,7%
3 à 9 fois	1,2%	0,0%
10 fois et plus	0,9%	0,7%
Kétamine		
Jamais	97,5%	98,6%
1 à 2 fois	1,4%	0,7%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,7%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	98,6%
1 à 2 fois	1,0%	0,7%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,7%
Crack		
Jamais	98,6%	97,9%
1 à 2 fois	0,9%	0,7%
3 à 9 fois	0,2%	0,0%
10 fois et plus	0,4%	1,4%
Héroïne		
Jamais	99,6%	98,6%
1 à 2 fois	0,1%	0,0%
3 à 9 fois	0,1%	0,7%
10 fois et plus	0,2%	0,7%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	56,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 25
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 81
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	57,3%
Dans des soirées / établissements	24,0%	16,4%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	9,1%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	3,6%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	2,7%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	1,8%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	8,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 12
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	75,0%
Contre des services	15,0%	25,0%
Contre des cadeaux	13,8%	16,7%
Contre de la drogue	8,3%	8,3%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	16,7%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	25,0%
Compensation proposée	49,2%	66,7%
Autres configurations	12,8%	8,3%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 3
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	0,0%
Non	76,6%	100,0%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 3
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	6,00 ± 8,66
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	42,00 ± 22,11
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	33,3%
Plus âgés	69,4%	66,7%
D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	33,3%
Bisexuels	28,2%	33,3%
Hétérosexuels	9,7%	0,0%
Ne sait pas	15,3%	33,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	100,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	0,0%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	33,3%
Par des sites spécialisés	13,7%	33,3%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	33,3%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	33,3%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 3
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	0,0%

Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	66,7%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	0,0%
Relation anale	73,2%	33,3%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	100,0%
Régulièrement	30,0%	100,0%
Consentie sans conditions	51,0%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	0,0%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	0,0%
Non	52,2%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	100,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 8
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe	3,98 ± 4,82	5,50 ± 9,93

		(moyenne ± écart-type)	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)		29,17 ± 8,58	31,25 ± 14,33
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	87,5%
	Environ du même âge	15,4%	0,0%
	Plus âgés	5,6%	12,5%
	D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	50,0%
	Bisexuels	24,8%	37,5%
	Hétérosexuels	5,6%	12,5%
	Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	12,5%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	87,5%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	37,5%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	12,5%
	Par des sites spécialisés	12,3%	25,0%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	12,5%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	12,5%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	25,0%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	12,5%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	12,5%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 8
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	25,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	12,5%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	25,0%
Relation anale	49,7%	37,5%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 3
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	33,3%
Régulièrement	25,6%	0,0%
Consentie sans conditions	59,6%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%

Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	0,0%
Non	69,6%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 3
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	33,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	33,6%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	27,3%
Non, jamais	29,7%	39,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 87
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	90,8%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	6,9%
Séropositif	7,0%	1,1%
En attente des résultats	2,0%	1,1%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 56
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	71,4%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	7,1%
Pense être séropositif	2,5%	1,8%
Ne veut pas savoir	15,8%	19,6%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	1,4%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	31,5%
Parfois	17,9%	15,4%
Toujours	38,7%	25,9%
Non concerné	21,2%	27,3%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	29,4%
Parfois	25,4%	20,3%
Toujours	28,8%	24,5%
Non concerné	20,9%	25,9%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	49,7%
Parfois	20,2%	13,3%
Toujours	12,4%	9,1%
Non concerné	22,2%	28,0%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	22,5%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	24,6%
Non, jamais	30,8%	38,0%
Ne sait pas	11,6%	14,8%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 68
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	0,0%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
Séronégatif	90,4%	94,1%
Ne sait pas	4,2%	5,9%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	6,3%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	3,5%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	1,4%
	Chlamydia	4,2%	1,4%
	Syphilis	3,0%	0,7%
	Herpès génital	2,8%	1,4%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,7%
	Hépatite B	1,0%	1,4%
	Hépatite A	0,9%	0,7%
	LGV	0,4%	0,7%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	73,0%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	73,8%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	6,4%
	Assez importante	53,4%	51,8%
	Très importante	32,4%	34,8%
	Extrêmement importante	9,1%	7,1%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 143 3,9%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	41,8%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	28,4%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	9,2%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	88,6%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	86,4%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	82,1%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	77,1%
	Je recherche les sensations fortes	40,7%	45,7%

Je prends des risques dans la vie | 34,8% 42,1%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	14,3%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	13,5%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	0,7%
Surpoids	17,4%	20,0%
Manières	10,6%	7,9%
VIH+	3,5%	0,0%
Origine ethnoculturelle	3,4%	0,7%
Identité de genre	2,1%	0,0%
Travail du sexe	1,5%	0,0%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 20
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	40,0%
Au travail	27,5%	30,0%
Dans le milieu gai	9,5%	15,0%
Sur Internet	25,5%	20,0%
Ailleurs ou en général	50,4%	40,0%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 28
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	28,6%
Au travail	13,4%	10,7%
Dans le milieu gai	55,0%	50,0%
Sur Internet	50,9%	60,7%
Ailleurs ou en général	34,8%	14,3%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 11
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	45,5%
Au travail	24,7%	18,2%
Dans le milieu gai	23,4%	18,2%
Sur Internet	24,1%	9,1%
Ailleurs ou en général	47,8%	45,5%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	0,0%
Au travail	31,4%	100,0%
Dans le milieu gai	28,9%	0,0%
Sur Internet	33,9%	0,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	0,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	n/a
Au travail	22,4%	n/a
Dans le milieu gai	17,1%	n/a
Sur Internet	35,5%	n/a
Ailleurs ou en général	40,8%	n/a

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	12,7%	n/a
Dans le milieu gai	45,2%	n/a
Sur Internet	46,0%	n/a
Ailleurs ou en général	43,7%	n/a

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe</i>	N = 54	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	14,8%	n/a
Dans le milieu gai	27,8%	n/a
Sur Internet	40,7%	n/a
Ailleurs ou en général	40,7%	n/a

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	42,1%
Relations de couple	27,2%	32,9%
Rupture d'une relation	22,1%	29,3%
Relations familiales	21,4%	31,4%
Recherche d'amis	18,0%	32,1%
Violence dans le couple	3,0%	5,7%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	34,3%
Dépression	20,0%	21,4%
Troubles de l'alimentation	18,5%	23,6%
VIH	5,2%	5,0%
Hépatite C	1,6%	2,9%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	42,1%
Solitude / isolement	22,7%	37,1%
<i>Coming out</i>	11,9%	21,4%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	22,1%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	12,1%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	10,1%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	2,9%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	37,9%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	31,4%
Sexualité compulsive	16,0%	28,6%
Tabagisme	15,4%	18,6%
Consommation d'alcool	7,8%	12,9%
Consommation de drogues	5,1%	11,4%
Jeu compulsif	1,3%	3,6%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 143
Proportion de l'échantillon	100%	3,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	25,0%
Prévention VIH	19,5%	17,9%
Dépistage VIH	19,1%	17,9%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	16,4%
Traitement des ITSS	11,8%	10,0%

Côte-Nord

Les habitants de la Côte-Nord représentent moins du centième de l'échantillon total de l'étude (n = 31) et ont une médiane d'âge de 26 ans. Ils ont surtout été recrutés via Facebook (tableau 1.1). Une proportion plus grande de l'échantillon est identifiée comme appartenant au groupe culturel des Premières Nations (tableau 1.2). Ils sont moins nombreux à avoir complété des études universitaires et à déclarer un revenu annuel de 30 000\$ et plus. Ils travaillent plus souvent à temps plein et à temps partiel (tableau 1.3). Au niveau de leur état matrimonial, une plus grande proportion d'entre eux se dit en relation avec une femme (tableau 1.4) et une plus petite proportion dit habiter en colocation ou avec des amis (tableau 1.5). La moyenne d'âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme est inférieure de 3 ans à la moyenne nationale, ce qui peut s'expliquer par une médiane d'âge inférieure à l'ensemble de l'échantillon chez ces hommes. Ceux-ci alors sont aussi plus nombreux à se dire d'orientation bisexuelle (tableau 1.6). Ils sont moins nombreux à avoir le sentiment de faire partie de la communauté ou du milieu gais, en plus d'avoir moins dévoilé leur orientation sexuelle à l'entourage. Leurs amis sont plus souvent hétérosexuels (tableau 1.7).

Du côté de leur accès à Internet, ils utilisent moins ce dernier pour des conseils médicaux ainsi que des informations sur la santé (tableau 2.3). Ils ont tous un compte sur les réseaux sociaux, échangent plus souvent plusieurs fois par jour et ont des amis plus souvent surtout hétérosexuels sur ces derniers (tableau 2.4). Ils sont plus nombreux à être dépendants au cybersexe (tableau 2.5).

Ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin au cours des 12 derniers mois ont en moyenne eu moins de partenaires et moins de relations sexuelles par partenaire. Ces partenaires étaient aussi en moyenne plus jeunes que ceux des Québécois au total (tableaux 3.1 et 3.2). Ils ont plus souvent pratiqué l'annilingus avec ces derniers et moins souvent, ont eu des pratiques alternatives. Ils ont moins utilisé régulièrement le condom lors des fellations, mais ont plus souvent pratiqué l'éjaculation d'eux-mêmes ou du partenaire dans la bouche de l'autre lors de cette même pratique (tableau 3.3). Ils ont moins pratiqué la pénétration anale avec ces derniers, mais lorsque pratiquée, cette dernière l'est plus souvent sans condom (tableau 3.4). Les partenaires de pratique sont plus souvent de statut séroinconnu (tableau 3.5).

Ceux ayant été en relation stable ou de couple ont eu un partenaire plus jeune, alors que la relation a plus souvent duré plusieurs semaines. La relation de couple dure encore au moment de répondre dans une plus petite proportion (tableau 4.1). Le partenaire a moins souvent été dépisté pour le VIH (tableau 4.2). Les répondants sont plus nombreux la pénétration anale avec lui et plus souvent, les répondants ne savent pas si celui-ci a eu d'autres partenaires sexuels durant la relation (tableaux 4.4 et 4.5).

Concernant la pratique de la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou barebacking), les répondants de cette région sont plus nombreux à avoir adopté cette pratique. Le plus souvent et dans le double de la proportion de l'échantillon total, cela a été fait dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels (tableau 5.1).

Au niveau de leurs espaces de rencontres, les Nord-Côtiers fréquentent plus souvent des établissements hétéros, des sexe-clubs et des associations culturelles et de loisir (tableau 6.1). Ceux ayant consommé au moins 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue lors de la dernière année étaient plus souvent dans des soirées ou établissements (tableau 7.2).

Ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont exclusivement échangé ces dernières contre de l'argent, et ont plus souvent reçu une compensation ou adopté une autre configuration d'échange (tableau 8.1).

Du point de vue de leur santé sexuelle, les hommes de cette région ont moins souvent été dépistés pour le VIH (tableau 9.1a). Ils discutent plus souvent de leur sérostatut avec le partenaire stable et avec la famille et les amis (9.2). Ils sont nettement moins nombreux à avoir contracté une ITSS au cours de la dernière année (tableau 9.4).

Du côté de leur santé mentale, ils sont moins nombreux à accorder de l'importance à l'apparence physique de leur partenaire et à être satisfaits de la leur (tableau 10.1). Par ailleurs, les répondants déclarent davantage aimer faire face à des défis, prendre des risques dans la vie, être satisfaits d'eux-mêmes et faire les choses aussi bien que les autres (tableau 10.2). Ils ont plus été discriminés à l'égard de leur surpoids ou de leurs manières (tableau 11.1). Du côté de leurs préoccupations, les Nord-Côtiers se sentent plus préoccupés par les troubles de l'alimentation (tableau 12.2).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	26
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	3,2%
	Facebook	38,7%	51,6%
	Sites de rencontre	52,0%	45,2%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	93,5%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	0,0%
	Né à l'étranger	6,9%	6,5%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	6,5%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	32,3%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	51,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	0,0%
	Études à temps plein	21,4%	25,8%
	Travail à temps partiel	17,5%	22,6%
	Travail à temps plein	46,2%	54,8%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	3,2%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	0,0%
	Congé de maladie	1,8%	3,2%
	Retraite	11,6%	3,2%
	Autre	2,3%	3,2%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 31 0,8%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	45,2%
	En relation avec un homme	28,8%	29,0%
	En relation avec une femme	6,1%	12,9%
	Divorcé	5,0%	3,2%
	Marié avec une femme	3,9%	0,0%
	Marié avec un homme	2,9%	6,5%
	En union civile avec un homme	2,8%	0,0%
	Séparé	1,7%	3,2%
	Veuf	0,9%	0,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	3,2%
Enfants			
	Non	80,6%	77,4%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	16,1%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	6,5%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 31 0,8%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	41,9%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	25,8%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	19,4%
	Habite en colocation/amis	14,0%	3,2%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	9,7%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	0,0%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	0,0%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	16,10 ± 3,85
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	67,7%
Surtout envers les hommes	16,0%	12,9%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	19,4%
Surtout envers les femmes	3,3%	0,0%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	74,2%
Surtout avec des hommes	11,0%	12,9%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	6,5%
Surtout avec des femmes	4,2%	6,5%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	77,4%
Bisexuelle	17,4%	22,6%
En questionnement	2,6%	0,0%
Hétérosexuelle	0,7%	0,0%
Queer	0,7%	0,0%
Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	64,5%
Oui	32,6%	22,6%
Ne sait pas	11,7%	12,9%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	61,3%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	61,3%
À la fratrie	61,5%	45,2%
Aux collègues de travail	52,5%	48,4%
Au médecin	48,7%	41,9%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	67,7%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	25,8%
Majoritairement homosexuel	9,7%	3,2%
Sans amis	2,1%	3,2%
Autres	1,1%	0,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	61,3%
Ordinateur portable	61,2%	77,4%
Téléphone mobile	49,2%	54,8%
Tablette	23,0%	29,0%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	6,5%
Télé numérique	4,3%	3,2%
Autres	0,7%	3,2%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	0,0%
6 à 12 mois	3,7%	9,7%
1 à 3 ans	16,8%	16,1%
4 à 6 ans	21,8%	16,1%
7 ans et plus	55,1%	58,1%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	6,20 ± 7,17 / 3,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	80,6%
Pour du contenu pornographique	58,5%	54,8%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	12,9%
Pour des raisons affectives	23,1%	6,5%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	12,9%
Pour du cybersexe	14,8%	16,1%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	3,2%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	0,0%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	100,0%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 31
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	64,5%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	19,4%
Plusieurs fois par mois	9,5%	6,5%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	9,7%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	61,3%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	38,7%
Majoritairement homosexuel	7,6%	0,0%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	67,7%
Rencontres en ligne	42,4%	41,9%
Interactions en ligne	34,0%	32,3%
Pornographie	30,2%	32,3%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	22,6%
Plutôt positif	41,7%	25,8%
Aucun effet	30,3%	35,5%
Plutôt négatif	11,5%	12,9%
Négatif	1,5%	3,2%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	90,3%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 28
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	5,54 ± 6,39 / 3,50
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	18,39 ± 26,91
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	3,52 ± 5,37
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	3,68 ± 5,74
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,68 ± 0,39

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 28
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	29,67 ± 11,74
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	55,6%
Plus jeunes	23,4%	14,8%
Plus âgés	20,3%	18,5%
D'âges variés	16,2%	11,1%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	70,4%
Bisexuels	20,1%	18,5%
Hétérosexuels	3,8%	11,1%
Ne sait pas	5,7%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	22,2%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	40,7%
Non (relation exclusive)	18,9%	33,3%
Non (pas en couple)	48,3%	25,9%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 28
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	85,2%
Se faire sucer	73,9%	70,4%
S'embrasser	69,0%	66,7%
Masturbation réciproque	67,9%	74,1%
Se masser	32,7%	29,6%
Se faire pénétrer	32,6%	37,0%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	40,7%
Pénétrer	26,5%	29,6%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	14,8%
Sexe en groupe	4,4%	3,7%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	25,9%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	0,0%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	3,7%
Fist-fucking	1,3%	0,0%
Urophilie	1,6%	0,0%
Scatophilie	0,3%	0,0%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	37,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	29,6%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 28
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	63,0%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	82,4%
Régulièrement	16,6%	29,4%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 14
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	64,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	42,9%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	6,5%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 2
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,26 ± 1,26 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	100,0%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	100,0%
Régulièrement	37,0%	64,7%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 2
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	50,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	0,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>			
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	48,4%
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	27,00 ± 11,09
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	60,0%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	46,7%
	Plusieurs mois	27,8%	33,3%
	Plusieurs semaines	10,0%	20,0%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	66,7%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>			
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
	Oui	63,0%	53,3%
	Non	18,7%	20,0%
	Ne sait pas	18,4%	26,7%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon		100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>			
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)			
		N = 1 183	n = 8

	Séronégatif	89,5%	100,0%
	Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
	Séropositif	6,6%	0,0%
	Ne sait pas	3,6%	0,0%
Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas		N = 701	n = 7
Statut sérologique du partenaire de couple (présumé par le répondant)			
	Séronégatif	66,5%	57,1%
	Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
	Séropositif	0,6%	0,0%
	Ne sait pas	30,5%	42,9%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 15
Relation anale avec le partenaire de couple		
	Oui	73,8%
	Non	86,7%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple	N = 1 387	n = 13
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
	Au moins une fois	78,6%
	Régulièrement	84,6%
		58,2%
		61,5%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 15
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
	Oui	32,6%
	Non	30,8%
	Non	45,8%
	Ne sait pas	38,5%
		21,6%
		30,8%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
	Non	66,3%
	Oui	58,0%
		33,7%
		42,0%

Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	6,5%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	9,7%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	25,8%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 2
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	100,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	100,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	0,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	0,0%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels	N = 436	n = 3
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	100,0%
Séroinconnu	67,7%	33,3%
Sérodivergent	24,9%	33,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	33,3%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	66,7%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	66,7%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	66,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	33,3%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	0,0%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	0,0%
En association avec la consommation de substances	32,0%	0,0%

À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	0,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	0,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels	N = 442	n = 8
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	85,7%
Séroinconnu	58,1%	62,5%
Sérodivergent	27,1%	42,9%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	50,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	85,7%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	75,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	25,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	62,5%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	37,5%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	37,5%
En association avec la consommation de substances	33,3%	12,5%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	50,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	25,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	28,6%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	14,3%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Lieux ou établissements « gais »		
Régulièrement	14,7%	9,7%
Occasionnellement	41,4%	32,3%
Jamais	43,9%	58,1%
Lieux ou établissements « mixtes »		
Régulièrement	7,8%	3,2%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Occasionnellement	29,0%	32,3%
Jamais	63,2%	64,5%
Lieux ou établissements « hétéros »		
Régulièrement	10,0%	19,4%
Occasionnellement	26,2%	32,3%
Jamais	63,8%	48,4%
Sites de rencontre sur Internet		
Régulièrement	53,1%	51,6%
Occasionnellement	32,7%	29,0%
Jamais	14,3%	19,4%
Discothèques, bars ou cafés		
Régulièrement	16,0%	22,6%
Occasionnellement	39,3%	32,3%
Jamais	44,8%	45,2%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)		
Régulièrement	6,6%	12,9%
Occasionnellement	25,9%	12,9%
Jamais	67,5%	74,2%
Saunas		
Régulièrement	8,0%	9,7%
Occasionnellement	24,0%	16,1%
Jamais	68,0%	74,2%
Associations culturelles ou de loisir		
Régulièrement	5,6%	6,5%
Occasionnellement	20,5%	25,8%
Jamais	73,8%	67,7%
Peep show / sex shop		
Régulièrement	2,2%	3,2%
Occasionnellement	11,0%	6,5%
Jamais	86,8%	90,3%
Sex club / backroom		
Régulièrement	2,9%	9,7%
Occasionnellement	8,3%	9,7%
Jamais	88,8%	80,6%
Clubs échangistes		
Régulièrement	1,5%	6,5%
Occasionnellement	2,4%	0,0%
Jamais	96,2%	93,5%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)		
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	41,9%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	58,1%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	35,5%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant	N = 1 283	n = 11
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	72,7%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	18,2%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	9,1%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	19,4%
Moins d'une fois par mois	26,2%	29,0%
Une fois par mois	17,3%	35,5%
Une fois par semaine	15,7%	9,7%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	6,5%
Tous les jours ou presque	1,4%	0,0%
Cannabis		
Jamais	63,6%	61,3%
1 à 2 fois	12,2%	19,4%
3 à 9 fois	8,0%	3,2%
10 fois et plus	16,2%	16,1%
Poppers		
Jamais	75,2%	87,1%
1 à 2 fois	9,9%	6,5%
3 à 9 fois	6,2%	3,2%
10 fois et plus	8,6%	3,2%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	83,9%
1 à 2 fois	7,5%	9,7%
3 à 9 fois	6,2%	6,5%
10 fois et plus	6,3%	0,0%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	90,3%
1 à 2 fois	4,8%	6,5%
3 à 9 fois	2,6%	0,0%
10 fois et plus	2,6%	3,2%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	87,1%
1 à 2 fois	5,9%	9,7%
3 à 9 fois	2,3%	0,0%

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 31 0,8%
10 fois et plus	1,4%	3,2%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	93,5%
1 à 2 fois	4,3%	0,0%
3 à 9 fois	2,2%	3,2%
10 fois et plus	1,9%	3,2%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	90,3%
1 à 2 fois	1,6%	0,0%
3 à 9 fois	0,8%	0,0%
10 fois et plus	3,0%	9,7%
MDMA		
Jamais	94,7%	93,5%
1 à 2 fois	3,5%	6,5%
3 à 9 fois	1,1%	0,0%
10 fois et plus	0,6%	0,0%
GHB		
Jamais	95,2%	93,5%
1 à 2 fois	2,7%	6,5%
3 à 9 fois	1,2%	0,0%
10 fois et plus	0,9%	0,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	96,8%
1 à 2 fois	1,4%	3,2%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	100,0%
1 à 2 fois	1,0%	0,0%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crack		
Jamais	98,6%	100,0%
1 à 2 fois	0,9%	0,0%
3 à 9 fois	0,2%	0,0%
10 fois et plus	0,4%	0,0%
Héroïne		
Jamais	99,6%	100,0%
1 à 2 fois	0,1%	0,0%
3 à 9 fois	0,1%	0,0%
10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	58,1%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 3
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 18
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	60,7%
Dans des soirées / établissements	24,0%	32,1%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	10,7%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	3,6%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	7,1%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	0,0%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	9,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 3
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	100,0%
Contre des services	15,0%	0,0%
Contre des cadeaux	13,8%	0,0%
Contre de la drogue	8,3%	0,0%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	66,7%
Compensation proposée	49,2%	0,0%
Autres configurations	12,8%	33,3%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 2
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	0,0%
Non	76,6%	100,0%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	3,00 ± 2,83
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	26,50 ± 12,02
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	50,0%
Plus âgés	69,4%	50,0%
D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	50,0%
Bisexuels	28,2%	50,0%
Hétérosexuels	9,7%	0,0%
Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	100,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	50,0%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	50,0%
Par des sites spécialisés	13,7%	50,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	50,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	50,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	50,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	50,0%

Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	50,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	0,0%
Relation anale	73,2%	100,0%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 2
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	50,0%
Régulièrement	30,0%	50,0%
Consentie sans conditions	51,0%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	100,0%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	50,0%
Non	52,2%	50,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 90	n = 2
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	0,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe	3,98 ± 4,82	±

	(moyenne ± écart-type)		
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)		29,17 ± 8,58	±
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	
	Environ du même âge	15,4%	
	Plus âgés	5,6%	
	D'âges variés	3,1%	
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	
	Bisexuels	24,8%	
	Hétérosexuels	5,6%	
	Ne sait pas	11,2%	
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	
	Par des sites spécialisés	12,3%	
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	
Relation anale	49,7%	
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	
Régulièrement	25,6%	
Consentie sans conditions	59,6%	
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	
Imposée sans consentement	4,3%	

Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels	
Oui	27,8%
Non	69,6%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	29,0%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	22,6%
Non, jamais	29,7%	48,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 16
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	93,8%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	0,0%
Séropositif	7,0%	0,0%
En attente des résultats	2,0%	0,0%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	6,3%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 15
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	66,7%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	6,7%
Pense être séropositif	2,5%	6,7%
Ne veut pas savoir	15,8%	20,0%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	0,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	12,9%
Parfois	17,9%	22,6%
Toujours	38,7%	38,7%
Non concerné	21,2%	25,8%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	22,6%
Parfois	25,4%	16,1%
Toujours	28,8%	35,5%
Non concerné	20,9%	25,8%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	32,3%
Parfois	20,2%	32,3%
Toujours	12,4%	6,5%
Non concerné	22,2%	29,0%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	25,8%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	19,4%
Non, jamais	30,8%	29,0%
Ne sait pas	11,6%	25,8%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 14
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	0,0%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
Séronégatif	90,4%	100,0%
Ne sait pas	4,2%	0,0%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 31 0,8 %
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	3,2%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	0,0%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	0,0%
	Chlamydia	4,2%	3,2%
	Syphilis	3,0%	0,0%
	Herpès génital	2,8%	0,0%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,0%
	Hépatite B	1,0%	0,0%
	Hépatite A	0,9%	0,0%
	LGV	0,4%	0,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 31 0,8%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	61,3%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	77,4%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	6,5%
	Assez importante	53,4%	54,8%
	Très importante	32,4%	29,0%
	Extrêmement importante	9,1%	9,7%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 31 0,8%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	41,9%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	32,3%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	16,1%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	90,3%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	96,8%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	83,9%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	83,9%
	Je recherche les sensations fortes	40,7%	41,9%

Je prends des risques dans la vie | 34,8% 41,9%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	22,6%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	19,4%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	0,0%
Surpoids	17,4%	22,6%
Manières	10,6%	16,1%
VIH+	3,5%	3,2%
Origine ethnoculturelle	3,4%	0,0%
Identité de genre	2,1%	3,2%
Travail du sexe	1,5%	0,0%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 7
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	57,1%
Au travail	27,5%	28,6%
Dans le milieu gai	9,5%	0,0%
Sur Internet	25,5%	28,6%
Ailleurs ou en général	50,4%	42,9%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 7
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	14,3%
Au travail	13,4%	14,3%
Dans le milieu gai	55,0%	57,1%
Sur Internet	50,9%	42,9%
Ailleurs ou en général	34,8%	42,9%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	20,0%
Au travail	24,7%	40,0%
Dans le milieu gai	23,4%	0,0%
Sur Internet	24,1%	0,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	60,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	n/a
Au travail	31,4%	n/a
Dans le milieu gai	28,9%	n/a
Sur Internet	33,9%	n/a
Ailleurs ou en général	46,3%	n/a

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	100,0%
Au travail	22,4%	0,0%
Dans le milieu gai	17,1%	0,0%
Sur Internet	35,5%	0,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	0,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH	N = 126	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	0,0%
Dans le milieu gai	45,2%	0,0%
Sur Internet	46,0%	0,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	100,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	14,8%	n/a
Dans le milieu gai	27,8%	n/a
Sur Internet	40,7%	n/a
Ailleurs ou en général	40,7%	n/a

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	54,8%
Relations de couple	27,2%	41,9%
Rupture d'une relation	22,1%	35,5%
Relations familiales	21,4%	25,8%
Recherche d'amis	18,0%	22,6%
Violence dans le couple	3,0%	9,7%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	22,6%
Dépression	20,0%	16,1%
Troubles de l'alimentation	18,5%	35,5%
VIH	5,2%	3,2%
Hépatite C	1,6%	0,0%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	41,9%
Solitude / isolement	22,7%	29,0%
<i>Coming out</i>	11,9%	16,1%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	16,1%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	9,7%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	3,2%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	0,0%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	32,3%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	41,9%
Sexualité compulsive	16,0%	29,0%
Tabagisme	15,4%	12,9%
Consommation d'alcool	7,8%	16,1%
Consommation de drogues	5,1%	3,2%
Jeu compulsif	1,3%	3,2%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 31
Proportion de l'échantillon	100%	0,8%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	32,3%
Prévention VIH	19,5%	25,8%
Dépistage VIH	19,1%	22,6%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	25,8%
Traitement des ITSS	11,8%	19,4%

Estrie

Les Estriens représentent 4% de l'échantillon total ($n = 147$) et leur médiane d'âge est de 36 ans. Ils ont été recrutés via des sites d'informations (tels que Fugues et Google ads) dans une plus grande proportion que l'ensemble de l'échantillon (tableau 1.1). Ces derniers sont aussi moins nombreux à avoir complété des études universitaires et à travailler à temps plein (tableau 1.3). Cependant, ils sont plus nombreux à habiter seuls (tableau 1.5). Ils sont plus nombreux à se dire homosexuels et à être attirés exclusivement par les hommes (tableau 1.6). Par ailleurs, ils sont plus nombreux à avoir dévoilé leur orientation sexuelle à leur entourage en général. Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Ils sont plus nombreux à utiliser Internet à des fins sociales et sexuelles depuis 7 ans et plus (tableau 2.2). Ils ont moins souvent un compte sur les réseaux sociaux et ont une fréquence d'échanges plus basse sur ces derniers. Leurs amis y sont plus souvent surtout hétérosexuels (tableau 2.4).

Du côté des partenaires occasionnels masculins, ils sont plus nombreux à en avoir eu au moins un au cours de la dernière année, quoiqu'en moyenne ils en aient eu un plus petit nombre total (tableau 3.1). Ces partenaires étaient plus souvent de leur âge et bisexuels (tableau 3.2). Au niveau de leurs pratiques sexuelles, ils se sont plus faits pénétrer et ont plus pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) (tableau 3.3). Ceux ayant pratiqué la pénétration anale sans condom l'ont plus souvent fait régulièrement, mais moins souvent avec partenaire séropositif (tableau 3.4). Chez ceux ayant eu au moins une partenaire occasionnelle féminine, malgré qu'ils soient peu nombreux ($n = 16$) le nombre moyen de partenaires est nettement supérieur à la moyenne nationale ($M = 12,63$; $ET = 39,41$ vs $M = 3,33$; $ET = 8,73$). Ces hommes ont également plus développé de sentiments envers ces partenaires et ont plus souvent eu des relations non protégées avec elles (tableau 3.6). Ces dernières sont plus souvent séronégatives (tableau 3.7).

Chez les hommes ayant eu un partenaire stable ou de couple sont plus souvent dans une relation qui dure encore au moment de répondre à l'enquête (tableau 4.1). Les partenaires ont moins souvent été dépistés pour le VIH (tableau 4.2). Ces répondants sont aussi plus nombreux à ce que le partenaire ait eu d'autres partenaires sexuels (tableau 4.5).

Ceux ayant pratiqué la RAISC avec des partenaires occasionnels ont moins souvent eu des partenaires sérodivergents (tableaux 5.3 et 5.4). Ceux l'ayant pratiquée dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels semblent prendre davantage de risques au niveau des comportements et contextes adoptés lors de la pratique (tableau 5.4).

Au niveau des lieux fréquentés dans le but de rencontrer, les Estriens fréquentent moins de lieux extérieurs (parcs, toilettes, etc.) et de saunas, mais ils fréquentent plus des associations culturelles ou de loisirs (tableau 6.1). Dans un autre ordre d'idées, les hommes de cette région sont moins nombreux à avoir consommé au moins 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue au cours des 12 derniers mois (tableaux 7.1 et 7.2).

Ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe sont près de deux fois plus nombreux à avoir reçu une compensation lors de ces échanges, et ont davantage échangé les relations sexuelles contre des services (tableau 8.1).

Par ailleurs, les Estriens sont moins nombreux à avoir été dépistés pour le VIH ou le VHC au cours des 12 derniers mois (tableaux 9.1 et 9.3). Au niveau de leur statut sérologique, ces participants sont plus nombreux à ne jamais entretenir de discussion avec les partenaires stables ainsi que les amis ou la famille (tableau 9.2).

Au niveau de l'apparence physique, les hommes de cette région sont plus nombreux à accorder de l'importance à l'apparence physique de leurs partenaires ainsi qu'à se dire satisfaits de la leur (tableau 10.1). Du côté de leur santé mentale, ils se sont moins sentis déprimés et recherchent moins les sensations fortes, mais ils sont plus nombreux à aimer faire face à des défis ainsi qu'à être satisfaits d'eux-mêmes dans l'ensemble (tableau 10.2).

Pour terminer, les Estriens semblent vivre moins de discriminations (tableau 11.1) et se disent plus préoccupés par leur *coming out*, la solitude et l'isolement (tableau 12.3) ainsi que la dépendance à Internet ou aux images érotiques (tableau 12.4). Ils le sont moins par le traitement des ITSS (tableau 12.5).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	36
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	15,6%
	Facebook	38,7%	29,9%
	Sites de rencontre	52,0%	54,4%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	95,2%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	0,7%
	Né à l'étranger	6,9%	4,1%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	0,0%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	32,7%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	57,8%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	2,0%
	Études à temps plein	21,4%	23,1%
	Travail à temps partiel	17,5%	19,0%
	Travail à temps plein	46,2%	41,5%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	11,6%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	3,4%
	Congé de maladie	1,8%	0,7%
	Retraite	11,6%	13,6%
	Autre	2,3%	0,0%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	55,1%
	En relation avec un homme	28,8%	28,6%
	En relation avec une femme	6,1%	4,8%
	Divorcé	5,0%	8,2%
	Marié avec une femme	3,9%	2,0%
	Marié avec un homme	2,9%	4,1%
	En union civile avec un homme	2,8%	1,4%
	Séparé	1,7%	0,0%
	Veuf	0,9%	1,4%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,4%
Enfants			
	Non	80,6%	83,7%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	13,6%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	2,7%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	48,3%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	27,2%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	8,8%
	Habite en colocation/amis	14,0%	11,6%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	5,4%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	2,7%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	0,0%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,31 ± 7,14
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	77,6%
	Surtout envers les hommes	16,0%	10,2%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	7,5%
	Surtout envers les femmes	3,3%	3,4%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	1,4%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	81,6%
	Surtout avec des hommes	11,0%	9,5%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	4,1%
	Surtout avec des femmes	4,2%	4,8%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	84,4%
	Bisexuelle	17,4%	13,6%
	En questionnement	2,6%	0,0%
	Hétérosexuelle	0,7%	1,4%
	Queer	0,7%	0,7%
	Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	57,8%
	Oui	32,6%	26,5%
	Ne sait pas	11,7%	15,6%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	72,1%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	69,4%
	À la fratrie	61,5%	67,3%
	Aux collègues de travail	52,5%	50,3%
	Au médecin	48,7%	53,1%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	55,8%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	36,1%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	7,5%
	Sans amis	2,1%	0,7%
	Autres	1,1%	0,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	75,5%
	Ordinateur portable	61,2%	62,6%
	Téléphone mobile	49,2%	43,5%
	Tablette	23,0%	21,8%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	4,8%
	Télé numérique	4,3%	2,0%

Autres | 0,7% 0,0%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	3,4%
6 à 12 mois	3,7%	4,8%
1 à 3 ans	16,8%	9,5%
4 à 6 ans	21,8%	21,1%
7 ans et plus	55,1%	61,2%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	8,74 ± 12,32 / 6,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	63,3%
Pour du contenu pornographique	58,5%	55,1%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	28,6%
Pour des raisons affectives	23,1%	25,9%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	14,3%
Pour du cybersexe	14,8%	12,2%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	8,8%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	2,7%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	83,0%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 122
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	42,3%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	28,5%
Plusieurs fois par mois	9,5%	14,6%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	14,6%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	59,8%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	32,8%
Majoritairement homosexuel	7,6%	7,4%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	60,5%
	Rencontres en ligne	42,4%	44,9%
	Interactions en ligne	34,0%	35,4%
	Pornographie	30,2%	27,2%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	19,7%
	Plutôt positif	41,7%	34,0%
	Aucun effet	30,3%	34,7%
	Plutôt négatif	11,5%	9,5%
	Négatif	1,5%	2,0%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	93,2%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 137
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	5,93 ± 5,46 / 4,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	22,39 ± 38,88
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	7,16 ± 21,62
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	4,05 ± 4,64
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,67 ± 0,39

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 137
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	36,71 ± 12,30
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	47,4%
Plus jeunes	23,4%	16,3%
Plus âgés	20,3%	22,2%
D'âges variés	16,2%	14,1%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	60,0%
Bisexuels	20,1%	31,1%
Hétérosexuels	3,8%	5,9%
Ne sait pas	5,7%	3,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	25,2%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	29,8%
Non (relation exclusive)	18,9%	18,3%
Non (pas en couple)	48,3%	51,9%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 137
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	79,1%
Se faire sucer	73,9%	69,4%
S'embrasser	69,0%	67,9%
Masturbation réciproque	67,9%	71,6%
Se masser	32,7%	41,0%
Se faire pénétrer	32,6%	37,3%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	26,9%
Pénétrer	26,5%	29,9%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	18,7%
Sexe en groupe	4,4%	6,0%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	25,4%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	3,0%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	2,2%
Fist-fucking	1,3%	3,0%
Urophilie	1,6%	2,2%
Scatophilie	0,3%	0,0%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	4,5%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	27,6%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	25,4%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 137
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	67,9%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	63,7%
Régulièrement	16,6%	28,6%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 58
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	1,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	41,4%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	60,3%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	10,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 16
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	1,37 ± 13,24 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	50,0%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	81,3%
	Régulièrement	37,0%	42,4%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 13
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	76,9%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	0,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	53,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 79
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	37,05 ± 13,87
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	57,0%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	64,6%
	Plusieurs mois	27,8%	22,8%
	Plusieurs semaines	10,0%	12,7%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	82,3%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 79
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	48,1%
Non	18,7%	25,3%
Ne sait pas	18,4%	26,6%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 38
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	92,1%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	2,6%
Ne sait pas	3,6%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 41
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	58,5%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	2,4%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	39,0%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 79
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	77,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 61
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	82,0%
Régulièrement	58,2%	59,0%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 79
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	41,0%
Non	45,8%	36,1%
Ne sait pas	21,6%	23,0%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 140
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	65,4%
Oui	33,7%	34,6%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	8,8%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	12,2%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	13,6%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 13
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	75,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	84,6%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	66,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	69,2%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 18
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	81,3%
Séroinconnu	67,7%	62,5%
Sérodivergent	24,9%	6,7%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	29,4%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	56,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	70,6%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	40,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	20,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	94,4%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	58,8%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	20,0%
En association avec la consommation de substances	32,0%	12,5%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	6,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	6,3%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 20
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	87,5%
Séroinconnu	58,1%	56,5 %
Sérodivergent	27,1%	6,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	33,3%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	82,4%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	94,7%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	43,8%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	52,6%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	44,4%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	41,2%
En association avec la consommation de substances	33,3%	29,4%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	41,2%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	23,5%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	17,6%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	12,5%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	7,5%
	Occasionnellement	41,4%	44,2%
	Jamais	43,9%	48,3%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	7,5%
	Occasionnellement	29,0%	32,0%
	Jamais	63,2%	60,5%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	11,6%
	Occasionnellement	26,2%	29,9%
	Jamais	63,8%	58,5%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	55,8%
	Occasionnellement	32,7%	32,7%
	Jamais	14,3%	11,6%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	9,5%
	Occasionnellement	39,3%	44,9%
	Jamais	44,8%	45,6%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	8,2%
	Occasionnellement	25,9%	29,9%
	Jamais	67,5%	61,9%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	5,4%
	Occasionnellement	24,0%	16,3%
	Jamais	68,0%	78,2%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	6,8%
	Occasionnellement	20,5%	25,9%
	Jamais	73,8%	67,3%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,7%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	10,9%
	Jamais	86,8%	86,4%
	Régulièrement	2,9%	2,0%
Clubs échangistes	Occasionnellement	8,3%	6,8%
	Jamais	88,8%	91,2%
	Régulièrement	1,5%	2,7%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Occasionnellement	2,4%	0,7%
	Jamais	96,2%	96,6%
	Régulièrement	1,5%	2,7%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	44,2%
	Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	59,9%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	33,3%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 49
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
	Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	75,5%
	Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	14,3%
	Ne souhaite pas être identifié	7,3%	10,2%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	28,6%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	34,0%
	Une fois par mois	17,3%	16,3%
	Une fois par semaine	15,7%	10,9%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	8,8%
	Tous les jours ou presque	1,4%	1,4%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	67,3%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
1 à 2 fois	12,2%	12,2%
3 à 9 fois	8,0%	6,8%
10 fois et plus	16,2%	13,6%
Poppers		
Jamais	75,2%	76,2%
1 à 2 fois	9,9%	5,4%
3 à 9 fois	6,2%	9,5%
10 fois et plus	8,6%	8,8%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	86,4%
1 à 2 fois	7,5%	4,8%
3 à 9 fois	6,2%	4,8%
10 fois et plus	6,3%	4,1%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	89,8%
1 à 2 fois	4,8%	5,4%
3 à 9 fois	2,6%	2,7%
10 fois et plus	2,6%	2,0%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	93,9%
1 à 2 fois	5,9%	1,4%
3 à 9 fois	2,3%	3,4%
10 fois et plus	1,4%	1,4%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	90,5%
1 à 2 fois	4,3%	6,1%
3 à 9 fois	2,2%	2,0%
10 fois et plus	1,9%	1,4%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	97,3%
1 à 2 fois	1,6%	1,4%
3 à 9 fois	0,8%	0,7%
10 fois et plus	3,0%	0,7%
MDMA		
Jamais	94,7%	96,6%
1 à 2 fois	3,5%	2,0%
3 à 9 fois	1,1%	1,4%
10 fois et plus	0,6%	0,0%
GHB		
Jamais	95,2%	98,0%
1 à 2 fois	2,7%	0,7%
3 à 9 fois	1,2%	1,4%
10 fois et plus	0,9%	0,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	99,3%
1 à 2 fois	1,4%	0,0%
3 à 9 fois	0,6%	0,7%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	99,3%
1 à 2 fois	1,0%	0,0%
3 à 9 fois	0,5%	0,7%

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Crack	10 fois et plus	0,5%	0,0%
	Jamais	98,6%	96,6%
	1 à 2 fois	0,9%	0,7%
	3 à 9 fois	0,2%	1,4%
	10 fois et plus	0,4%	1,4%
Héroïne	Jamais	99,6%	99,3%
	1 à 2 fois	0,1%	0,0%
	3 à 9 fois	0,1%	0,0%
	10 fois et plus	0,2%	0,7%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
	Oui	58,7%	53,1%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
		N = 657	n = 27
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois			
	Oui	2,5%	3,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
		N = 2 988	n = 78
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À la maison ou en privé	63,5%	61,7%
	Dans des soirées / établissements	24,0%	20,8%
	Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	10,8%
	Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	4,2%
	Plusieurs produits simultanément	4,3%	0,8%
	Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	1,7%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe			
	Au moins une fois	9,0%	7,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>			
		N = 327	n = 11

Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle			
	Contre de l'argent	83,5%	72,7%
	Contre des services	15,0%	36,4%
	Contre des cadeaux	13,8%	18,2%
	Contre de la drogue	8,3%	0,0%
	Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe			
	Compensation reçue	37,9%	63,6%
	Compensation proposée	49,2%	18,2%
	Autres configurations	12,8%	18,2%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe		N = 124	n = 7
Activité représentant une large part du revenu			
	Oui	14,8%	14,3%
	Non	76,6%	71,4%
	Souhaite ne pas répondre	8,6%	14,3%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 7
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	3,57 ± 3,87
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	38,00 ± 14,60
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
	Plus jeunes	4,0%
	Environ du même âge	14,5%
	Plus âgés	69,4%
	D'âges variés	12,1%
	0,0%	0,0%
	14,3%	14,3%
	71,4%	71,4%
	14,3%	14,3%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
	Gais	46,8%
	Bisexuels	28,2%
	Hétérosexuels	9,7%
	Ne sait pas	15,3%
	71,4%	71,4%
	28,6%	28,6%
	0,0%	0,0%
	0,0%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
	Oui	4,8%
	28,6%	28,6%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%
	57,1%	57,1%
	À partir de réseaux sociaux	25,8%
	Par des sites spécialisés	13,7%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%
	28,6%	28,6%
	14,3%	14,3%
	14,3%	14,3%
	14,3%	14,3%

Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	14,3%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	14,3%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 7
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	14,3%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	57,1%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	57,1%
Relation anale	73,2%	71,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 5
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	40,0%
Régulièrement	30,0%	0,0%
Consentie sans conditions	51,0%	33,3%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	33,3%
Imposée sans consentement	14,3%	33,3%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	20,0%
Non	52,2%	80,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79ou90	n = 5
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	20,0%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	0,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	4,00 ± 1,41
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	22,00 ± 4,24
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	50,0%
Environ du même âge	15,4%	50,0%
Plus âgés	5,6%	0,0%
D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	100,0%
Bisexuels	24,8%	0,0%
Hétérosexuels	5,6%	0,0%
Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	50,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	100,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	0,0%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	0,0%
Par des sites spécialisés	12,3%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	50,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	0,0%
Relation anale	49,7%	100,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 2
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	100,0%
Régulièrement	25,6%	0,0%
Consentie sans conditions	59,6%	50,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	50,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	0,0%
Non	69,6%	50,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	50,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 2
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	50,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	29,3%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	37,4%
	Non, jamais	29,7%	33,3%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 98
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	84,7%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	7,1%
	Séropositif	7,0%	4,1%
	En attente des résultats	2,0%	2,0%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	2,0%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 49
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	83,7%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	4,1%
	Pense être séropositif	2,5%	2,0%
	Ne veut pas savoir	15,8%	10,2%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	0,7%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon		100%	4,0%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	29,4%
	Parfois	17,9%	17,0%
	Toujours	38,7%	34,5%
	Non concerné	21,2%	17,7%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	25,9%
	Parfois	25,4%	28,6%
	Toujours	28,8%	29,9%
	Non concerné	20,9%	15,6%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	54,4%
	Parfois	20,2%	17,7%
	Toujours	12,4%	9,5%
	Non concerné	22,2%	18,4%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	25,2%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	31,3%
	Non, jamais	30,8%	32,7%
	Ne sait pas	11,6%	10,9%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 83
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	2,4%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
	Séronégatif	90,4%	94,0%
	Ne sait pas	4,2%	3,6%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 147 4,0%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	12,2%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	2,7%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	1,4%
	Chlamydia	4,2%	5,4%
	Syphilis	3,0%	0,7%
	Herpès génital	2,8%	2,7%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,0%
	Hépatite B	1,0%	2,0%
	Hépatite A	0,9%	0,0%
	LGV	0,4%	0,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	76,6%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	91,0%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	4,8%
Assez importante	53,4%	56,6%
Très importante	32,4%	31,0%
Extrêmement importante	9,1%	7,6%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	40,7%
Je me suis senti déprimé	35,5%	29,0%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	11,0%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	91,0%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	89,0%
J'aime faire face à des défis	73,9%	82,8%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	77,2%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	33,8%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	31,7%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	19,4%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	18,6%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	3,4%
Surpoids	17,4%	9,7%
Manières	10,6%	6,9%
VIH+	3,5%	2,1%
Origine ethnoculturelle	3,4%	0,7%
Identité de genre	2,1%	1,4%
Travail du sexe	1,5%	0,0%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 28
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	21,4%
Au travail	27,5%	17,9%
Dans le milieu gai	9,5%	10,7%
Sur Internet	25,5%	42,9%
Ailleurs ou en général	50,4%	42,9%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 14
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	7,1%
Au travail	13,4%	0,0%
Dans le milieu gai	55,0%	57,1%
Sur Internet	50,9%	50,0%
Ailleurs ou en général	34,8%	35,7%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 10
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	20,0%
Au travail	24,7%	10,0%
Dans le milieu gai	23,4%	0,0%
Sur Internet	24,1%	30,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	50,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	0,0%
Au travail	31,4%	0,0%
Dans le milieu gai	28,9%	0,0%
Sur Internet	33,9%	100,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	0,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 2
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	0,0%
Dans le milieu gai	17,1%	0,0%
Sur Internet	35,5%	100,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	0,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	0,0%
Dans le milieu gai	45,2%	33,3%
Sur Internet	46,0%	0,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	66,7%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 0
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	n/a
Au travail	14,8%	n/a
Dans le milieu gai	27,8%	n/a
Sur Internet	40,7%	n/a
Ailleurs ou en général	40,7%	n/a

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	46,5%
Relations de couple	27,2%	36,1%
Rupture d'une relation	22,1%	29,2%
Relations familiales	21,4%	33,3%
Recherche d'amis	18,0%	38,9%
Violence dans le couple	3,0%	6,3%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	39,6%
Dépression	20,0%	35,4%
Troubles de l'alimentation	18,5%	25,0%
VIH	5,2%	4,9%
Hépatite C	1,6%	2,1%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	44,4%
Solitude / isolement	22,7%	41,0%
<i>Coming out</i>	11,9%	23,6%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	22,9%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	15,3%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	9,8%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,4%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	45,8%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	43,1%
Sexualité compulsive	16,0%	31,9%
Tabagisme	15,4%	24,3%
Consommation d'alcool	7,8%	22,2%
Consommation de drogues	5,1%	8,3%
Jeu compulsif	1,3%	6,3%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 147
Proportion de l'échantillon	100%	4,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	32,6%
Prévention VIH	19,5%	27,8%
Dépistage VIH	19,1%	28,5%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	28,5%
Traitement des ITSS	11,8%	11,8%

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Les hommes provenant de ces régions composent près de 3% de l'échantillon total (n = 99). La médiane d'âge est de 42 ans. Ils ont plus souvent été recrutés à partir de sites de rencontres (tableau 1.1). Ils ont moins souvent complété des études universitaires et déclarent un revenu d'au minimum 30 000\$ dans une plus petite proportion. Ils sont plus nombreux à travailler à temps partiel et nettement plus nombreux que l'ensemble de l'échantillon à être au chômage (tableau 1.3). Ils sont par ailleurs plus nombreux à être célibataires et à demeurer seuls (tableaux 1.4 et 1.5). Ils sont moins nombreux à sentir faire partie de la communauté gaie ainsi qu'à avoir dévoilé leur orientation à l'entourage en général. Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Dans un autre ordre d'idées, ils accèdent moins souvent à Internet via un ordinateur portable, un téléphone mobile ou une tablette (tableau 2.1). Ils sont également plus nombreux à l'utiliser pour accéder à du contenu pornographique ou pour du cybersexe (tableau 2.3) et ont un compte sur les réseaux sociaux dans une plus petite proportion (tableau 2.4). Au niveau de la fréquence d'échange sur ces réseaux, ils sont plus nombreux à échanger plusieurs fois par jour. Leurs amis sur ces réseaux sont plus souvent surtout hétérosexuels (tableau 2.4). Pour terminer, ils sont moins nombreux à se dire dépendants aux interactions en ligne, au cybersexe ou à la pornographie, mais plus nombreux à l'être face aux rencontres en ligne (tableau 9.6).

Globalement, les hommes ayant eu au moins un partenaire occasionnel au cours de l'année en rapportent un plus petit nombre moyen. Ils ont également moins souvent été rencontrés sur Internet (tableau 3.1). L'âge de ces partenaires est en moyenne inférieur à celui des partenaires occasionnels des répondants de l'échantillon total. Ces partenaires se présentaient moins souvent comme des gais et les répondants ont plus souvent développé des sentiments à leur égard (tableau 3.2). Au niveau des pratiques et comportements sexuels avec ces partenaires, les répondants sont plus nombreux à avoir sucé leurs partenaires, ainsi qu'à avoir pratiqué régulièrement l'éjaculation du répondant ou du partenaire dans la bouche de l'autre. Ils sont moins nombreux à avoir adopté des pratiques sexuelles alternatives (gang-bang, urophilie, scatophilie, fist fucking, BDSM) (tableau 3.3).

Moins d'hommes ont eu un partenaire stable ou de couple au cours de la dernière année et ceux en ayant eu un l'ont moins souvent rencontré sur Internet (tableau 4.1). Ils sont également plus nombreux à ce que la relation ait duré plus d'un an et à ce que cette dernière dure encore au moment de l'enquête (tableau 4.1). Les partenaires ont moins souvent été dépistés pour le VIH

(tableau 4.2). Par ailleurs, ces répondants sont plus nombreux à dire que leur partenaire de couple n'a pas eu d'autres partenaires sexuels (tableau 4.4).

Au niveau des relations anales intentionnellement sans condom (RAISC), ces hommes sont globalement moins nombreux à les avoir pratiquées et ce, surtout que ce soit avec des partenaires occasionnels uniquement, ou avec un partenaire de couple et des partenaires occasionnels à la fois (tableau 5.1). Parmi ceux ayant pratiqué la RAISC avec des partenaires occasionnels, davantage de prise de risque a été adoptée en regard du statut sérologique des partenaires avec qui la pratique a été partagée (tableaux 5.3 et 5.4).

Concernant leurs espaces de rencontres dans le but de rencontrer des partenaires potentiels, les hommes de ces régions fréquentent moins de lieux gays, de saunas ainsi que de bars, discothèques ou cafés (tableau 6.1). Ils sont moins nombreux à utiliser une application ou un site de rencontres utilisant la géolocalisation. Parmi ceux faisant cet usage, ils sont moins nombreux à y être identifiés (tableau 6.2).

Du côté de leur consommation de substances, ces hommes consomment moins souvent pour améliorer leurs performances ou sensations sexuelles (tableau 7.2).

Chez ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe, ils sont plus nombreux à avoir échangé les relations sexuelles contre des cadeaux, mais moins nombreux à avoir proposé une compensation (tableau 8.1).

Au niveau de leur santé sexuelle, les Bas-Laurentiens et Gaspésiens plus nombreux à n'avoir jamais été dépistés pour le VIH et parmi ceux dépistés, sont moins souvent séropositifs (tableau 9.1). Parmi ceux n'ayant jamais été dépistés à cet effet, ils sont plus nombreux à ne pas vouloir connaître leur statut sérologique. Ils sont aussi plus nombreux à ne pas discuter de leur statut avec leur entourage (tableau 9.2), à avoir été dépistés pour le VHC au cours des 12 derniers mois ou à avoir contracté au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois (tableau 9.4).

Au niveau de leur santé mentale, ils sont moins nombreux à aimer faire face à des défis et à être satisfaits d'eux-mêmes dans l'ensemble (tableau 10.2). Ils ont été discriminés à l'égard de leur orientation sexuelle ou de leurs manières dans une plus grande proportion (tableau 11.1). Pour finir, ils sont plus préoccupés par leur *coming out* (tableau 12.3), leur dépendance à Internet et leur consommation d'alcool (tableau 12.4).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	42
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	10,1%
	Facebook	38,7%	29,3%
	Sites de rencontre	52,0%	60,6%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	96,0%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	2,0%
	Né à l'étranger	6,9%	2,0%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	2,0%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	26,3%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	51,5%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	2,0%
	Études à temps plein	21,4%	19,2%
	Travail à temps partiel	17,5%	22,2%
	Travail à temps plein	46,2%	41,4%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	5,1%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	15,2%
	Congé de maladie	1,8%	2,0%
	Retraite	11,6%	8,1%
	Autre	2,3%	2,0%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	58,6%
	En relation avec un homme	28,8%	28,3%
	En relation avec une femme	6,1%	6,1%
	Divorcé	5,0%	5,1%
	Marié avec une femme	3,9%	4,0%
	Marié avec un homme	2,9%	1,0%
	En union civile avec un homme	2,8%	0,0%
	Séparé	1,7%	1,0%
	Veuf	0,9%	0,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,0%
Enfants			
	Non	80,6%	78,8%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	14,1%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	7,1%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	43,4%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	23,2%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	11,1%
	Habite en colocation/amis	14,0%	10,1%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	10,1%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	4,0%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	1,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	2,0%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,75 ± 8,11
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	70,7%
	Surtout envers les hommes	16,0%	18,2%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	7,1%
	Surtout envers les femmes	3,3%	3,0%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	1,0%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	79,8%
	Surtout avec des hommes	11,0%	14,1%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	4,0%
	Surtout avec des femmes	4,2%	2,0%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	78,8%
	Bisexuelle	17,4%	15,2%
	En questionnement	2,6%	4,0%
	Hétérosexuelle	0,7%	1,0%
	Queer	0,7%	1,0%
	Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	57,6%
	Oui	32,6%	25,3%
	Ne sait pas	11,7%	17,2%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	52,5%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	54,5%
	À la fratrie	61,5%	50,5%
	Aux collègues de travail	52,5%	41,4%
	Au médecin	48,7%	36,4%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	55,6%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	31,3%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	6,1%
	Sans amis	2,1%	6,1%
	Autres	1,1%	1,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	67,7%
	Ordinateur portable	61,2%	54,5%
	Téléphone mobile	49,2%	38,4%
	Tablette	23,0%	15,2%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	4,0%
	Télé numérique	4,3%	2,0%
	Autres	0,7%	0,0%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,0%
6 à 12 mois	3,7%	4,0%
1 à 3 ans	16,8%	17,2%
4 à 6 ans	21,8%	27,3%
7 ans et plus	55,1%	49,5%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	10,97 ± 10,74 / 10,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	65,7%
Pour du contenu pornographique	58,5%	66,7%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	33,3%
Pour des raisons affectives	23,1%	20,2%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	13,1%
Pour du cybersexe	14,8%	20,2%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	13,1%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	3,0%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	84,8%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 84
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	58,3%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	20,2%
Plusieurs fois par mois	9,5%	7,1%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	14,3%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	52,4%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	40,5%
Majoritairement homosexuel	7,6%	7,1%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	54,5%
	Rencontres en ligne	42,4%	48,5%
	Interactions en ligne	34,0%	29,3%
	Pornographie	30,2%	22,2%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	14,1%
	Plutôt positif	41,7%	40,4%
	Aucun effet	30,3%	32,3%
	Plutôt négatif	11,5%	13,1%
	Négatif	1,5%	0,0%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	86,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 86
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 4,00	4,41 ± 4,79 / 3,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	19,72 ± 41,79
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	7,32 ± 20,13
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	2,69 ± 3,68
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,59 ± 0,39

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 86
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	34,64 ± 12,78
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	35,3%
Plus jeunes	23,4%	24,7%
Plus âgés	20,3%	23,5%
D'âges variés	16,2%	16,5%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	63,5%
Bisexuels	20,1%	21,2%
Hétérosexuels	3,8%	5,9%
Ne sait pas	5,7%	9,4%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	30,6%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	32,1%
Non (relation exclusive)	18,9%	17,9%
Non (pas en couple)	48,3%	50,0%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 86
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	90,6%
Se faire sucer	73,9%	75,3%
S'embrasser	69,0%	69,4%
Masturbation réciproque	67,9%	62,4%
Se masser	32,7%	27,1%
Se faire pénétrer	32,6%	30,6%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	25,9%
Pénétrer	26,5%	29,4%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	7,1%
Sexe en groupe	4,4%	2,4%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	24,7%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	2,4%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	1,2%
Fist-fucking	1,3%	1,2%
Urophilie	1,6%	3,5%
Scatophilie	0,3%	1,2%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Condom pour fellation	6,7%	3,5%
	Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	30,6%
	Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	28,2%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
	Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 86
Relation anale avec partenaires occasionnels			
	Oui	71,7%	68,2%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels			
	Au moins une fois	57,5%	55,2%
	Régulièrement	16,6%	5,2%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
	Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
	<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 32
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif			
	Oui	12,6%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu			
	Oui	43,2%	43,8%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif			
	Oui	58,0%	43,8%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

		Total	Région
	Statut sérologique	N = 3 669	n = 99
	Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine			
	Oui	11,7%	7,1%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 7
Nombre de partenaires occasionnelles féminines			
	Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 /0,00	0,18 ± 0,96 /0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	57,1%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	42,9%
	Régulièrement	37,0%	34,7%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 3
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	33,3%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	0,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	46,5%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 46
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	37,07 ± 15,43
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	39,1%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	67,4%
	Plusieurs mois	27,8%	23,9%
	Plusieurs semaines	10,0%	8,7%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	80,4%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 46
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	39,1%
Non	18,7%	34,8%
Ne sait pas	18,4%	26,1%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 18
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	94,4%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	0,0%
Ne sait pas	3,6%	5,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 28
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	57,1%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	42,9%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 46
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	69,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 32
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	75,0%
Régulièrement	58,2%	50,0%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 46
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	34,4%
Non	45,8%	53,1%
Ne sait pas	21,6%	12,5%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	78,9%
Oui	33,7%	21,1%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	8,5%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	5,6%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	7,0%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 9
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	87,5%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	71,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	83,3%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	66,7%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 440	n = 6
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	100,0%
Séroinconnu	67,7%	75,0%
Sérodivergent	24,9%	25,0%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	75,0%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	85,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	100,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	100,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	37,5%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	0,0%
En association avec la consommation de substances	32,0%	37,5%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	60,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	37,5%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 9
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	100,0%
Séroinconnu	58,1%	45,0%
Sérodivergent	27,1%	37,5%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	45,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	62,5%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	90,0%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	50,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	55,6%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	33,3%
En association avec la consommation de substances	33,3%	44,4%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	45,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	55,6%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	45,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	33,3%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	8,1%
	Occasionnellement	41,4%	31,3%
	Jamais	43,9%	60,6%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	6,1%
	Occasionnellement	29,0%	27,3%
	Jamais	63,2%	66,7%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	10,1%
	Occasionnellement	26,2%	26,3%
	Jamais	63,8%	63,6%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	48,5%
	Occasionnellement	32,7%	35,4%
	Jamais	14,3%	16,2%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	14,1%
	Occasionnellement	39,3%	25,3%
	Jamais	44,8%	60,6%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	8,1%
	Occasionnellement	25,9%	22,2%
	Jamais	67,5%	69,7%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	4,0%
	Occasionnellement	24,0%	15,2%
	Jamais	68,0%	80,8%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	5,1%
	Occasionnellement	20,5%	17,2%
	Jamais	73,8%	77,8%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,0%

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	8,1%
	Jamais	86,8%	89,9%
Clubs échangistes	Régulièrement	2,9%	2,0%
	Occasionnellement	8,3%	10,1%
	Jamais	88,8%	87,9%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Régulièrement	1,5%	1,0%
	Occasionnellement	2,4%	1,0%
	Jamais	96,2%	98,0%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	38,4%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)		58,4%	43,4%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	24,2
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 24
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
	Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	70,8%
	Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	16,7%
	Ne souhaite pas être identifié	7,3%	12,5%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	31,3%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	27,3%
	Une fois par mois	17,3%	20,2%
	Une fois par semaine	15,7%	11,1%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	7,1%
	Tous les jours ou presque	1,4%	3,0%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	67,7%
	1 à 2 fois	12,2%	7,1%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
3 à 9 fois	8,0%	9,1%
10 fois et plus	16,2%	16,2%
Poppers		
Jamais	75,2%	80,8%
1 à 2 fois	9,9%	6,1%
3 à 9 fois	6,2%	2,0%
10 fois et plus	8,6%	11,1%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	83,8%
1 à 2 fois	7,5%	8,1%
3 à 9 fois	6,2%	3,0%
10 fois et plus	6,3%	5,1%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	97,0%
1 à 2 fois	4,8%	0,0%
3 à 9 fois	2,6%	2,0%
10 fois et plus	2,6%	1,0%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	96,0%
1 à 2 fois	5,9%	2,0%
3 à 9 fois	2,3%	1,0%
10 fois et plus	1,4%	1,0%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	97,0%
1 à 2 fois	4,3%	2,0%
3 à 9 fois	2,2%	0,0%
10 fois et plus	1,9%	1,0%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	94,9%
1 à 2 fois	1,6%	2,0%
3 à 9 fois	0,8%	2,0%
10 fois et plus	3,0%	1,0%
MDMA		
Jamais	94,7%	98,0%
1 à 2 fois	3,5%	1,0%
3 à 9 fois	1,1%	0,0%
10 fois et plus	0,6%	1,0%
GHB		
Jamais	95,2%	97,0%
1 à 2 fois	2,7%	2,0%
3 à 9 fois	1,2%	0,0%
10 fois et plus	0,9%	1,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	99,0%
1 à 2 fois	1,4%	0,0%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	1,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	99,0%
1 à 2 fois	1,0%	0,0%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	1,0%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Crack			
Jamais		98,6%	98,0%
1 à 2 fois		0,9%	0,0%
3 à 9 fois		0,2%	0,0%
10 fois et plus		0,4%	2,0%
Héroïne			
Jamais		99,6%	99,0%
1 à 2 fois		0,1%	0,0%
3 à 9 fois		0,1%	0,0%
10 fois et plus		0,2%	1,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	54,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>		
	N = 657	n = 10
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	10,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>		
	N = 2 988	n = 54
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	65,4%
Dans des soirées / établissements	24,0%	23,5%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	4,9%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	3,7%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	1,2%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	1,2%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 99 2,7%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	6,1%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>		
	N = 327	n = 6
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		

Contre de l'argent	83,5%	83,3%
Contre des services	15,0%	0,0%
Contre des cadeaux	13,8%	33,3%
Contre de la drogue	8,3%	0,0%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	33,3%
Compensation proposée	49,2%	33,3%
Autres configurations	12,8%	33,3%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 132	n = 2
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	0,0%
Non	76,6%	100,0%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	5,63 ± 5,40
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	33,00 ± 12,12
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	0,0%
Plus âgés	69,4%	100,0%
D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	50,0%
Bisexuels	28,2%	50,0%
Hétérosexuels	9,7%	0,0%
Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	100,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	100,0%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	0,0%
Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	0,0%

Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	0,0%
Relation anale	73,2%	50,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	0,0%
Régulièrement	30,0%	0,0%
Consentie sans conditions	51,0%	n/a
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	n/a
Imposée sans consentement	14,3%	n/a
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	n/a
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	0,0%
Non	52,2%	0,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	100,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	2,50 ± 2,12
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	45,00 ± n/d

Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	50,0%
	Environ du même âge	15,4%	0,0%
	Plus âgés	5,6%	50,0%
	D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	50,0%
	Bisexuels	24,8%	0,0%
	Hétérosexuels	5,6%	0,0%
	Ne sait pas	11,2%	50,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	0,0%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	100,0%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	0,0%
	Par des sites spécialisés	12,3%	0,0%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7 %
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	0,0%
Relation anale	49,7%	50,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	0,0%
Régulièrement	25,6%	0,0%
Consentie sans conditions	59,6%	n/a
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	n/a
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%

Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels			
	Oui	27,8%	0,0%
	Non	69,6%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel		2,5%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	27,3%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	25,3%
	Non, jamais	29,7%	47,5%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 52
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	86,5%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	1,9%
	Séropositif	7,0%	1,9%
	En attente des résultats	2,0%	7,7%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,9%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 47
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	70,2%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	4,3%
	Pense être séropositif	2,5%	4,3%
	Ne veut pas savoir	15,8%	23,4%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	0,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	28,3%

Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
	Parfois	17,9%	13,1%
	Toujours	38,7%	36,4%
	Non concerné	21,2%	22,2%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	33,3%
	Parfois	25,4%	25,3%
	Toujours	28,8%	23,2%
	Non concerné	20,9%	18,2%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	49,5%
	Parfois	20,2%	13,1%
	Toujours	12,4%	12,1%
	Non concerné	22,2%	25,3%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	19,2%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	24,2%
	Non, jamais	30,8%	40,4%
	Ne sait pas	11,6%	16,2%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 43
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	2,3%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
	Séronégatif	90,4%	90,7%
	Ne sait pas	4,2%	7,0%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon		100%	2,7%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	3,0%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	2,0%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	2,0%
	Chlamydia	4,2%	2,0%
	Syphilis	3,0%	1,0%
	Herpès génital	2,8%	2,0%
	Gonococcie rectale	1,0%	1,0%
	Hépatite B	1,0%	1,0%
	Hépatite A	0,9%	1,0%
	LGV	0,4%	1,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	70,7%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	82,8%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	9,1%
Assez importante	53,4%	54,5%
Très importante	32,4%	26,3%
Extrêmement importante	9,1%	10,1%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	45,5%
Je me suis senti déprimé	35,5%	34,3%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	10,1%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	88,9%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	88,9%
J'aime faire face à des défis	73,9%	64,6%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	68,7%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	39,4%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	30,3%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	34,3%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	22,2%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	4,0%
Surpoids	17,4%	15,2%
Manières	10,6%	16,2%
VIH+	3,5%	2,0%
Origine ethnoculturelle	3,4%	4,0%
Identité de genre	2,1%	4,0%

Travail du sexe | 1,5% 3,0%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 34
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	26,5%
Au travail	27,5%	32,4%
Dans le milieu gai	9,5%	2,9%
Sur Internet	25,5%	23,5%
Ailleurs ou en général	50,4%	44,1%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 15
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	13,3%
Au travail	13,4%	26,7%
Dans le milieu gai	55,0%	33,3%
Sur Internet	50,9%	53,3%
Ailleurs ou en général	34,8%	53,3%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 16
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	31,3%
Au travail	24,7%	6,3%
Dans le milieu gai	23,4%	12,5%
Sur Internet	24,1%	25,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	62,5%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	25,0%
Au travail	31,4%	50,0%
Dans le milieu gai	28,9%	25,0%
Sur Internet	33,9%	50,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	50,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	50,0%
Dans le milieu gai	17,1%	25,0%
Sur Internet	35,5%	50,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	0,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 2
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	100,0%
Dans le milieu gai	45,2%	50,0%
Sur Internet	46,0%	50,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	0,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe</i>	N = 54	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	33,3%
Dans le milieu gai	27,8%	33,3%
Sur Internet	40,7%	66,7%
Ailleurs ou en général	40,7%	0,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	39,8%
Relations de couple	27,2%	36,7%
Rupture d'une relation	22,1%	22,4%
Relations familiales	21,4%	30,6%
Recherche d'amis	18,0%	34,7%
Violence dans le couple	3,0%	5,1%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	39,2%
Dépression	20,0%	30,9%
Troubles de l'alimentation	18,5%	21,6%
VIH	5,2%	3,1%
Hépatite C	1,6%	3,1%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	39,2%
Solitude / isolement	22,7%	36,1%
<i>Coming out</i>	11,9%	23,7%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	22,7%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	17,5%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	13,4%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	4,1%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	40,2%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	38,1%
Sexualité compulsive	16,0%	27,8%
Tabagisme	15,4%	22,7%
Consommation d'alcool	7,8%	22,7%
Consommation de drogues	5,1%	11,3%
Jeu compulsif	1,3%	5,2%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 99
Proportion de l'échantillon	100%	2,7%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	19,6%
Prévention VIH	19,5%	26,4%
Dépistage VIH	19,1%	16,5%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	14,4%
Traitement des ITSS	11,8%	7,2%

Lanaudière

Les Lanaudois composent environ le vingtième de l'échantillon total ($n = 195$) et ont une médiane d'âge de 32,5 ans. Ils ont moins souvent été recrutés sur Facebook que l'ensemble des Québécois (tableau 1.1). Ils sont moins nombreux à avoir complété des études universitaires ainsi qu'à déclarer un revenu annuel d'au moins 30 000\$. Ils sont plus souvent aux études à temps plein, alors qu'ils travaillent moins souvent à temps plein (tableau 1.3). Dans près du double de la proportion nationale, ils demeurent chez leurs parents, alors qu'ils demeurent moins souvent seuls (tableau 1.4). Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Les répondants de cette région utilisent Internet moins souvent pour rechercher des aventures sexuelles ou du contenu pornographique (tableau 2.3). Ils sont moins nombreux à utiliser des applications ou sites de rencontres gais géolocalisants (tableau 2.5). Ils se disent aussi moins dépendants aux interactions en ligne (tableau 2.6).

Du côté de ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin au cours des 12 derniers mois, ils ont en moyenne moins de relations sexuelles par partenaire (tableau 3.1). Ils sont plus nombreux à ce que ces partenaires aient régulièrement éjaculé dans leur bouche lorsqu'ils ont pratiqué la fellation (tableau 3.3).

Dans un autre ordre d'idées, ils sont plus nombreux à avoir eu un partenaire stable ou de couple au cours des 12 derniers mois, alors que la relation a plus souvent duré plusieurs semaines (tableau 4.1). Parmi les partenaires dépistés pour le VIH, le statut sérologique est plus souvent séronégatif (tableau 4.3). Les répondants ont moins souvent pratiqué la pénétration anale avec ce type de partenaire (tableau 4.4). Le partenaire de couple a moins souvent eu d'autres partenaires sexuels en même temps que la relation stable s'est poursuivie (tableau 4.5). Ceux ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) uniquement dans le cadre d'un couple ont plus souvent éjaculé dans leur partenaire sans se retirer (tableau 5.2). Les répondants ayant adopté cette pratique à la fois avec le partenaire de couple et les partenaires occasionnels ont plus souvent eu des partenaires sérodivergents (tableau 5.4). Les Lanaudois fréquentent moins d'espaces et de lieux dans le but de faire des rencontres (tableau 6.1).

En regard de leur santé sexuelle, ils sont plus nombreux à discuter de leur statut sérologique avec les amis ou la famille (tableau 9.2) et ont moins souvent été dépistés pour le VHC au cours des 12 derniers mois (tableau 9.3).

Du point de vue de leur santé psychologique, ils se sont moins sentis seuls (tableau 10.2), mais se sont plus souvent sentis discriminés à l'égard de leur orientation sexuelle (tableau 11.1). Parmi ces hommes, le sentiment de discrimination s'est davantage fait sentir à l'école ou sur Internet (tableau 11.2). Par ailleurs, ils sont plus préoccupés par leur coming out (tableau 12.3).

En résumé, les Lanaudois ne se distinguent pas particulièrement de l'échantillon total de la recherche, sauf en ce qui concerne une prise de risque sexuel moindre.

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	32,5
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	11,8%
	Facebook	38,7%	31,8%
	Sites de rencontre	52,0%	56,4%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	91,3%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	6,2%
	Né à l'étranger	6,9%	2,6%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	1,0%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	26,2%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	51,3%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	4,1%
	Études à temps plein	21,4%	27,2%
	Travail à temps partiel	17,5%	17,4%
	Travail à temps plein	46,2%	39,5%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	9,2%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	6,2%
	Congé de maladie	1,8%	0,5%
	Retraite	11,6%	13,8%
	Autre	2,3%	1,5%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	53,3%
	En relation avec un homme	28,8%	31,3%
	En relation avec une femme	6,1%	3,6%
	Divorcé	5,0%	5,6%
	Marié avec une femme	3,9%	2,6%
	Marié avec un homme	2,9%	3,6%
	En union civile avec un homme	2,8%	3,6%
	Séparé	1,7%	2,6%
	Veuf	0,9%	1,5%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,0%
Enfants			
	Non	80,6%	79,9%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	17,5%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	2,6%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	32,8%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	26,2%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	28,7%
	Habite en colocation/amis	14,0%	9,7%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	5,6%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	9,7%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,5%
	Autres	0,9%	1,0%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,43 ± 9,22
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	72,8%
	Surtout envers les hommes	16,0%	17,4%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	6,7%
	Surtout envers les femmes	3,3%	2,6%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,5%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	74,9%
	Surtout avec des hommes	11,0%	15,9%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	4,1%
	Surtout avec des femmes	4,2%	5,1%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	80,5%
	Bisexuelle	17,4%	14,9%
	En questionnement	2,6%	2,6%
	Hétérosexuelle	0,7%	2,1%
	Queer	0,7%	0,0%
	Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	52,3%
	Oui	32,6%	37,4%
	Ne sait pas	11,7%	10,3%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	66,7%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	66,7%
	À la fratrie	61,5%	63,6%
	Aux collègues de travail	52,5%	48,7%
	Au médecin	48,7%	45,1%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	52,8%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	35,4%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	7,7%
	Sans amis	2,1%	3,1%
	Autres	1,1%	1,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	73,3%
	Ordinateur portable	61,2%	64,1%
	Téléphone mobile	49,2%	48,7%
	Tablette	23,0%	22,6%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	6,7%
	Télé numérique	4,3%	5,6%

Autres | 0,7% 0,5%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	3,6%
6 à 12 mois	3,7%	3,1%
1 à 3 ans	16,8%	21,5%
4 à 6 ans	21,8%	30,3%
7 ans et plus	55,1%	41,5%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	9,66 ± 12,30 / 6,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	63,6%
Pour du contenu pornographique	58,5%	51,3%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	26,7%
Pour des raisons affectives	23,1%	26,7%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	18,5%
Pour du cybersexe	14,8%	15,9%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	14,9%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	1,5%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	85,6%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 167
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	43,7%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	31,1%
Plusieurs fois par mois	9,5%	11,4%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	13,8%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	52,1%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	37,7%
Majoritairement homosexuel	7,6%	10,2%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	61,0%
	Rencontres en ligne	42,4%	43,1%
	Interactions en ligne	34,0%	28,7%
	Pornographie	30,2%	31,3%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	14,4%
	Plutôt positif	41,7%	41,0%
	Aucun effet	30,3%	31,8%
	Plutôt négatif	11,5%	10,3%
	Négatif	1,5%	2,6%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	84,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 163
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	8,13 ± 21,44 / 3,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	17,68 ± 31,40
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	4,81 ± 11,05
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	4,48 ± 6,58
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,74 ± 0,36

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 163
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	32,83 ± 13,40
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	36,9%
Plus jeunes	23,4%	20,0%
Plus âgés	20,3%	20,6%
D'âges variés	16,2%	22,5%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	66,9%
Bisexuels	20,1%	23,1%
Hétérosexuels	3,8%	6,3%
Ne sait pas	5,7%	3,8%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	25,0%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	32,5%
Non (relation exclusive)	18,9%	18,8%
Non (pas en couple)	48,3%	48,7%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 163
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	82,9%
Se faire sucer	73,9%	71,1%
S'embrasser	69,0%	66,7%
Masturbation réciproque	67,9%	66,0%
Se masser	32,7%	39,0%
Se faire pénétrer	32,6%	30,2%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	27,0%
Pénétrer	26,5%	23,9%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	13,8%
Sexe en groupe	4,4%	5,7%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	28,3%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	3,1%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	1,3%
Fist-fucking	1,3%	1,9%
Urophilie	1,6%	1,3%
Scatophilie	0,3%	0,0%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	10,7%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	29,6%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	25,8%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 163
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	69,2%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	58,2%
Régulièrement	16,6%	16,4%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 64
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	12,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	43,8%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	56,3%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	11,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 22
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,22 ± 0,77 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	27,3%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	59,1%
	Régulièrement	37,0%	38,9%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 13
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	30,8%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	23,1%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	57,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 112
Âge du dernier partenaire de couple	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	35,32 ± 16,14
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple	Sur Internet	58,4%	56,3%
Durée de la dernière relation de couple	Plus d'un an	62,2%	58,0%
	Plusieurs mois	27,8%	26,8%
	Plusieurs semaines	10,0%	15,2%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	70,5%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 112
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	63,4%
Non	18,7%	21,4%
Ne sait pas	18,4%	15,2%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 71
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	95,8%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	1,4%
Ne sait pas	3,6%	2,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 41
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	68,3%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	31,7%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 112
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	67,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 75
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	76,0%
Régulièrement	58,2%	50,7%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 112
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	21,3%
Non	45,8%	60,0%
Ne sait pas	21,6%	18,7%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	68,8%
Oui	33,7%	31,2%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	8,2%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	13,8%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	9,2%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 16
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	81,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	56,3%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	75,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	57,1%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 27
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	95,2%
Séroinconnu	67,7%	68,0%
Sérodivergent	24,9%	19,0%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	36,4%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	38,5%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	61,5%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	65,2%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	96,3%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	50,0%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	38,5%
En association avec la consommation de substances	32,0%	30,8%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	29,6%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	37,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	12,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 18
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	100,0%
Séroinconnu	58,1%	61,1%
Sérodivergent	27,1%	37,5%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	25,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	62,5%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	76,5%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	60,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	76,5%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	94,4%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	47,1%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	0,0%
En association avec la consommation de substances	33,3%	31,3%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	18,8%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	18,8%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	0,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	0,0%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	15,9%
	Occasionnellement	41,4%	33,3%
	Jamais	43,9%	50,8%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	8,2%
	Occasionnellement	29,0%	23,2%
	Jamais	63,2%	68,6%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	10,3%
	Occasionnellement	26,2%	21,5%
	Jamais	63,8%	68,2%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	51,3%
	Occasionnellement	32,7%	36,4%
	Jamais	14,3%	12,3%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	17,9%
	Occasionnellement	39,3%	27,7%
	Jamais	44,8%	54,4%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	6,7%
	Occasionnellement	25,9%	26,2%
	Jamais	67,5%	67,2%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	4,6%
	Occasionnellement	24,0%	20,5%
	Jamais	68,0%	74,9%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	5,1%
	Occasionnellement	20,5%	16,4%
	Jamais	73,8%	78,5%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,1%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	11,8%
	Jamais	86,8%	86,2%
	Régulièrement	2,9%	2,1%
Clubs échangistes	Occasionnellement	8,3%	3,6%
	Jamais	88,8%	94,4%
	Régulièrement	1,5%	0,5%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Occasionnellement	2,4%	1,5%
	Jamais	96,2%	97,9%
	Régulièrement	1,5%	0,5%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	43,1%
	Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	48,7%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	28,7%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 56
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
	Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	75,0%
	Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	16,1%
	Ne souhaite pas être identifié	7,3%	8,9%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	38,5%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	28,2%
	Une fois par mois	17,3%	9,2%
	Une fois par semaine	15,7%	14,9%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	9,2%
	Tous les jours ou presque	1,4%	0,0%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	64,1%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
1 à 2 fois	12,2%	13,3%
3 à 9 fois	8,0%	4,1%
10 fois et plus	16,2%	18,5%
Poppers		
Jamais	75,2%	76,9%
1 à 2 fois	9,9%	11,3%
3 à 9 fois	6,2%	4,6%
10 fois et plus	8,6%	7,2%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	82,1%
1 à 2 fois	7,5%	7,7%
3 à 9 fois	6,2%	5,1%
10 fois et plus	6,3%	5,1%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	90,8%
1 à 2 fois	4,8%	4,1%
3 à 9 fois	2,6%	2,6%
10 fois et plus	2,6%	2,6%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	90,8%
1 à 2 fois	5,9%	5,1%
3 à 9 fois	2,3%	2,6%
10 fois et plus	1,4%	1,5%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	94,4%
1 à 2 fois	4,3%	2,1%
3 à 9 fois	2,2%	1,5%
10 fois et plus	1,9%	2,1%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	92,3%
1 à 2 fois	1,6%	2,1%
3 à 9 fois	0,8%	0,5%
10 fois et plus	3,0%	5,1%
MDMA		
Jamais	94,7%	97,4%
1 à 2 fois	3,5%	1,0%
3 à 9 fois	1,1%	0,5%
10 fois et plus	0,6%	1,0%
GHB		
Jamais	95,2%	95,4%
1 à 2 fois	2,7%	2,6%
3 à 9 fois	1,2%	1,5%
10 fois et plus	0,9%	0,5%
Kétamine		
Jamais	97,5%	97,9%
1 à 2 fois	1,4%	1,5%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,5%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	95,9%
1 à 2 fois	1,0%	1,5%
3 à 9 fois	0,5%	0,5%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Crack	10 fois et plus	0,5%	2,1%
	Jamais	98,6%	97,9%
	1 à 2 fois	0,9%	1,5%
	3 à 9 fois	0,2%	0,0%
	10 fois et plus	0,4%	0,5%
Héroïne	Jamais	99,6%	99,0 %
	1 à 2 fois	0,1%	0,5%
	3 à 9 fois	0,1%	0,5%
	10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
	Oui	58,7%	59,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
		N = 657	n = 31
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois			
	Oui	2,5%	3,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
		N = 2 988	n = 115
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À la maison ou en privé	63,5%	66,9%
	Dans des soirées / établissements	24,0%	25,2%
	Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	14,6%
	Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	7,3%
	Plusieurs produits simultanément	4,3%	7,3%
	Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,0%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe			
	Au moins une fois	9,0%	7,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>			
		N = 327	n = 14

Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle			
	Contre de l'argent	83,5%	78,6%
	Contre des services	15,0%	14,3%
	Contre des cadeaux	13,8%	14,3%
	Contre de la drogue	8,3%	14,3%
	Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	14,3%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe			
	Compensation reçue	37,9%	35,7%
	Compensation proposée	49,2%	42,9%
	Autres configurations	12,8%	21,4%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe		N = 124	n = 5
Activité représentant une large part du revenu			
	Oui	14,8%	16,7%
	Non	76,6%	66,7%
	Souhaite ne pas répondre	8,6%	16,7%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région	
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195	
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%	
Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 5	
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe			
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	8,33 ± 11,09	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	30,00 ± 7,72	
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	4,0%	16,7%
	Environ du même âge	14,5%	16,7%
	Plus âgés	69,4%	66,7%
	D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	46,8%	66,7%
	Bisexuels	28,2%	16,7%
	Hétérosexuels	9,7%	0,0%
	Ne sait pas	15,3%	16,7%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	50,0%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	0,0%
	À partir de réseaux sociaux	25,8%	33,3%
	Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	16,7%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	0,0%

Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 5
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	60,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	20,0%
Relation anale	73,2%	80,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 4
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	50,0%
Régulièrement	30,0%	25,0%
Consentie sans conditions	51,0%	33,3%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	33,3%
Imposée sans consentement	14,3%	33,3%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	25,0%
Non	52,2%	75,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79	n = 4
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	25,0%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	25,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 6
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	6,25 ± 3,86
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	33,75 ± 14,36
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	50,0%
Environ du même âge	15,4%	50,0%
Plus âgés	5,6%	0,0%
D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	75,0%
Bisexuels	24,8%	25,0%
Hétérosexuels	5,6%	0,0%
Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	50,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	25,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	25,0%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	0,0%
Par des sites spécialisés	12,3%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	25,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	25,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 6
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	25,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	25,0%
Relation anale	49,7%	25,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	100,0%
Régulièrement	25,6%	0,0%
Consentie sans conditions	59,6%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	100,0%
Non	69,6%	0,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	100,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	38,3%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	30,1%
	Non, jamais	29,7%	31,6%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 132
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	81,1%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	4,5%
	Séropositif	7,0%	9,8%
	En attente des résultats	2,0%	3,0%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,5%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 61
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	82,0%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	8,2%
	Pense être séropositif	2,5%	1,6%
	Ne veut pas savoir	15,8%	11,5%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	1,6%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon		100%	5,3%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	22,6%
	Parfois	17,9%	17,9%
	Toujours	38,7%	39,5%
	Non concerné	21,2%	20,0%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	25,1%
	Parfois	25,4%	20,0%
	Toujours	28,8%	33,3%
	Non concerné	20,9%	21,5%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	37,9%
	Parfois	20,2%	23,6%
	Toujours	12,4%	19,0%
	Non concerné	22,2%	19,5%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	23,6%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	28,7%
	Non, jamais	30,8%	32,3%
	Ne sait pas	11,6%	15,4%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 102
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	4,9%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,0%
	Séronégatif	90,4%	91,2%
	Ne sait pas	4,2%	3,9%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 195 5,3%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	12,4%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	4,1%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	5,2%
	Chlamydia	4,2%	6,2%
	Syphilis	3,0%	3,1%
	Herpès génital	2,8%	3,1%
	Gonococcie rectale	1,0%	1,6%
	Hépatite B	1,0%	2,6%
	Hépatite A	0,9%	2,6%
	LGV	0,4%	1,6%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	70,5%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	78,2%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	5,2%
Assez importante	53,4%	49,2%
Très importante	32,4%	35,2%
Extrêmement importante	9,1%	10,4%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	34,2%
Je me suis senti déprimé	35,5%	35,8%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	16,6%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	89,5%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	83,8%
J'aime faire face à des défis	73,9%	71,2%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	71,7%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	37,2%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	37,2%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	27,0%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	21,2%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	1,6%
Surpoids	17,4%	13,2%
Manières	10,6%	14,8%
VIH+	3,5%	2,1%
Origine ethnoculturelle	3,4%	2,6%
Identité de genre	2,1%	3,2%

Travail du sexe	1,5%	1,6%
-----------------	------	------

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 51
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	45,1%
Au travail	27,5%	19,6%
Dans le milieu gai	9,5%	5,9%
Sur Internet	25,5%	31,4%
Ailleurs ou en général	50,4%	41,2%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 25
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	24,0%
Au travail	13,4%	8,0%
Dans le milieu gai	55,0%	40,0%
Sur Internet	50,9%	60,0%
Ailleurs ou en général	34,8%	20,0%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 28
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	53,6%
Au travail	24,7%	28,6%
Dans le milieu gai	23,4%	7,1%
Sur Internet	24,1%	32,1%
Ailleurs ou en général	47,8%	35,7%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	40,0%
Au travail	31,4%	20,0%
Dans le milieu gai	28,9%	20,0%
Sur Internet	33,9%	20,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	40,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 6
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	33,3%
Au travail	22,4%	0,0%
Dans le milieu gai	17,1%	0,0%
Sur Internet	35,5%	16,7%
Ailleurs ou en général	40,8%	66,7%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	0,0%
Dans le milieu gai	45,2%	25,0%
Sur Internet	46,0%	50,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	75,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	0,0%
Dans le milieu gai	27,8%	66,7%
Sur Internet	40,7%	33,3%
Ailleurs ou en général	40,7%	0,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	42,3%
Relations de couple	27,2%	38,1%
Rupture d'une relation	22,1%	29,6%
Relations familiales	21,4%	34,4%
Recherche d'amis	18,0%	27,5%
Violence dans le couple	3,0%	5,3%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	39,7%
Dépression	20,0%	29,1%
Troubles de l'alimentation	18,5%	27,0%
VIH	5,2%	6,9%
Hépatite C	1,6%	3,7%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	43,9%
Solitude / isolement	22,7%	35,4%
<i>Coming out</i>	11,9%	20,6%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	20,6%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	15,9%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	7,9%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	3,2%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	41,5%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	30,3%
Sexualité compulsive	16,0%	28,2%
Tabagisme	15,4%	28,2%
Consommation d'alcool	7,8%	17,6%
Consommation de drogues	5,1%	12,8%
Jeu compulsif	1,3%	3,7%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 195
Proportion de l'échantillon	100%	5,3%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	29,3%
Prévention VIH	19,5%	24,5%
Dépistage VIH	19,1%	23,9%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	28,2%
Traitement des ITSS	11,8%	17,6%

Laurentides

Les Laurentiens représentent un peu plus du vingtième de l'échantillon (n = 219) et ont une médiane d'âge de 37 ans (tableau 1.1). Ils sont moins nombreux à avoir complété des études universitaires (tableau 1.3). Ils sont plus nombreux à se dire célibataires, à avoir des enfants ne demeurant pas avec eux (tableau 1.4) et à habiter en couple avec une femme (tableau 1.5). Une proportion plus petite d'entre eux a des comportements sexuels exclusivement envers les hommes, tandis qu'une plus grande se dit d'orientation bisexuelle (tableau 1.6). D'un autre côté, ils sont moins nombreux à avoir le sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gaie, à avoir déclaré leur orientation sexuelle à l'entourage et leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Au niveau de leurs comportements en ligne, ils échangent moins souvent plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux, alors que leurs amis y sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 2.4).

Ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin au cours des 12 derniers mois ont plus souvent eu des partenaires se présentant comme des bisexuels (tableau 3.2). Ceux ayant eu une partenaire occasionnelle féminine ont moins souvent développé des sentiments envers elles et ont plus souvent eu des relations non protégées avec ces dernières (tableau 3.6). Parmi ces répondants, les partenaires occasionnelles étaient plus souvent de statut séroinconnu (tableau 3.7).

Parmi les hommes ayant rapporté un partenaire stable ou de couple, les partenaires sont moins nombreux à s'être faits dépister pour le VIH (tableau 4.2). Les répondants de la région ayant été dans une relation stable sont plus nombreux à ne pas savoir si leur partenaire a eu d'autres partenaires sexuels durant la relation (tableau 4.5).

Ceux ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) indépendamment du type de partenaire l'ont moins souvent pratiquée avec les partenaires occasionnels uniquement (tableau 5.1). Les hommes l'ayant pratiquée dans le cadre d'un couple uniquement ont plus souvent pratiqué l'éjaculation (d'eux-mêmes ou du partenaire) sans se retirer lors de ces relations (tableau 5.2). Ceux l'ayant pratiquée avec les partenaires occasionnels uniquement ont plus souvent eu un partenaire de statut séroinconnu, sérodivergent au leur ou

dont ils n'ont pas voulu connaître le statut. De plus, davantage de contextes de pratique à risque ont été adoptés par ces hommes (tableau 5.3). Chez ceux ayant adopté la pratique dans le cadre de leur couple et avec des partenaires occasionnels, les partenaires étaient plus souvent de statut séroinconnu (tableau 5.4).

Du point de vue des lieux et établissements qu'ils fréquentent dans le but de rencontrer, les Laurentiens en fréquentent moins en général (tableau 6.1). Chez ceux utilisant les applications de rencontres permettant la géolocalisation, ils sont plus nombreux à y dévoiler leur identité partiellement, c'est-à-dire sans mettre de photo de leur visage ou sans permettre leur géolocalisation (tableau 6.2).

Parmi ceux ayant consommé au minimum 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue au cours des 12 derniers mois ont plus souvent consommé à la maison ou en privé (tableau 7.2).

D'un autre côté, ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont plus souvent échangé ces dernières contre des cadeaux, de la drogue ou de l'argent pour la drogue, de même qu'ils ont plus souvent reçu une compensation ou adopté une autre configuration d'échange (tableau 8.1).

Au niveau de leur santé sexuelle, les hommes provenant de cette région ont moins souvent été dépistés pour le VIH (tableau 9.1a) ou le VHC (tableau 9.3). Parmi ceux n'ayant jamais été dépistés pour le VIH, ils sont plus nombreux à ne plus être certains d'être séronégatifs ou à ne pas vouloir connaître leur statut (tableau 9.1a). Ils sont plus nombreux à ne jamais discuter de leur statut sérologique avec les partenaires occasionnels (tableau 9.2). Dans la moitié des cas des Québécois, ils ont contracté une autre ITSS au cours des 12 derniers mois (tableau 9.4).

Du côté de leur santé mentale, ils accordent moins d'importance à l'aspect physique de leurs partenaires et sont plus nombreux à croire que leur apparence est assez importante pour les autres (tableau 10.1). Pour terminer, ils se sentent moins préoccupés par la dépendance aux images érotiques ou à Internet (tableau 12.4) ainsi que leur santé sexuelle (tableau 12.5).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	37
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	11,0%
	Facebook	38,7%	35,3%
	Sites de rencontre	52,0%	53,7%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	92,2%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	4,6%
	Né à l'étranger	6,9%	3,2%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	1,4%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	25,6%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	54,8%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	4,1%
	Études à temps plein	21,4%	20,1%
	Travail à temps partiel	17,5%	13,2%
	Travail à temps plein	46,2%	46,1%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	11,4%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	3,7%
	Congé de maladie	1,8%	3,7%
	Retraite	11,6%	13,7%
	Autre	2,3%	2,3%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	45,7%
	En relation avec un homme	28,8%	27,4%
	En relation avec une femme	6,1%	7,8%
	Divorcé	5,0%	5,0%
	Marié avec une femme	3,9%	8,2%
	Marié avec un homme	2,9%	2,7%
	En union civile avec un homme	2,8%	4,1%
	Séparé	1,7%	4,6%
	Veuf	0,9%	0,9%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,8%
Enfants			
	Non	80,6%	73,1%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	22,8%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	4,1%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	32,9%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	21,9%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	18,7%
	Habite en colocation/amis	14,0%	11,0%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	14,6%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	5,5%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,5%
	Autres	0,9%	1,8%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,44 ± 7,79
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	65,8%
	Surtout envers les hommes	16,0%	16,0%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	13,2%
	Surtout envers les femmes	3,3%	4,6%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,5%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	70,8%
	Surtout avec des hommes	11,0%	13,7%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	10,0%
	Surtout avec des femmes	4,2%	5,5%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	73,1%
	Bisexuelle	17,4%	23,3%
	En questionnement	2,6%	1,8%
	Hétérosexuelle	0,7%	0,5%
	Queer	0,7%	0,9%
	Autres	0,6%	0,5%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	59,8%
	Oui	32,6%	25,6%
	Ne sait pas	11,7%	14,6%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	59,8%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	62,1%
	À la fratrie	61,5%	52,5%
	Aux collègues de travail	52,5%	45,2%
	Au médecin	48,7%	42,5%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	57,5%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	33,8%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	5,5%
	Sans amis	2,1%	1,8%
	Autres	1,1%	1,4%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	70,8%
	Ordinateur portable	61,2%	57,1%
	Téléphone mobile	49,2%	44,3%
	Tablette	23,0%	25,1%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	6,4%
	Télé numérique	4,3%	3,2%

Autres | 0,7% 0,9%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	4,6%
6 à 12 mois	3,7%	5,0%
1 à 3 ans	16,8%	19,2%
4 à 6 ans	21,8%	20,5%
7 ans et plus	55,1%	50,7%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	8,99 ± 13,04 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	58,4%
Pour du contenu pornographique	58,5%	59,8%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	31,5%
Pour des raisons affectives	23,1%	20,1%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	14,6%
Pour du cybersexe	14,8%	11,0%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	10,0%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	0,9%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	89,5%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 196
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	41,3%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	32,7%
Plusieurs fois par mois	9,5%	9,2%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	16,8%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	56,6%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	38,3%
Majoritairement homosexuel	7,6%	5,1%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	57,5%
	Rencontres en ligne	42,4%	39,3%
	Interactions en ligne	34,0%	38,4%
	Pornographie	30,2%	27,9%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	15,1%
	Plutôt positif	41,7%	40,4%
	Aucun effet	30,3%	33,0%
	Plutôt négatif	11,5%	11,0%
	Négatif	1,5%	0,5%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	88,1%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 193
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	8,05 ± 12,50 / 4,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	23,64 ± 43,01
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	6,59 ± 22,26
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	5,69 ± 10,78
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,67 ± 0,40

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 193
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	34,50 ± 13,01
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	37,8%
Plus jeunes	23,4%	21,8%
Plus âgés	20,3%	22,3%
D'âges variés	16,2%	18,1%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	57,5%
Bisexuels	20,1%	31,6%
Hétérosexuels	3,8%	2,6%
Ne sait pas	5,7%	8,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	23,3%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	33,7%
Non (relation exclusive)	18,9%	22,1%
Non (pas en couple)	48,3%	44,2%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 193
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	83,9%
Se faire sucer	73,9%	73,6%
S'embrasser	69,0%	60,6%
Masturbation réciproque	67,9%	70,5%
Se masser	32,7%	30,6%
Se faire pénétrer	32,6%	34,7%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	28,5%
Pénétrer	26,5%	24,9%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	13,0%
Sexe en groupe	4,4%	6,2%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	28,5%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	2,6%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	2,1%
Fist-fucking	1,3%	1,6%
Urophilie	1,6%	1,6%
Scatophilie	0,3%	0,0%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Condom pour fellation	6,7%	7,3%
	Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	23,8%
	Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	20,2%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
	Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 193
Relation anale avec partenaires occasionnels			
	Oui	71,7%	67,9%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels			
	Au moins une fois	57,5%	59,5%
	Régulièrement	16,6%	16,8%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
	Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
	<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 78
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif			
	Oui	12,6%	10,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu			
	Oui	43,2%	39,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif			
	Oui	58,0%	44,9%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

		Total	Région
	Statut sérologique	N = 3 669	n = 219
	Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine			
	Oui	11,7%	11,9%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 26
Nombre de partenaires occasionnelles féminines			
	Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,15 / 0,00	0,40 ± 1,93 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	23,1%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	69,2%
	Régulièrement	37,0%	38,8%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 18
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	5,6%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	55,6%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	27,8%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	55,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 121
Âge du dernier partenaire de couple	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	37,68 ± 15,06
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple	Sur Internet	58,4%	58,7%
Durée de la dernière relation de couple	Plus d'un an	62,2%	64,5%
	Plusieurs mois	27,8%	30,6%
	Plusieurs semaines	10,0%	5,0%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	74,4%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 121
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	54,5%
Non	18,7%	24,8%
Ne sait pas	18,4%	20,7%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 66
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	89,4%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	3,0%
Ne sait pas	3,6%	7,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 55
Statut sérologique du partenaire de couple (présumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	67,3%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	32,7%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 121
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	72,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 88
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	80,7%
Régulièrement	58,2%	55,7%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 121
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	34,1%
Non	45,8%	37,5%
Ne sait pas	21,6%	28,4%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	67,6%
Oui	33,7%	32,4%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	10,5%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	5,9%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	16,0%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 24
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	82,6%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	86,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	60,9%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	57,1%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 13
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	90,9%
Séroinconnu	67,7%	90,0%
Sérodivergent	24,9%	50,0%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	60,0%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	81,8%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	75,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	75,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	84,6%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	66,7%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	50,0%
En association avec la consommation de substances	32,0%	41,7%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	50,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	36,4%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	20,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 35
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	96,8%
Séroinconnu	58,1%	61,8%
Sérodivergent	27,1%	11,5%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	16,7%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	75,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	70,6%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	66,8%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	68,6%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	94,3%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	25,7%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	20,0%
En association avec la consommation de substances	33,3%	28,6%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	22,9%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	12,1%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	8,8%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	5,9%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	11,0%
	Occasionnellement	41,4%	38,8%
	Jamais	43,9%	50,2%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	6,8%
	Occasionnellement	29,0%	28,3%
	Jamais	63,2%	64,8%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	8,7%
	Occasionnellement	26,2%	26,9%
	Jamais	63,8%	64,4%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	51,1%
	Occasionnellement	32,7%	34,7%
	Jamais	14,3%	14,2%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	12,8%
	Occasionnellement	39,3%	37,4%
	Jamais	44,8%	49,8%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	6,8%
	Occasionnellement	25,9%	24,2%
	Jamais	67,5%	68,9%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	6,8%
	Occasionnellement	24,0%	23,7%
	Jamais	68,0%	69,4%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	5,9%
	Occasionnellement	20,5%	20,1%
	Jamais	73,8%	74,0%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,3%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	11,0%
	Jamais	86,8%	86,8%
	Régulièrement	2,9%	3,7%
Clubs échangistes	Occasionnellement	8,3%	8,2%
	Jamais	88,8%	88,1%
	Régulièrement	1,5%	2,7%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Occasionnellement	2,4%	0,9%
	Jamais	96,2%	96,3%
	Régulièrement	1,5%	2,7%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	44,7%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)		58,4%	52,1%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
Oui		35,2%	36,1%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 79
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
Oui, en mettant une photo du visage		77,2%	69,6%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé		15,5%	21,5%
Ne souhaite pas être identifié		7,3%	8,9%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
Jamais		30,9%	30,6%
Moins d'une fois par mois		26,2%	27,4%
Une fois par mois		17,3%	21,5%
Une fois par semaine		15,7%	11,0%
Plusieurs fois par semaine		8,4%	7,3%
Tous les jours ou presque		1,4%	2,3%
Cannabis			

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Jamais	63,6%	61,2%
1 à 2 fois	12,2%	11,0%
3 à 9 fois	8,0%	9,6%
10 fois et plus	16,2%	18,3%
Poppers		
Jamais	75,2%	80,4%
1 à 2 fois	9,9%	6,8%
3 à 9 fois	6,2%	4,6%
10 fois et plus	8,6%	8,2%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	79,9%
1 à 2 fois	7,5%	9,1%
3 à 9 fois	6,2%	5,9%
10 fois et plus	6,3%	5,0%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	87,2%
1 à 2 fois	4,8%	6,8%
3 à 9 fois	2,6%	4,6%
10 fois et plus	2,6%	1,4%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	86,3%
1 à 2 fois	5,9%	10,0%
3 à 9 fois	2,3%	1,8%
10 fois et plus	1,4%	1,8%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	94,1%
1 à 2 fois	4,3%	3,2%
3 à 9 fois	2,2%	1,4%
10 fois et plus	1,9%	1,4%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	90,0%
1 à 2 fois	1,6%	3,2%
3 à 9 fois	0,8%	0,5%
10 fois et plus	3,0%	6,4%
MDMA		
Jamais	94,7%	95,4%
1 à 2 fois	3,5%	2,7%
3 à 9 fois	1,1%	0,9%
10 fois et plus	0,6%	0,9%
GHB		
Jamais	95,2%	95,9%
1 à 2 fois	2,7%	2,7%
3 à 9 fois	1,2%	0,9%
10 fois et plus	0,9%	0,5%
Kétamine		
Jamais	97,5%	98,6%
1 à 2 fois	1,4%	1,4%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	99,1%
1 à 2 fois	1,0%	0,0%

		N = 3 669	n = 219
Région socio-sanitaire		100%	6,0%
Proportion de l'échantillon			
Crack	3 à 9 fois	0,5%	0,5%
	10 fois et plus	0,5%	0,5%
	Jamais	98,6%	99,5%
	1 à 2 fois	0,9%	0,5%
	3 à 9 fois	0,2%	0,0%
Héroïne	10 fois et plus	0,4%	0,0%
	Jamais	99,6%	100,0%
	1 à 2 fois	0,1%	0,0%
	3 à 9 fois	0,1%	0,0%
	10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
	Oui	58,7%	61,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
		N = 657	n = 41
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois			
	Oui	2,5%	2,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
		N = 2 988	n = 134
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À la maison ou en privé	63,5%	68,5%
	Dans des soirées / établissements	24,0%	21,9%
	Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	16,9%
	Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	2,2%
	Plusieurs produits simultanément	4,3%	2,8%
	Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,8%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe			
	Au moins une fois	9,0%	6,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>			
		N = 327	n = 15

Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle			
	Contre de l'argent	83,5%	73,3%
	Contre des services	15,0%	13,3%
	Contre des cadeaux	13,8%	26,4%
	Contre de la drogue	8,3%	13,3%
	Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	13,3%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe			
	Compensation reçue	37,9%	60,0%
	Compensation proposée	49,2%	13,3%
	Autres configurations	12,8%	26,7%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe		N = 124	n = 9
Activité représentant une large part du revenu			
	Oui	14,8%	11,1%
	Non	76,6%	55,6%
	Souhaite ne pas répondre	8,6%	33,3%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région	
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219	
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%	
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 9	
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe			
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	9,67 ± 15,72	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	33,33 ± 10,30	
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	4,0%	0,0%
	Environ du même âge	14,5%	33,3%
	Plus âgés	69,4%	66,7%
	D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	46,8%	44,4%
	Bisexuels	28,2%	44,4%
	Hétérosexuels	9,7%	11,1%
	Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	88,9%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	44,4%
	À partir de réseaux sociaux	25,8%	55,6%
	Par des sites spécialisés	13,7%	22,2%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	11,1%

Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	22,2%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	11,1%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	11,1%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 9
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	11,1%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	22,2%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	22,2%
Relation anale	73,2%	88,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 8
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	75,0%
Régulièrement	30,0%	12,5%
Consentie sans conditions	51,0%	50,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	33,3%
Imposée sans consentement	14,3%	33,3%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	33,3%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	50,0%
Non	52,2%	50,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79	n = 8
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	12,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	37,5%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	37,5%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	3,00 ± 1,41
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	30,00 ± n/d
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	100,0%
Environ du même âge	15,4%	0,0%
Plus âgés	5,6%	0,0%
D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	50,0%
Bisexuels	24,8%	0,0%
Hétérosexuels	5,6%	50,0%
Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	0,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	100,0%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	0,0%
Par des sites spécialisés	12,3%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	0,0%
Relation anale	49,7%	100,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 2
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	50,0%
Régulièrement	25,6%	50,0%
Consentie sans conditions	59,6%	0,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	0,0%
Non	69,6%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 2
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Dépistage VIH			
Oui, dans les 12 derniers mois		41,7%	31,1%
Oui, il y a plus d'un an		28,7%	32,0%
Non, jamais		29,7%	37,0%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 137
Résultat du dernier test VIH			
Séronégatif et pense encore l'être		84,9%	86,1%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être		4,9%	2,2%
Séropositif		7,0%	4,4%
En attente des résultats		2,0%	5,1%
N'a pas souhaité connaître le résultat		1,3%	2,2%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 81
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
Pense être séronégatif		79,1%	66,7%
N'est plus certain d'être séronégatif		5,9%	13,6%
Pense être séropositif		2,5%	4,9%
Ne veut pas savoir		15,8%	21,0%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
Oui		1,3%	1,4%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon		100%	6,0%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
Jamais		22,2%	25,2%
Parfois		17,9%	22,9%
Toujours		38,7%	34,4%
Non concerné		21,2%	17,4%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
Jamais		24,9%	33,3%
Parfois		25,4%	24,2%
Toujours		28,8%	23,7%
Non concerné		20,9%	18,7%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	47,2%
	Parfois	20,2%	17,4%
	Toujours	12,4%	11,9%
	Non concerné	22,2%	23,4%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	24,3%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	24,8%
	Non, jamais	30,8%	42,7%
	Ne sait pas	11,6%	8,3%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 108
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	7,4%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	0,9%
	Séronégatif	90,4%	88,0%
	Ne sait pas	4,2%	3,7%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 219 6,0%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	7,8%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	3,2%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	1,4%
	Chlamydia	4,2%	1,8%
	Syphilis	3,0%	2,3%
	Herpès génital	2,8%	2,3%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,5%
	Hépatite B	1,0%	0,5%
	Hépatite A	0,9%	0,5%
	LGV	0,4%	0,5%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	74,3%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	75,7%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	8,3%
Assez importante	53,4%	59,6%
Très importante	32,4%	27,1%
Extrêmement importante	9,1%	5,0%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	39,0%
Je me suis senti déprimé	35,5%	34,4%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	10,1%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	90,4%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	89,0%
J'aime faire face à des défis	73,9%	73,4%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	73,9%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	38,5%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	33,9%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	20,7%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	16,1%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	2,8%
Surpoids	17,4%	16,6%
Manières	10,6%	9,7%
VIH+	3,5%	2,3%
Origine ethnoculturelle	3,4%	1,4%
Identité de genre	2,1%	3,2%

Travail du sexe	1,5%	1,4%
-----------------	------	------

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 45
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	28,9%
Au travail	27,5%	26,7%
Dans le milieu gai	9,5%	8,9%
Sur Internet	25,5%	24,4%
Ailleurs ou en général	50,4%	57,8%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 36
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	22,2%
Au travail	13,4%	19,4%
Dans le milieu gai	55,0%	36,1%
Sur Internet	50,9%	41,7%
Ailleurs ou en général	34,8%	44,4%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 21
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	28,6%
Au travail	24,7%	42,9%
Dans le milieu gai	23,4%	23,8%
Sur Internet	24,1%	19,0%
Ailleurs ou en général	47,8%	38,1%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	33,3%
Au travail	31,4%	66,7%
Dans le milieu gai	28,9%	33,3%
Sur Internet	33,9%	0,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	33,3%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 7
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	28,6%
Au travail	22,4%	42,9%
Dans le milieu gai	17,1%	14,3%
Sur Internet	35,5%	28,6%
Ailleurs ou en général	40,8%	42,9%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	20,0%
Au travail	12,7%	40,0%
Dans le milieu gai	45,2%	20,0%
Sur Internet	46,0%	80,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	20,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	33,3%
Dans le milieu gai	27,8%	0,0%
Sur Internet	40,7%	33,3%
Ailleurs ou en général	40,7%	33,3%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	38,2%
Relations de couple	27,2%	37,3%
Rupture d'une relation	22,1%	26,3%
Relations familiales	21,4%	39,6%
Recherche d'amis	18,0%	30,0%
Violence dans le couple	3,0%	9,7%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	40,3%
Dépression	20,0%	32,7%
Troubles de l'alimentation	18,5%	27,8%
VIH	5,2%	5,6%
Hépatite C	1,6%	2,8%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	41,7%
Solitude / isolement	22,7%	37,0%
<i>Coming out</i>	11,9%	20,8%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	22,2%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	14,8%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	12,0%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,9%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	32,4%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	30,3%
Sexualité compulsive	16,0%	23,1%
Tabagisme	15,4%	23,6%
Consommation d'alcool	7,8%	17,1%
Consommation de drogues	5,1%	14,4%
Jeu compulsif	1,3%	4,2%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 219
Proportion de l'échantillon	100%	6,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	23,3%
Prévention VIH	19,5%	19,5%
Dépistage VIH	19,1%	19,1%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	21,4%
Traitement des ITSS	11,8%	16,7%

Laval

Les Lavallois représentent environ 3% de l'échantillon total (n = 108) et leur médiane d'âge est de 39 ans. Ils sont plus souvent en relation ou mariés avec une femme ainsi que divorcés. Ils sont plus de deux fois plus nombreux que l'ensemble de l'échantillon à avoir des enfants demeurant avec eux (tableau 1.4). Ils habitent en couple avec une femme dans près du triple des cas de l'échantillon national (tableau 1.5). Ils sont deux fois plus nombreux à se dire bisexuels (tableau 1.6). Ils ont moins le sentiment de faire partie de la communauté gaie et ont moins souvent dévoilé leur orientation sexuelle à l'entourage et ce, dans une proportion plus faiblement marquée auprès du médecin. Leurs amis sont plus souvent majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Ils consultent plus souvent Internet pour rechercher du contenu pornographique (tableau 2.3). Ils sont moins nombreux à avoir un compte sur les réseaux sociaux (tableau 2.4) Ils sont plus nombreux à se dire dépendants aux interactions et aux rencontres en ligne (tableau 2.5).

Ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin au cours des 12 derniers mois ont plus souvent eu des partenaires plus jeunes qu'eux (tableau 3.1), et ont plus souvent eu des relations sexuelles avec ces derniers alors qu'en couple (tableau 3.2). Ils sont plus nombreux à s'être faits pénétrer avec ces partenaires, à avoir pratiqué le sexe en groupe ou le gang-bang comme passif et à avoir adopté des pratiques sexuelles alternatives (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM). Ils se sont plus souvent faits éjaculer dans la bouche par ces partenaires (tableau 3.3). Ils sont toutefois moins nombreux à avoir pratiqué la pénétration anale avec eux. Parmi ceux ayant adopté cette pratique, ils ont dans plus du double des cas pratiqué la pénétration anale non protégée avec partenaires séropositifs (tableau 3.4).

Ceux dont le partenaire stable ou de couple a dépisté pour le VIH ont, dans plus du double des cas de l'ensemble québécois, un partenaire séropositif (tableau 4.3). Parmi ceux ayant pratiqué la pénétration anale avec le partenaire de couple, ils sont plus nombreux à ce que ces pénétrations aient été non protégées (tableau 4.4). Les partenaires de couple ont moins souvent eu d'autres partenaires sexuels durant la relation (tableau 4.5).

Parmi les répondants ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) une plus grande proportion a adopté la pratique uniquement dans le cadre d'un

couple (tableau 5.1). Parmi les hommes ayant pratiqué la RAISC uniquement avec des partenaires occasionnels, une plus grande proportion a adopté la pratique avec des partenaires de statut sérodivergent au leur ainsi que dans des contextes de pratique à risque (par exemple, dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires tels que des saunas) (tableau 5.3). Ceux ayant adopté la pratique dans le cadre d'un couple et auprès de partenaires occasionnels à la fois ont plus souvent eu des partenaires de statut qu'ils n'ont pas voulu connaître, séroinconnu ou sérodivergent. Ils ont plus souvent pratiqué l'éjaculation sans se retirer lors de ces relations et les ont davantage exercées dans des contextes de pratique à risque (tableau 5.4).

Dans le but de rencontrer, les Lavallois fréquentent plus souvent des établissements mixtes, des saunas et des sexe-clubs (tableau 6.1), mais utilisent moins des applications ou sites de rencontres gais utilisant la géolocalisation (tableau 6.2).

En ce qui concerne la consommation de substances, les Lavallois sont moins nombreux à avoir consommé au moins 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue au cours des 12 derniers mois (tableau 7.2).

Ils sont plus nombreux à avoir eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe et, lors de ces relations, ont plus souvent proposé une compensation. Les travailleurs du sexe ont plus souvent pratiqué cette activité alors qu'elle représentait une large part de leur revenu (tableau 8.1).

En regard de la santé sexuelle, l'ensemble des Lavallois s'est moins fait dépister pour le VIH au cours des 12 derniers mois (tableau 9.1) ou pour le VHC au cours des 12 derniers mois ou auparavant (tableau 9.3). En ce qui concerne le dépistage pour le VIH, ceux l'ayant été sont deux fois plus séropositifs que l'ensemble québécois (tableau 9.1). Ils discutent moins de leur statut sérologique avec l'entourage en général (tableau 9.2).

Pour finir, les hommes de cette région sont moins satisfaits de leur apparence physique (tableau 10.1) et ont plus souvent eu des idées suicidaires (tableau 10.2). Ils ont plus souvent été discriminés à l'égard de leur surpoids (tableau 11.1). Ce type de discrimination a davantage pris place au travail, de même qu'ailleurs ou en général (tableau 11.3).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon		100%	2,9%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	39
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	7,4%
	Facebook	38,7%	39,8%
	Sites de rencontre	52,0%	52,8%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon		100%	2,9%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	87,0%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	6,5%
	Né à l'étranger	6,9%	6,5%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	0,9%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon		100%	2,9%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	39,8%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	62,0%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	3,7%
	Études à temps plein	21,4%	22,2%
	Travail à temps partiel	17,5%	18,5%
	Travail à temps plein	46,2%	47,2%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	6,5%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	4,6%
	Congé de maladie	1,8%	0,0%
	Retraite	11,6%	14,8%
	Autre	2,3%	0,9%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	40,7%
	En relation avec un homme	28,8%	24,1%
	En relation avec une femme	6,1%	13,9%
	Divorcé	5,0%	11,1%
	Marié avec une femme	3,9%	11,1%
	Marié avec un homme	2,9%	0,9%
	En union civile avec un homme	2,8%	3,7%
	Séparé	1,7%	1,9%
	Veuf	0,9%	0,9%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,9%
Enfants			
	Non	80,6%	72,2%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	9,3%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	18,5%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	25,9%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	19,4%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	16,7%
	Habite en colocation/amis	14,0%	10,2%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	25,0%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	7,4%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,9%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	1,9%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,08 ± 7,30
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	62,0%
Surtout envers les hommes	16,0%	13,9%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	21,3%
Surtout envers les femmes	3,3%	2,8%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	70,1%
Surtout avec des hommes	11,0%	14,0%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	12,1%
Surtout avec des femmes	4,2%	3,7%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	64,8%
Bisexuelle	17,4%	30,6%
En questionnement	2,6%	1,9%
Hétérosexuelle	0,7%	1,9%
Queer	0,7%	0,0%
Autres	0,6%	0,9%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	57,4%
Oui	32,6%	23,1%
Ne sait pas	11,7%	19,4%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	63,0%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	56,5%
À la fratrie	61,5%	59,3%
Aux collègues de travail	52,5%	47,2%
Au médecin	48,7%	34,3%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	63,0%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	29,6%
Majoritairement homosexuel	9,7%	4,6%
Sans amis	2,1%	0,9%
Autres	1,1%	1,9%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	71,3%
Ordinateur portable	61,2%	52,8%
Téléphone mobile	49,2%	47,2%
Tablette	23,0%	28,7%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	8,3%
Télé numérique	4,3%	4,6%
Autres	0,7%	0,9%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	1,9%
6 à 12 mois	3,7%	4,6%
1 à 3 ans	16,8%	20,4%
4 à 6 ans	21,8%	18,5%
7 ans et plus	55,1%	54,6%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	8,69 ± 10,15 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	60,2%
Pour du contenu pornographique	58,5%	65,7%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	32,4%
Pour des raisons affectives	23,1%	19,4%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	18,5%
Pour du cybersexe	14,8%	19,4%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	13,9%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	6,5%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	76,9%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 83
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	53,6%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	26,2%
Plusieurs fois par mois	9,5%	7,1%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	13,1%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	49,4%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	42,2%
Majoritairement homosexuel	7,6%	8,4%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	59,3%
Rencontres en ligne	42,4%	48,1%
Interactions en ligne	34,0%	41,7%
Pornographie	30,2%	30,6%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	16,7%
Plutôt positif	41,7%	52,8%
Aucun effet	30,3%	23,1%
Plutôt négatif	11,5%	6,5%
Négatif	1,5%	0,9%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	88,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 96
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	11,55 ± 21,46 / 4,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	32,60 ± 97,91
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	7,48 ± 28,38
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	8,65 ± 19,58
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,69 ± 0,37

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 96
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	32,88 ± 11,09
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	29,8%
Plus jeunes	23,4%	30,9%
Plus âgés	20,3%	24,5%
D'âges variés	16,2%	14,9%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	70,2%
Bisexuels	20,1%	23,4%
Hétérosexuels	3,8%	1,1%
Ne sait pas	5,7%	5,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	17,0%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	43,6%
Non (relation exclusive)	18,9%	12,8%
Non (pas en couple)	48,3%	43,6%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 96
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	87,1%
Se faire sucer	73,9%	78,5%
S'embrasser	69,0%	69,9%
Masturbation réciproque	67,9%	68,8%
Se masser	32,7%	34,4%
Se faire pénétrer	32,6%	39,8%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	36,6%
Pénétrer	26,5%	29,0%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	12,9%
Sexe en groupe	4,4%	10,8%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	39,8%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	5,4%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	11,8%
Fist-fucking	1,3%	2,2%
Urophilie	1,6%	0,0%
Scatophilie	0,3%	0,0%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	6,5%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	33,3%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	25,8%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 96
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	64,5%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	56,7%
Régulièrement	16,6%	23,3%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 34
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	26,5%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	44,1%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	55,9%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	12,1%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 13
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,37 ± 1,36 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	23,1%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	38,5%
Régulièrement	37,0%	38,1%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 5
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	60,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	40,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon		100%	2,9%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
		Oui	51,7%
		Non	48,3%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 58
Âge du dernier partenaire de couple			
		Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08
			33,89 ± 12,46
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
		Sur Internet	58,4%
		Autre	41,6%
Durée de la dernière relation de couple			
		Plus d'un an	62,2%
		Plusieurs mois	27,8%
		Plusieurs semaines	10,0%
Situation actuelle			
		Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%
		Non	26,6%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon		100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 58
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
		Oui	63,0%
		Non	18,7%
		Ne sait pas	18,4%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 38
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	78,9%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	2,6%
Séropositif	6,6%	15,8%
Ne sait pas	3,6%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 20
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	70,0%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	30,0%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 58
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	75,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 44
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	84,1%
Régulièrement	58,2%	63,6%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 58
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	25,0%
Non	45,8%	47,7%
Ne sait pas	21,6%	27,3%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	62,0%
Oui	33,7%	38,0%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	14,8%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	9,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	13,9%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 16
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	71,4%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	75,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	61,5%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	73,3%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels	N = 436	n = 10
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	80,0%
Séroinconnu	67,7%	66,7%
Sérodivergent	24,9%	44,4%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	33,3%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		

Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	60,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	60,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	75,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	55,6%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	66,7%
En association avec la consommation de substances	32,0%	37,5%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	22,2%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	33,3%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	22,2%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	25,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 15
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	90,9%
Séroinconnu	58,1%	85,7%
Sérodivergent	27,1%	54,5%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	57,1%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	85,7%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	92,9%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	57,1%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	46,2%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	40,0%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	40,0%
En association avec la consommation de substances	33,3%	20,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	53,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	40,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	50,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	13,3%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Lieux ou établissements « gais »		
Régulièrement	14,7%	20,4%
Occasionnellement	41,4%	41,7%
Jamais	43,9%	38,0%
Lieux ou établissements « mixtes »		
Régulièrement	7,8%	11,2%
Occasionnellement	29,0%	20,6%
Jamais	63,2%	68,2%
Lieux ou établissements « hétéros »		
Régulièrement	10,0%	8,4%
Occasionnellement	26,2%	28,0%
Jamais	63,8%	63,6%
Sites de rencontre sur Internet		
Régulièrement	53,1%	50,0%
Occasionnellement	32,7%	33,3%
Jamais	14,3%	16,7%
Discothèques, bars ou cafés		
Régulièrement	16,0%	12,0%
Occasionnellement	39,3%	30,6%
Jamais	44,8%	57,4%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)		
Régulièrement	6,6%	5,6%
Occasionnellement	25,9%	30,6%
Jamais	67,5%	63,9%
Saunas		
Régulièrement	8,0%	19,4%
Occasionnellement	24,0%	21,3%
Jamais	68,0%	59,3%
Associations culturelles ou de loisir		
Régulièrement	5,6%	6,5%
Occasionnellement	20,5%	16,7%
Jamais	73,8%	76,9%
Peep show / sex shop		
Régulièrement	2,2%	2,8%
Occasionnellement	11,0%	13,0%
Jamais	86,8%	84,3%
Sex club / backroom		
Régulièrement	2,9%	8,3%
Occasionnellement	8,3%	9,3%
Jamais	88,8%	82,4%
Clubs échangistes		
Régulièrement	1,5%	1,9%
Occasionnellement	2,4%	2,8%
Jamais	96,2%	95,4%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)		
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	53,7%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	44,4%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	29,6%
<i>Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant</i>	N = 1 283	n = 32
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	78,8%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	12,1%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	9,1%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	33,3%
Moins d'une fois par mois	26,2%	19,4%
Une fois par mois	17,3%	16,7%
Une fois par semaine	15,7%	17,6%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	11,1%
Tous les jours ou presque	1,4%	1,9%
Cannabis		
Jamais	63,6%	70,4%
1 à 2 fois	12,2%	13,0%
3 à 9 fois	8,0%	9,3%
10 fois et plus	16,2%	7,4%
Poppers		
Jamais	75,2%	77,8%
1 à 2 fois	9,9%	9,3%
3 à 9 fois	6,2%	5,6%
10 fois et plus	8,6%	7,4%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	84,3%
1 à 2 fois	7,5%	1,9%
3 à 9 fois	6,2%	6,5%
10 fois et plus	6,3%	7,4%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	93,5%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
1 à 2 fois	4,8%	3,7%
3 à 9 fois	2,6%	1,9%
10 fois et plus	2,6%	0,9%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	96,3%
1 à 2 fois	5,9%	1,9%
3 à 9 fois	2,3%	1,9%
10 fois et plus	1,4%	0,0%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	95,4%
1 à 2 fois	4,3%	2,8%
3 à 9 fois	2,2%	1,9%
10 fois et plus	1,9%	0,0%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	96,3%
1 à 2 fois	1,6%	0,0%
3 à 9 fois	0,8%	0,0%
10 fois et plus	3,0%	3,7%
MDMA		
Jamais	94,7%	97,2%
1 à 2 fois	3,5%	2,8%
3 à 9 fois	1,1%	0,0%
10 fois et plus	0,6%	0,0%
GHB		
Jamais	95,2%	99,1%
1 à 2 fois	2,7%	0,0%
3 à 9 fois	1,2%	0,9%
10 fois et plus	0,9%	0,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	99,1%
1 à 2 fois	1,4%	0,0%
3 à 9 fois	0,6%	0,9%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	99,1%
1 à 2 fois	1,0%	0,9%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crack		
Jamais	98,6%	100,0%
1 à 2 fois	0,9%	0,0%
3 à 9 fois	0,2%	0,0%
10 fois et plus	0,4%	0,0%
Héroïne		
Jamais	99,6%	100,0%
1 à 2 fois	0,1%	0,0%
3 à 9 fois	0,1%	0,0%
10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	49,1%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 17
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	5,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 53
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	59,1%
Dans des soirées / établissements	24,0%	18,2%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	17,0%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	4,5%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	2,3%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,3%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	15,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 17
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	82,4%
Contre des services	15,0%	5,9%
Contre des cadeaux	13,8%	5,9%
Contre de la drogue	8,3%	5,9%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	23,5%
Compensation proposée	49,2%	76,5%
Autres configurations	12,8%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 4
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	20,0%
Non	76,6%	80,0%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 4
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	8,50 ± 11,12
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	41,67 ± 10,41
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	25,0%
Plus âgés	69,4%	50,0%
D'âges variés	12,1%	25,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	25,0%
Bisexuels	28,2%	25,0%
Hétérosexuels	9,7%	0,0%
Ne sait pas	15,3%	50,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	75,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	50,0%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	0,0%
Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	25,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 4
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	25,0%

Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	50,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	25,0%
Relation anale	73,2%	75,0%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 3
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	66,7%
Régulièrement	30,0%	33,3%
Consentie sans conditions	51,0%	0,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	50,0%
Imposée sans consentement	14,3%	50,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	0,0%
Non	52,2%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 79	n = 3
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	66,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	66,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	33,3%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 13
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe	3,98 ± 4,82	4,33 ± 3,82

		(moyenne ± écart-type)	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)		29,17 ± 8,58	28,25 ± 9,57
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	76,9%
	Environ du même âge	15,4%	0,0%
	Plus âgés	5,6%	15,4%
	D'âges variés	3,1%	7,7%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	76,9%
	Bisexuels	24,8%	15,4%
	Hétérosexuels	5,6%	0,0%
	Ne sait pas	11,2%	7,7%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	38,5%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	69,2%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	7,7%
	Par des sites spécialisés	12,3%	23,1%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	23,1%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	7,7%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	15,4%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	7,7%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n =
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	15,4%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	23,1%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	15,4%
Relation anale	49,7%	38,5%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 5
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	40,0%
Régulièrement	25,6%	20,0%
Consentie sans conditions	59,6%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%

Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	20,0%
Non	69,6%	80,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 5
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	20,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	20,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	35,2%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	31,5%
Non, jamais	29,7%	33,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 71
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	81,7%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	1,4%
Séropositif	7,0%	14,1%
En attente des résultats	2,0%	1,4%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,4%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 36
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	80,6%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	11,1%
Pense être séropositif	2,5%	2,8%
Ne veut pas savoir	15,8%	11,1%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	0,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	31,5%
Parfois	17,9%	21,3%
Toujours	38,7%	34,3%
Non concerné	21,2%	13,0%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	38,0%
Parfois	25,4%	22,2%
Toujours	28,8%	25,0%
Non concerné	20,9%	14,8%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	55,6%
Parfois	20,2%	21,3%
Toujours	12,4%	6,5%
Non concerné	22,2%	16,7%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	25,9%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	18,5%
Non, jamais	30,8%	42,6%
Ne sait pas	11,6%	13,0%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 48
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	4,2%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	2,1%
Séronégatif	90,4%	87,5%
Ne sait pas	4,2%	6,3%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	13,0%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	5,6%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	5,6%
	Chlamydia	4,2%	5,6%
	Syphilis	3,0%	2,8%
	Herpès génital	2,8%	0,9%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,9%
	Hépatite B	1,0%	0,9%
	Hépatite A	0,9%	0,9%
	LGV	0,4%	0,9%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	63,0%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	84,3%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	4,6%
	Assez importante	53,4%	51,9%
	Très importante	32,4%	33,3%
	Extrêmement importante	9,1%	10,2%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 108 2,9%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	37,0%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	29,6%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	18,5%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	89,8%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	83,3%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	71,3%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	69,4%
	Je recherche les sensations fortes	40,7%	41,7%

Je prends des risques dans la vie | 34,8% 38,3%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	23,4%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	19,4%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	1,9%
Surpoids	17,4%	24,3%
Manières	10,6%	14,0%
VIH+	3,5%	3,7%
Origine ethnoculturelle	3,4%	4,7%
Identité de genre	2,1%	3,7%
Travail du sexe	1,5%	2,8%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 25
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	32,0%
Au travail	27,5%	32,0%
Dans le milieu gai	9,5%	12,0%
Sur Internet	25,5%	28,0%
Ailleurs ou en général	50,4%	48,0%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 26
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	7,7%
Au travail	13,4%	23,1%
Dans le milieu gai	55,0%	53,8%
Sur Internet	50,9%	38,5%
Ailleurs ou en général	34,8%	46,2%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 15
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	46,7%
Au travail	24,7%	33,3%
Dans le milieu gai	23,4%	20,0%
Sur Internet	24,1%	26,7%
Ailleurs ou en général	47,8%	40,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	20,0%
Au travail	31,4%	20,0%
Dans le milieu gai	28,9%	20,0%
Sur Internet	33,9%	20,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	100,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	25,0%
Au travail	22,4%	25,0%
Dans le milieu gai	17,1%	25,0%
Sur Internet	35,5%	50,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	75,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	25,0%
Au travail	12,7%	25,0%
Dans le milieu gai	45,2%	25,0%
Sur Internet	46,0%	25,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	100,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe</i>	N = 54	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	33,3%
Au travail	14,8%	33,3%
Dans le milieu gai	27,8%	33,3%
Sur Internet	40,7%	33,3%
Ailleurs ou en général	40,7%	100,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	38,3%
Relations de couple	27,2%	36,4%
Rupture d'une relation	22,1%	28,0%
Relations familiales	21,4%	34,6%
Recherche d'amis	18,0%	29,0%
Violence dans le couple	3,0%	7,5%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	36,4%
Dépression	20,0%	25,2%
Troubles de l'alimentation	18,5%	29,2%
VIH	5,2%	10,3%
Hépatite C	1,6%	4,7%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	47,7%
Solitude / isolement	22,7%	33,6%
<i>Coming out</i>	11,9%	21,5%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	17,8%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	18,7%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	9,3%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,9%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	39,3%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	35,5%
Sexualité compulsive	16,0%	36,4%
Tabagisme	15,4%	17,8%
Consommation d'alcool	7,8%	20,6%
Consommation de drogues	5,1%	6,5%
Jeu compulsif	1,3%	1,9%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 108
Proportion de l'échantillon	100%	2,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	32,7%
Prévention VIH	19,5%	29,0%
Dépistage VIH	19,1%	30,8%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	27,1%
Traitement des ITSS	11,8%	16,8%

Mauricie et Centre-du-Québec

Les Mauriciens représentent un peu plus du vingtième de l'échantillon (n = 236). Leur médiane d'âge est de 43 ans. Ils sont plus nombreux à avoir été recrutés via des sites de rencontres (tableau 1.1) Ils sont proportionnellement moins nombreux à avoir complété des études universitaires et à étudier à temps plein (tableau 1.3). Ils ont plus souvent des enfants (tableau 1.4) et habitent plus souvent en couple avec une femme (tableau 1.5). Ils ont moins souvent dévoilé leur orientation sexuelle à leurs amis hétérosexuels et leurs amis sont plus majoritairement hétérosexuels (tableau 1.7).

Concernant leur accès à Internet, les Mauriciens le consultent plus pour des raisons affectives (tableau 2.3). Les amis sur les réseaux sociaux sont hétérosexuels dans une plus grande proportion (tableau 2.4). Ils sont moins nombreux à se dire dépendants aux rencontres en ligne (tableau 2.6).

Ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin rapportent des partenaires plus souvent plus jeunes qu'eux. Plus souvent, ces derniers se présentaient comme des bisexuels (tableau 3.2). Ceux ayant pratiqué la pénétration anale non protégée l'ont moins souvent faite avec partenaire séropositif ou séroinconnu. Notons toutefois que les hommes de cette région sont proportionnellement moins nombreux à avoir répondu à cette question de l'étude (tableau 3.5). Les hommes ayant eu au moins une partenaire occasionnelle féminine ont moins souvent développé de sentiments envers elles (tableau 3.6). Les répondants ayant eu un partenaire stable ou de couple ont plus souvent rencontré ce dernier sur Internet (tableau 4.1). Parmi les hommes dont le partenaire a été dépisté pour le VIH, ce dernier est plus souvent séronégatif (tableau 4.3a).

Chez les hommes ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) uniquement avec les partenaires occasionnels, ils sont plus nombreux à avoir eu des partenaires dont ils n'ont pas voulu connaître le statut sérologique et ont plus souvent éjaculé en ces partenaires sans se retirer lors de la pratique (tableau 5.3). Les répondants ayant pratiqué la RAISC dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels à la fois ont également eu davantage de partenaires de pratique dont ils n'ont pas voulu connaître le statut sérologique. Ils ont également davantage adopté la pratique dans des contextes à risque (par exemple, dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires tels que des saunas) (tableau 5.4).

Afin de rencontrer, les Mauriciens fréquentent plus régulièrement des sites de rencontres (tableau 6.1). Ils sont moins nombreux à faire usage d'une application ou d'un site de rencontres gai géolocalisant. Parmi ceux y faisant usage, ils sont plus nombreux à y dévoiler partiellement leur identité, c'est-à-dire en n'y montrant pas de photo de leur visage ou en ne montrant pas leur géopositionnement (tableau 6.2). En regard de leur consommation de substances, ils sont moins nombreux à avoir consommé au moins 5 verres d'alcool lors d'une même occasion ou une drogue au cours de la dernière année (tableau 7.1).

Ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont davantage échangé ces relations sexuelles contre des cadeaux et ont plus souvent proposé une compensation (tableau 8.1).

Au niveau du dépistage du VIH, ces répondants sont moins nombreux à avoir passé un test au cours des 12 derniers mois (tableau 9.1a). Dans l'ensemble, ils discutent moins de leur statut sérologique avec l'entourage (tableau 9.2). Ils sont également moins nombreux à avoir été dépistés pour le VHC au cours des 12 derniers mois. Quoique dans une faible proportion, ils sont plus nombreux à être séropositifs pour le VHC (tableau 9.3). Toutefois, ils sont moins nombreux à avoir reçu un diagnostic d'ITSS au cours des 12 derniers mois (tableau 9.4).

Au niveau de leur santé mentale, ces hommes sont moins nombreux à aimer faire face à des défis et à rechercher les sensations fortes (tableau 10.2). En ce qui concerne les préoccupations rapportées, ces hommes se disent davantage préoccupés de la dépendance à Internet (tableau 12.4).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	43
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	5,9%
	Facebook	38,7%	30,9%
	Sites de rencontre	52,0%	63,1%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	94,9%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	3,0%
	Né à l'étranger	6,9%	2,1%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	0,8%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	24,2%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	55,5%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	6,4%
	Études à temps plein	21,4%	14,4%
	Travail à temps partiel	17,5%	14,0%
	Travail à temps plein	46,2%	49,6%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	8,1%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	5,9%
	Congé de maladie	1,8%	2,1%
	Retraite	11,6%	11,4%
	Autre	2,3%	2,5%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	53,8%
	En relation avec un homme	28,8%	27,1%
	En relation avec une femme	6,1%	9,3%
	Divorcé	5,0%	3,8%
	Marié avec une femme	3,9%	5,1%
	Marié avec un homme	2,9%	2,1%
	En union civile avec un homme	2,8%	1,7%
	Séparé	1,7%	0,4%
	Veuf	0,9%	0,8%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,3%
Enfants			
	Non	80,6%	73,6%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	17,9%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	8,5%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	38,6%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	22,0%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	17,4%
	Habite en colocation/amis	14,0%	9,7%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	14,0%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	3,4%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	0,4%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	20,12 ± 8,58
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	66,1%
Surtout envers les hommes	16,0%	17,8%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	13,6%
Surtout envers les femmes	3,3%	2,1%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,4%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	74,6%
Surtout avec des hommes	11,0%	10,6%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	8,5%
Surtout avec des femmes	4,2%	5,9%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,4%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	75,0%
Bisexuelle	17,4%	22,0%
En questionnement	2,6%	1,3%
Hétérosexuelle	0,7%	0,8%
Queer	0,7%	0,0%
Autres	0,6%	0,8%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	60,2%
Oui	32,6%	32,2%
Ne sait pas	11,7%	7,6%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	66,9%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	60,2%
À la fratrie	61,5%	57,6%
Aux collègues de travail	52,5%	52,5%
Au médecin	48,7%	45,3%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	55,1%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	36,4%
Majoritairement homosexuel	9,7%	5,1%
Sans amis	2,1%	2,5%
Autres	1,1%	0,8%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	72,9%
Ordinateur portable	61,2%	60,6%
Téléphone mobile	49,2%	40,3%
Tablette	23,0%	19,9%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	5,5%
Télé numérique	4,3%	4,7%
Autres	0,7%	0,0%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,5%
6 à 12 mois	3,7%	2,1%
1 à 3 ans	16,8%	14,0%
4 à 6 ans	21,8%	22,0%
7 ans et plus	55,1%	59,3%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	9,80 ± 11,30 / 6,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	62,7%
Pour du contenu pornographique	58,5%	56,4%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	32,2%
Pour des raisons affectives	23,1%	28,8%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	13,1%
Pour du cybersexe	14,8%	11,9%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	9,3%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	2,5%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	86,4%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 204
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	49,5%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	28,9%
Plusieurs fois par mois	9,5%	5,9%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	15,7%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	50,7%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	45,8%
Majoritairement homosexuel	7,6%	3,4%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	57,2%
Rencontres en ligne	42,4%	35,2%
Interactions en ligne	34,0%	35,6%
Pornographie	30,2%	31,4%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	11,9%
Plutôt positif	41,7%	45,3%
Aucun effet	30,3%	31,4%
Plutôt négatif	11,5%	9,3%
Négatif	1,5%	2,1%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	88,6%

<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 209
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	8,42 ± 19,80 / 4,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	28,39 ± 62,35
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	8,61 ± 34,38
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	6,52 ± 15,58
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,75 ± 0,38

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 209
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	34,55 ± 12,97
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	38,9%
Plus jeunes	23,4%	29,3%
Plus âgés	20,3%	16,8%
D'âges variés	16,2%	14,9%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	60,6%
Bisexuels	20,1%	30,3%
Hétérosexuels	3,8%	4,8%
Ne sait pas	5,7%	4,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	18,8%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	32,3%
Non (relation exclusive)	18,9%	18,4%
Non (pas en couple)	48,3%	49,3%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 209
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	85,4%
Se faire sucer	73,9%	75,6%
S'embrasser	69,0%	73,7%
Masturbation réciproque	67,9%	71,7%
Se masser	32,7%	32,7%
Se faire pénétrer	32,6%	25,9%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	25,9%
Pénétrer	26,5%	30,2%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	13,7%
Sexe en groupe	4,4%	2,0%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	32,2%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	3,9%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	1,5%
Fist-fucking	1,3%	2,0%
Urophilie	1,6%	2,0%
Scatophilie	0,3%	0,0%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	9,8%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	21,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	25,4%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 209
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	75,1%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	59,5%
Régulièrement	16,6%	19,0%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 91
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	6,6%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	30,8%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	58,2%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	14,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 33
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,39 ± 1,84 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	21,2%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	51,5%
Régulièrement	37,0%	40,9%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 17
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	0,0%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	70,6%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	17,6%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
		Oui	51,7%
		Non	49,6%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 117
Âge du dernier partenaire de couple			
		Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08
			37,73 ± 13,83
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
		Sur Internet	58,4%
		Autre	76,7%
Durée de la dernière relation de couple			
		Plus d'un an	62,2%
		Plusieurs mois	27,8%
		Plusieurs semaines	10,0%
		Moins d'un mois	9,4%
Situation actuelle			
		Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%
		Non	77,8%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 117
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
		Oui	63,0%
		Non	61,5%
		Ne sait pas	18,7%
			19,7%
			18,4%
			18,8%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 72
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	94,4%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	0,0%
Ne sait pas	3,6%	5,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 44
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	65,9%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	34,1%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 117
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	71,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 84
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	80,7%
Régulièrement	58,2%	61,4%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 117
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	31,3%
Non	45,8%	44,6%
Ne sait pas	21,6%	24,1%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	70,4%
Oui	33,7%	29,6%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	7,6%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	12,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	9,7%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 18
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	61,1%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	44,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	50,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	52,9%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels	N = 436	n =
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	76,0%
Séroinconnu	67,7%	65,5%
Sérodivergent	24,9%	26,9%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	44,4%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		

Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	81,5%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	50,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	61,5%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	61,5%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	96,4%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	42,3%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	23,1%
En association avec la consommation de substances	32,0%	15,4%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	33,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	15,4%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	11,6%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	8,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 17
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	95,2%
Séroinconnu	58,1%	54,5%
Sérodivergent	27,1%	27,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	38,1%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	77,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	81,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	72,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	70,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	55,6%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	44,4%
En association avec la consommation de substances	33,3%	27,8%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	42,1%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	23,5%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	17,6%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	11,8%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	5,5%
	Occasionnellement	41,4%	42,4%
	Jamais	43,9%	52,1%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	6,0%
	Occasionnellement	29,0%	28,9%
	Jamais	63,2%	65,1%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	10,2%
	Occasionnellement	26,2%	29,2%
	Jamais	63,8%	60,6%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	62,7%
	Occasionnellement	32,7%	27,1%
	Jamais	14,3%	10,2%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	10,6%
	Occasionnellement	39,3%	39,4%
	Jamais	44,8%	50,0%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	4,2%
	Occasionnellement	25,9%	28,8%
	Jamais	67,5%	66,9%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	3,4%
	Occasionnellement	24,0%	24,2%
	Jamais	68,0%	72,5%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	3,8%
	Occasionnellement	20,5%	16,5%
	Jamais	73,8%	79,7%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	0,4%
	Occasionnellement	11,0%	9,7%
	Jamais	86,8%	89,8%
Sex club / backroom			
	Régulièrement	2,9%	0,8%
	Occasionnellement	8,3%	8,9%
	Jamais	88,8%	90,3%
Clubs échangistes			
	Régulièrement	1,5%	0,4%
	Occasionnellement	2,4%	4,2%
	Jamais	96,2%	95,3%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)			
	Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	45,3%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	52,5%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	30,1%
<i>Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant</i>	N = 1 283	n = 71
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	72,9%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	25,7%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	1,4%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	33,9%
Moins d'une fois par mois	26,2%	23,7%
Une fois par mois	17,3%	15,3%
Une fois par semaine	15,7%	16,9%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	7,6%
Tous les jours ou presque	1,4%	2,5%
Cannabis		
Jamais	63,6%	70,8%
1 à 2 fois	12,2%	11,4%
3 à 9 fois	8,0%	3,8%
10 fois et plus	16,2%	14,0%
Poppers		
Jamais	75,2%	85,2%
1 à 2 fois	9,9%	7,2%
3 à 9 fois	6,2%	2,1%
10 fois et plus	8,6%	5,5%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	83,9%
1 à 2 fois	7,5%	7,6%
3 à 9 fois	6,2%	2,5%
10 fois et plus	6,3%	5,9%
Amphétamines		

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Jamais	90,1%	95,3%
1 à 2 fois	4,8%	2,1%
3 à 9 fois	2,6%	1,7%
10 fois et plus	2,6%	0,8%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	94,5%
1 à 2 fois	5,9%	3,4%
3 à 9 fois	2,3%	1,3%
10 fois et plus	1,4%	0,8%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	94,1%
1 à 2 fois	4,3%	3,4%
3 à 9 fois	2,2%	1,7%
10 fois et plus	1,9%	0,8%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	97,9%
1 à 2 fois	1,6%	0,0%
3 à 9 fois	0,8%	0,4%
10 fois et plus	3,0%	1,7%
MDMA		
Jamais	94,7%	97,0%
1 à 2 fois	3,5%	1,7%
3 à 9 fois	1,1%	0,8%
10 fois et plus	0,6%	0,4%
GHB		
Jamais	95,2%	97,9%
1 à 2 fois	2,7%	2,1%
3 à 9 fois	1,2%	0,0%
10 fois et plus	0,9%	0,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	98,3%
1 à 2 fois	1,4%	0,8%
3 à 9 fois	0,6%	0,4%
10 fois et plus	0,5%	0,4%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	100,0%
1 à 2 fois	1,0%	0,0%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crack		
Jamais	98,6%	99,6%
1 à 2 fois	0,9%	0,4%
3 à 9 fois	0,2%	0,0%
10 fois et plus	0,4%	0,0%
Héroïne		
Jamais	99,6%	99,6%
1 à 2 fois	0,1%	0,0%
3 à 9 fois	0,1%	0,0%
10 fois et plus	0,2%	0,4%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	49,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 25
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	8,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 117
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	62,2%
Dans des soirées / établissements	24,0%	18,9%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	7,2%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	4,4%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	1,1%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	1,7%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	8,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 20
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	75,0%
Contre des services	15,0%	15,0%
Contre des cadeaux	13,8%	20,0%
Contre de la drogue	8,3%	5,0%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	25,0%
Compensation proposée	49,2%	65,0%
Autres configurations	12,8%	10,0%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124 ?	n = 5
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	0,0%
Non	76,6%	80,0%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	20,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 5
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	2,00 ± 1,00
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	42,00 ± 21,74
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	20,0%
Environ du même âge	14,5%	20,0%
Plus âgés	69,4%	40,0%
D'âges variés	12,1%	20,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	80,0%
Bisexuels	28,2%	0,0%
Hétérosexuels	9,7%	20,0%
Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	80,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	0,0%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	20,0%
Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	20,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	20,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	20,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 5
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	0,0%

Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	40,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	60,0%
Relation anale	73,2%	80,0%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 4
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	50,0%
Régulièrement	30,0%	50,0%
Consentie sans conditions	51,0%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	50,0%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	50,0%
Non	52,2%	50,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 79	n = 5
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	25,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	50,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	25,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 13
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe	3,98 ± 4,82	4,92 ± 5,59

		(moyenne ± écart-type)	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)		29,17 ± 8,58	28,31 ± 8,04
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	92,3%
	Environ du même âge	15,4%	7,7%
	Plus âgés	5,6%	0,0%
	D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	46,2%
	Bisexuels	24,8%	38,5%
	Hétérosexuels	5,6%	0,0%
	Ne sait pas	11,2%	15,4%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	53,8%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	61,5%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	7,7%
	Par des sites spécialisés	12,3%	7,7%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	0,0%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	7,7%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 13
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	38,5%
Relation anale	49,7%	53,8%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 7
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	42,9%
Régulièrement	25,6%	42,9%
Consentie sans conditions	59,6%	33,3%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	33,3%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%

Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	28,6%
Non	69,6%	71,4%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 7
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	28,6%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	28,6%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	31,8%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	30,5%
Non, jamais	29,7%	37,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 146
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	84,9%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	4,8%
Séropositif	7,0%	6,2%
En attente des résultats	2,0%	1,4%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	2,7%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 89
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	82,0%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	3,4%
Pense être séropositif	2,5%	2,2%
Ne veut pas savoir	15,8%	16,9%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	1,7%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	29,4%
	Parfois	17,9%	17,0%
	Toujours	38,7%	34,5%
	Non concerné	21,2%	19,1%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	31,9%
	Parfois	25,4%	22,1%
	Toujours	28,8%	27,7%
	Non concerné	20,9%	18,3%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	53,8%
	Parfois	20,2%	13,7%
	Toujours	12,4%	13,2%
	Non concerné	22,2%	19,2%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	25,2%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	28,6%
	Non, jamais	30,8%	34,2%
	Ne sait pas	11,6%	12,0%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 126
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	7,1%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	1,6%
	Séronégatif	90,4%	84,9%
	Ne sait pas	4,2%	6,3%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	8,1%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	3,0%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	1,7%
	Chlamydia	4,2%	1,3%
	Syphilis	3,0%	1,7%
	Herpès génital	2,8%	1,3%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,0%
	Hépatite B	1,0%	0,9%
	Hépatite A	0,9%	0,4%
	LGV	0,4%	0,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	70,8%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	82,4%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	8,2%
	Assez importante	53,4%	58,4%
	Très importante	32,4%	27,0%
	Extrêmement importante	9,1%	6,4%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 236 6,4%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	37,5%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	34,8%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	11,6%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	89,7%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	86,2%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	62,9%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	73,3%
	Je recherche les sensations fortes	40,7%	30,2%

Je prends des risques dans la vie | 34,8% 31,5%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	22,0%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	15,5%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	3,4%
Surpoids	17,4%	16,4%
Manières	10,6%	8,2%
VIH+	3,5%	3,4%
Origine ethnoculturelle	3,4%	2,2%
Identité de genre	2,1%	2,6%
Travail du sexe	1,5%	2,2%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 51
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	21,6%
Au travail	27,5%	27,5%
Dans le milieu gai	9,5%	2,0%
Sur Internet	25,5%	11,8%
Ailleurs ou en général	50,4%	68,6%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 38
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	10,5%
Au travail	13,4%	18,4%
Dans le milieu gai	55,0%	44,7%
Sur Internet	50,9%	57,9%
Ailleurs ou en général	34,8%	44,7%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 19
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	31,6%
Au travail	24,7%	31,6%
Dans le milieu gai	23,4%	26,3%
Sur Internet	24,1%	31,6%
Ailleurs ou en général	47,8%	52,6%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	20,0%
Au travail	31,4%	20,0%
Dans le milieu gai	28,9%	20,0%
Sur Internet	33,9%	40,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	20,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 6
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	66,7%
Dans le milieu gai	17,1%	0,0%
Sur Internet	35,5%	16,7%
Ailleurs ou en général	40,8%	16,7%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 8

Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À l'école	5,6%	12,5%
	Au travail	12,7%	12,5%
	Dans le milieu gai	45,2%	12,5%
	Sur Internet	46,0%	50,0%
	Ailleurs ou en général	43,7%	62,5%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe		N = 54	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À l'école	5,6%	0,0%
	Au travail	14,8%	0,0%
	Dans le milieu gai	27,8%	20,0%
	Sur Internet	40,7%	20,0%
	Ailleurs ou en général	40,7%	60,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Recherche de partenaires stables	31,0%	41,8%
	Relations de couple	27,2%	43,5%
	Rupture d'une relation	22,1%	26,7%
	Relations familiales	21,4%	33,3%
	Recherche d'amis	18,0%	31,0%
	Violence dans le couple	3,0%	3,0%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon		100%	6,4%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Anxiété	26,6%	37,5%
	Dépression	20,0%	31,6%
	Troubles de l'alimentation	18,5%	25,0%
	VIH	5,2%	5,2%

Hépatite C | 1,6% 0,9%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	40,9%
Solitude / isolement	22,7%	33,6%
<i>Coming out</i>	11,9%	15,9%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	20,3%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	14,7%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	9,1%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,7%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	40,5%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	33,2%
Sexualité compulsive	16,0%	26,3%
Tabagisme	15,4%	23,7%
Consommation d'alcool	7,8%	16,8%
Consommation de drogues	5,1%	8,6%
Jeu compulsif	1,3%	3,4%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 236
Proportion de l'échantillon	100%	6,4%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	27,6%
Prévention VIH	19,5%	22,4%
Dépistage VIH	19,1%	23,3%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	22,8%
Traitement des ITSS	11,8%	15,1%

Montérégie

Les répondants de cette région représentent 14,2% de l'échantillon total (n = 520). La médiane d'âge chez eux est de 36 ans (tableau 1.1). Comparativement avec l'échantillon québécois, les Montérégiens ont moins souvent complété des études universitaires (tableau 1.3). Par ailleurs, ils demeurent plus souvent avec leur père et/ou leur mère (tableau 1.5). Ils sont moins nombreux à rapporter une attirance, des comportements et une orientation sexuelle exclusivement envers les hommes (tableau 1.6).

Chez ceux rapportant au moins un partenaire occasionnel, ceux-ci sont plus souvent de leur âge et moins souvent d'âges variés (tableau 3.2). Au niveau des pratiques sexuelles avec ces derniers, ils sont moins nombreux à adopter des pratiques alternatives (incluant entre autres le gang bang en tant que passif ou les pratiques BDSM) (tableau 3.3) ou à pratiquer la pénétration anale (tableau 3.4). Chez ceux ayant eu un partenaire stable ou de couple dans la dernière année, la relation a plus souvent duré plusieurs mois. Dans moins de cas, cette relation dure toujours au moment de répondre à l'enquête (tableau 4.1). Parmi les répondants ayant un partenaire dépisté pour le VIH, ces partenaires sont plus souvent séronégatifs (tableau 4.3).

Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom (RAISC ou *barebacking*) uniquement dans le cadre d'un couple, les Montérégiens ont davantage pratiqué l'éjaculation d'eux-mêmes ou du partenaire sans se retirer lors de ces relations (tableau 5.2). Quant à ceux ayant adopté cette pratique uniquement avec les partenaires occasionnels, ils ont plus souvent été dans une tournante en tant que passif (tableau 5.3).

Les Montérégiens fréquentent moins régulièrement des lieux ou établissements gais dans le but de rencontrer. Ils sont toutefois plus nombreux à ne jamais fréquenter des sexe-clubs ainsi que des bars, discothèques ou cafés dans cette même visée (tableau 6.1). Parmi les hommes rapportant au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe au cours de la dernière année, les Montérégiens sont plus nombreux à avoir échangé ces dernières contre des cadeaux et à avoir reçu une compensation lors des échanges (tableau 6.1).

Les Montérégiens sont par ailleurs moins nombreux à avoir consommé au moins 5 verres d'alcool lors de la même occasion ou une drogue dans les 12 derniers mois (tableau 7.2).

Du côté de leur santé sexuelle, les Montérégiens sont plus nombreux à n'avoir jamais été dépistés pour le VIH (tableau 9.1a).

Du côté de leurs préoccupations, les Montérégiens se disent plus préoccupés de leur image corporelle (tableau 12.3).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	36
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	7,9%
	Facebook	38,7%	41,5%
	Sites de rencontre	52,0%	50,6%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	93,8%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	2,3%
	Né à l'étranger	6,9%	3,8%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	1,2%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	32,9%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	56,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	5,0%
	Études à temps plein	21,4%	23,1%
	Travail à temps partiel	17,5%	16,7%
	Travail à temps plein	46,2%	44,0%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	8,5%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	3,3%
	Congé de maladie	1,8%	1,9%
	Retraite	11,6%	12,9%
	Autre	2,3%	2,1%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	54,6%
	En relation avec un homme	28,8%	24,8%
	En relation avec une femme	6,1%	8,1%
	Divorcé	5,0%	5,4%
	Marié avec une femme	3,9%	6,0%
	Marié avec un homme	2,9%	1,7%
	En union civile avec un homme	2,8%	2,7%
	Séparé	1,7%	1,9%
	Veuf	0,9%	1,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	1,3%
Enfants			
	Non	80,6%	76,0%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	16,3%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	7,7%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	33,7%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	17,9%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	22,7%
	Habite en colocation/amis	14,0%	11,2%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	12,9%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	6,5%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,2%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	1,2%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme		
Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,60 ± 8,38
Attirance et désirs sexuels		
Exclusivement envers les hommes	70,0%	64,4%
Surtout envers les hommes	16,0%	16,2%
Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	14,0%
Surtout envers les femmes	3,3%	5,0%
Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,4%
Comportements sexuels		
Exclusivement avec des hommes	77,4%	71,3%
Surtout avec des hommes	11,0%	12,5%
Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	9,6%
Surtout avec des femmes	4,2%	6,3%
Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,2%
Orientation sexuelle		
Homosexuelle	78,0%	73,7%
Bisexuelle	17,4%	21,2%
En questionnement	2,6%	2,5%
Hétérosexuelle	0,7%	1,2%
Queer	0,7%	1,0%
Autres	0,6%	0,6%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais		
Non	55,7%	59,6%
Oui	32,6%	28,1%
Ne sait pas	11,7%	12,3%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)		
À 1 ou 2 parents	68,1%	66,2%
Aux amis hétérosexuels	65,2%	61,3%
À la fratrie	61,5%	59,8%
Aux collègues de travail	52,5%	47,7%
Au médecin	48,7%	44,0%
Composition du réseau d'amis		
Majoritairement hétérosexuel	47,5%	52,1%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	37,1%
Majoritairement homosexuel	9,7%	7,7%
Sans amis	2,1%	2,1%
Autres	1,1%	1,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Ordinateur personnel	70,1%	71,3%
Ordinateur portable	61,2%	58,1%
Téléphone mobile	49,2%	44,8%
Tablette	23,0%	24,0%
Appareil de jeux vidéo	6,1%	8,1%
Télé numérique	4,3%	3,7%
Autres	0,7%	1,2%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,9%
6 à 12 mois	3,7%	3,3%
1 à 3 ans	16,8%	18,8%
4 à 6 ans	21,8%	21,5%
7 ans et plus	55,1%	53,5%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	8,87 ± 10,29 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	63,8%
Pour du contenu pornographique	58,5%	54,6%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	29,4%
Pour des raisons affectives	23,1%	23,7%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	13,1%
Pour du cybersexe	14,8%	15,4%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	10,8%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	2,3%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	90,8%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 472
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	47,6%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	27,4%
Plusieurs fois par mois	9,5%	10,4%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	14,6%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	50,9%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	43,2%
Majoritairement homosexuel	7,6%	6,0%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)		
Cybersexe	60,6%	61,0%
Rencontres en ligne	42,4%	40,6%
Interactions en ligne	34,0%	31,3%
Pornographie	30,2%	31,7%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle		
Positif	15,0%	13,9%
Plutôt positif	41,7%	41,4%
Aucun effet	30,3%	32,2%
Plutôt négatif	11,5%	11,4%
Négatif	1,5%	1,2%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 454
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel		
Oui	87,5%	87,3%
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel		
Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	7,52 ± 12,90 / 3,00
Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	23,93 ± 54,28
Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	7,34 ± 33,09
Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	5,02 ± 9,99
Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,69 ± 0,39

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 454
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	40,93 ± 125,39
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	46,6%
Plus jeunes	23,4%	22,2%
Plus âgés	20,3%	19,5%
D'âges variés	16,2%	11,8%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	67,0%
Bisexuels	20,1%	22,2%
Hétérosexuels	3,8%	5,2%
Ne sait pas	5,7%	5,7%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	19,5%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	36,3%
Non (relation exclusive)	18,9%	18,0%
Non (pas en couple)	48,3%	45,7%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 454
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	83,2%
Se faire sucer	73,9%	70,1%
S'embrasser	69,0%	63,0%
Masturbation réciproque	67,9%	63,3%
Se masser	32,7%	33,3%
Se faire pénétrer	32,6%	32,9%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	29,8%
Pénétrer	26,5%	24,9%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	10,9%
Sexe en groupe	4,4%	3,4%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	27,0%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	4,3%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	1,8%
Fist-fucking	1,3%	0,7%
Urophilie	1,6%	0,7%
Scatophilie	0,3%	0,0%
Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	7,3%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	24,5%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	28,1%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 454
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	64,6%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	56,0%
Régulièrement	16,6%	16,2%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 159
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	5,7%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	39,6%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	56,6%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	13,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 69
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,43 ± 1,80 / 0,00
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines		
Oui	29,8%	33,8%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une	56,3%	60,3%
Régulièrement	37,0%	37,2%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 41
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif		
Oui	1,7%	4,9%

Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif	Oui	51,3%	39,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu	Oui	17,2%	22,0%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
		Oui	51,7%
		Non	47,3%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 246
Âge du dernier partenaire de couple			
		Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08
			34,17 ± 14,62
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
		Sur Internet	58,4%
		Autre	59,3%
Durée de la dernière relation de couple			
		Plus d'un an	62,2%
		Plusieurs mois	27,8%
		Plusieurs semaines	10,0%
		Moins d'un an	10,6%
Situation actuelle			
		Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%
		Non	67,5%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme			
		N = 1 882	n = 246
Partenaire de couple dépisté pour le VIH			
		Oui	63,0%
		Non	59,3%
		Ne sait pas	18,7%
			21,5%
			18,4%
			19,1%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 146
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	95,2%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,7%
Séropositif	6,6%	2,7%
Ne sait pas	3,6%	1,4%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 102
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	64,7%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	2,0%
Séropositif	0,6%	1,0%
Ne sait pas	30,5%	32,4%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 246
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	73,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 180
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	75,0%
Régulièrement	58,2%	56,1%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 246
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	29,7%
Non	45,8%	44,5%
Ne sait pas	21,6%	25,8%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	69,2%
Oui	33,7%	30,8%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	8,5%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	11,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	11,0%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 44
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	64,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	76,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	53,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	53,7%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels	N = 436	n = 59
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	78,4%
Séroinconnu	67,7%	69,8%
Sérodivergent	24,9%	16,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	37,5%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		

Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	54,2%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	60,8%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	66,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	70,8%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	94,7%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	46,2%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	41,5%
En association avec la consommation de substances	32,0%	26,0%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	35,4%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	16,7%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	24,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	0,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 57
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	92,3%
Séroinconnu	58,1%	61,8%
Sérodivergent	27,1%	13,7%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	28,8%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	78,4%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	80,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	77,6%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	69,6%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	29,4%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	26,5%
En association avec la consommation de substances	33,3%	26,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	30,8%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	14,0%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	20,4%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	6,1%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
	Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	9,8%
	Occasionnellement	41,4%	43,5%
	Jamais	43,9%	46,7%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	7,9%
	Occasionnellement	29,0%	28,9%
	Jamais	63,2%	63,2%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	8,9%
	Occasionnellement	26,2%	26,4%
	Jamais	63,8%	64,7%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	52,1%
	Occasionnellement	32,7%	30,8%
	Jamais	14,3%	17,1%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	12,3%
	Occasionnellement	39,3%	38,3%
	Jamais	44,8%	49,4%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	6,9%
	Occasionnellement	25,9%	25,4%
	Jamais	67,5%	67,7%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	6,7%
	Occasionnellement	24,0%	22,5%
	Jamais	68,0%	70,8%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	6,5%
	Occasionnellement	20,5%	19,0%
	Jamais	73,8%	74,4%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,1%
	Occasionnellement	11,0%	8,5%
	Jamais	86,8%	89,4%
Sex club / backroom			
	Régulièrement	2,9%	2,3%
	Occasionnellement	8,3%	4,4%
	Jamais	88,8%	93,3%
Clubs échangistes			
	Régulièrement	1,5%	1,2%
	Occasionnellement	2,4%	2,7%
	Jamais	96,2%	96,2%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)			
	Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	47,5%

	N = 3 669	n = 520
Région socio-sanitaire	100%	14,2%
Proportion de l'échantillon		
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	54,4%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants		
Oui	35,2%	32,5%
<i>Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant</i>	N = 1 283	n = 169
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		
Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	81,3%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	13,5%
Ne souhaite pas être identifié	7,3%	5,3%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion		
Jamais	30,9%	36,7%
Moins d'une fois par mois	26,2%	30,6%
Une fois par mois	17,3%	16,7%
Une fois par semaine	15,7%	9,4%
Plusieurs fois par semaine	8,4%	6,3%
Tous les jours ou presque	1,4%	0,2%
Cannabis		
Jamais	63,6%	66,7%
1 à 2 fois	12,2%	11,5%
3 à 9 fois	8,0%	7,7%
10 fois et plus	16,2%	14,0%
Poppers		
Jamais	75,2%	76,2%
1 à 2 fois	9,9%	10,2%
3 à 9 fois	6,2%	5,2%
10 fois et plus	8,6%	8,5%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	80,0%
1 à 2 fois	7,5%	7,3%
3 à 9 fois	6,2%	6,7%
10 fois et plus	6,3%	6,0%
Amphétamines		

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Jamais	90,1%	91,2%
1 à 2 fois	4,8%	4,0%
3 à 9 fois	2,6%	1,7%
10 fois et plus	2,6%	3,1%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	92,7%
1 à 2 fois	5,9%	3,8%
3 à 9 fois	2,3%	2,1%
10 fois et plus	1,4%	1,3%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	93,3%
1 à 2 fois	4,3%	3,8%
3 à 9 fois	2,2%	0,8%
10 fois et plus	1,9%	2,1%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	95,8%
1 à 2 fois	1,6%	0,6%
3 à 9 fois	0,8%	0,8%
10 fois et plus	3,0%	2,9%
MDMA		
Jamais	94,7%	95,6%
1 à 2 fois	3,5%	3,3%
3 à 9 fois	1,1%	0,8%
10 fois et plus	0,6%	0,4%
GHB		
Jamais	95,2%	96,9%
1 à 2 fois	2,7%	2,1%
3 à 9 fois	1,2%	0,4%
10 fois et plus	0,9%	0,6%
Kétamine		
Jamais	97,5%	98,3%
1 à 2 fois	1,4%	1,3%
3 à 9 fois	0,6%	0,2%
10 fois et plus	0,5%	0,2%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	98,8%
1 à 2 fois	1,0%	0,6%
3 à 9 fois	0,5%	0,4%
10 fois et plus	0,5%	0,2%
Crack		
Jamais	98,6%	99,2%
1 à 2 fois	0,9%	0,4%
3 à 9 fois	0,2%	0,2%
10 fois et plus	0,4%	0,2%
Héroïne		
Jamais	99,6%	99,8%
1 à 2 fois	0,1%	0,0%
3 à 9 fois	0,1%	0,0%
10 fois et plus	0,2%	0,2%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	53,8%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>	N = 657	n = 83
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>	N = 2 988	n = 280
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	62,5%
Dans des soirées / établissements	24,0%	22,3%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	13,5%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	3,7%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	3,4%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	1,0%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	6,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 327	n = 32
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		
Contre de l'argent	83,5%	81,3%
Contre des services	15,0%	18,8%
Contre des cadeaux	13,8%	21,9%
Contre de la drogue	8,3%	9,4%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	3,1%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	43,8%
Compensation proposée	49,2%	40,6%
Autres configurations	12,8%	15,6%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 14
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	14,3%
Non	76,6%	85,7%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	4,82 ± 5,51
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	40,09 ± 11,64
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	0,0%
Environ du même âge	14,5%	15,4%
Plus âgés	69,4%	69,2%
D'âges variés	12,1%	15,4%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	30,8%
Bisexuels	28,2%	30,8%
Hétérosexuels	9,7%	38,5%
Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	53,8%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	38,5%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	38,5%
Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	23,1%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	0,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	15,4%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	7,7%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 14
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	15,4%

Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	38,5%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	7,7%
Relation anale	73,2%	38,5%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 90	n = 5
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	40,0%
Régulièrement	30,0%	40,0%
Consentie sans conditions	51,0%	50,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	50,0%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	40,0%
Non	52,2%	60,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...	N = 79	n = 5
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	20,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	40,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 13
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe	3,98 ± 4,82	1,73 ± 1,01

		(moyenne ± écart-type)	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)		29,17 ± 8,58	28,85 ± 7,74
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	75,9%	76,9%
	Environ du même âge	15,4%	15,4%
	Plus âgés	5,6%	7,7%
	D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	58,4%	69,2%
	Bisexuels	24,8%	23,1%
	Hétérosexuels	5,6%	7,7%
	Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	10,4%	23,1%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	69,2%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	46,2%
	À partir de réseaux sociaux	13,6%	23,1%
	Par des sites spécialisés	12,3%	7,7%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	7,7%
	Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	15,4%
	Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	0,0%
	Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
	Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 13
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	7,7%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	15,4%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	7,7%
Relation anale	49,7%	38,5%
Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 79	n = 5
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	20,0%
Régulièrement	25,6%	20,0%
Consentie sans conditions	59,6%	50,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%

Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	40,0%
Non	69,6%	60,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 5
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	20,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Dépistage VIH		
Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	41,5%
Oui, il y a plus d'un an	28,7%	24,8%
Non, jamais	29,7%	33,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH</i>	N = 2 554	n = 343
Résultat du dernier test VIH		
Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	88,3%
Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	5,5%
Séropositif	7,0%	3,2%
En attente des résultats	2,0%	1,5%
N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,5%
<i>Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH</i>	N = 1 079	n = 175
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pense être séronégatif	79,1%	80,0%
N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	4,6%
Pense être séropositif	2,5%	4,0%
Ne veut pas savoir	15,8%	14,9%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois		
Oui	1,3%	0,6%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Discuter du statut avec les partenaires stables		
Jamais	22,2%	24,2%
Parfois	17,9%	14,5%
Toujours	38,7%	37,3%
Non concerné	21,2%	24,0%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels		
Jamais	24,9%	24,1%
Parfois	25,4%	22,0%
Toujours	28,8%	30,9%
Non concerné	20,9%	23,0%
Discuter du statut avec les amis ou la famille		
Jamais	45,2%	44,7%
Parfois	20,2%	18,2%
Toujours	12,4%	11,6%
Non concerné	22,2%	25,5%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Dépistage du VHC		
Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	31,4%
Oui, il y a plus d'un an	26,6%	20,8%
Non, jamais	30,8%	35,1%
Ne sait pas	11,6%	12,7%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC	N = 2 102	n = 271
Statut VHC		
Séropositif	4,2%	3,0%
N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	1,8%
Séronégatif	90,4%	90,4%
Ne sait pas	4,2%	4,8%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	14,7%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	3,1%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	5,4%
	Chlamydia	4,2%	4,4%
	Syphilis	3,0%	3,1%
	Herpès génital	2,8%	2,7%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,6%
	Hépatite B	1,0%	0,8%
	Hépatite A	0,9%	0,8%
	LGV	0,4%	0,4%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique			
	Oui	70,4%	67,5%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires			
	Oui	82,3%	79,3%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres			
	Pas du tout importante	5,1%	5,4%
	Assez importante	53,4%	55,5%
	Très importante	32,4%	30,6%
	Extrêmement importante	9,1%	8,5%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 520 14,2%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je me suis senti seul	40,8%	45,0%
	Je me suis senti déprimé	35,5%	35,5%
	J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	12,5%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants			
	Je suis aussi valable que les autres	88,9%	86,7%
	Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	85,1%
	J'aime faire face à des défis	73,9%	70,9%
	Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	70,9%
	Je recherche les sensations fortes	40,7%	41,6%

Je prends des risques dans la vie | 34,8% 34,8%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	19,4%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	20,2%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	2,1%
Surpoids	17,4%	16,4%
Manières	10,6%	12,7%
VIH+	3,5%	1,2%
Origine ethnoculturelle	3,4%	1,6%
Identité de genre	2,1%	1,6%
Travail du sexe	1,5%	0,6%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle	N = 789	n = 99
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	39,4%
Au travail	27,5%	36,4%
Dans le milieu gai	9,5%	1,0%
Sur Internet	25,5%	15,2%
Ailleurs ou en général	50,4%	35,4%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids	N = 627	n = 84
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	14,3%
Au travail	13,4%	10,7%
Dans le milieu gai	55,0%	56,0%
Sur Internet	50,9%	58,3%
Ailleurs ou en général	34,8%	32,1%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 65
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	43,1%
Au travail	24,7%	29,2%
Dans le milieu gai	23,4%	20,0%
Sur Internet	24,1%	13,8%
Ailleurs ou en général	47,8%	40,0%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 8
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	37,5%
Au travail	31,4%	12,5%
Dans le milieu gai	28,9%	0,0%
Sur Internet	33,9%	0,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	50,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 8
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	25,0%
Dans le milieu gai	17,1%	12,5%
Sur Internet	35,5%	12,5%
Ailleurs ou en général	40,8%	50,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 6

Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À l'école	5,6%	0,0%
	Au travail	12,7%	0,0%
	Dans le milieu gai	45,2%	16,7%
	Sur Internet	46,0%	66,7%
	Ailleurs ou en général	43,7%	33,3%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe		N = 54	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À l'école	5,6%	33,3%
	Au travail	14,8%	33,3%
	Dans le milieu gai	27,8%	0,0%
	Sur Internet	40,7%	0,0%
	Ailleurs ou en général	40,7%	33,3%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Recherche de partenaires stables	31,0%	46,0%
	Relations de couple	27,2%	38,4%
	Rupture d'une relation	22,1%	33,5%
	Relations familiales	21,4%	35,4%
	Recherche d'amis	18,0%	32,9%
	Violence dans le couple	3,0%	7,0%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon		100%	14,2%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Anxiété	26,6%	33,5%
	Dépression	20,0%	28,5%
	Troubles de l'alimentation	18,5%	29,7%
	VIH	5,2%	6,1%
	Hépatite C	1,6%	3,1%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	48,6%
Solitude / isolement	22,7%	34,3%
<i>Coming out</i>	11,9%	20,0%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	19,6%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	13,1%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	8,6%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,6%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	41,4%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	36,2%
Sexualité compulsive	16,0%	29,8%
Tabagisme	15,4%	18,7%
Consommation d'alcool	7,8%	14,8%
Consommation de drogues	5,1%	10,3%
Jeu compulsif	1,3%	2,0%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 520
Proportion de l'échantillon	100%	14,2%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	33,1%
Prévention VIH	19,5%	27,6%
Dépistage VIH	19,1%	29,7%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	28,5%
Traitement des ITSS	11,8%	19,3%

Montréal

Cette région comporte le plus grand nombre de répondants à l'étude en représentant plus du quart de l'échantillon (n = 1063). La médiane d'âge chez ces hommes est de 38 ans et ils ont davantage été recrutés via Facebook (tableau 1.1). Étant donné le grand centre urbain, la réalité de ces répondants diverge d'ailleurs davantage de l'échantillon québécois en comparaison avec d'autres régions de la province. Notamment, ils ont plus souvent des origines ethnoculturelles autres que canadienne (tableau 1.2) ont complété des études universitaires dans plus de la moitié des cas et, plus souvent, rapportent un revenu de 30 000\$ et plus par an (tableau 1.3). Ils sont davantage homocentrés : leurs amis sont plus souvent homosexuels ou d'orientations sexuelles mixtes. De plus, ils sont plus nombreux à s'identifier à la communauté gaie et à avoir dévoilé leur orientation sexuelle à leur entourage (tableaux 1.6 et 1.7). Du côté de leur consommation d'Internet, ces répondants sont plus nombreux à l'utiliser pour du contenu pornographique (tableau 2.3).

Au niveau de leurs partenaires occasionnels masculins, les Montréalais semblent en avoir eu qui se présentaient dans un plus grand nombre de cas comme des gais (tableau 3.2). Au niveau de leurs pratiques sexuelles avec ces partenaires, les Montréalais ont plus souvent rapporté avoir léché ou s'être fait lécher l'anus, adopté des pratiques alternatives (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM) (tableau 3.3) ainsi qu'avoir pratiqué la pénétration anale (tableau 3.4). Parmi les participants ayant rapporté avoir pratiqué la pénétration anale avec partenaire occasionnel, ceux qui ont pratiqué la pénétration anale non protégée sont plus nombreux à l'avoir fait avec un partenaire occasionnel séropositif, séroinconnu ou séronégatif (tableau 3.5). Cela laisse à supposer que les Montréalais connaissent plus souvent le statut sérologique de leurs partenaires occasionnels, puisqu'ils ne sont pas plus nombreux à avoir adopté la pratique comparativement à l'ensemble québécois. Quant à lui, le nombre moyen de partenaires occasionnelles féminines est plus petit chez les hommes demeurant à Montréal en contraste avec l'ensemble de l'échantillon. Cela concorde avec le fait qu'ils semblent plus homocentrés, à la lumière de ce qui a été présenté ci-haut. Parmi les hommes rapportant au moins une partenaire occasionnelle, ces hommes sont moins nombreux à avoir eu des relations sexuelles non protégées de façon régulière avec ces dernières (tableau 3.6).

Parmi les hommes ayant rapporté une relation stable ou de couple au cours des 12 derniers mois, les Montréalais sont plus nombreux à avoir eu un partenaire dépisté pour le VIH (tableau 4.2). Ils

sont aussi plus nombreux à ce que le partenaire soit de statut séropositif. Chez les répondants dont le partenaire n'a pas été testé pour le VIH, les répondants Montréalais supposent plus souvent un partenaire séronégatif (tableau 4.5).

Concernant la pratique de relations anales intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*), les Montréalais sont plus nombreux à l'avoir adoptée (tableau 5.1). Parmi ceux l'ayant pratiquée auprès de partenaires occasionnels uniquement, les partenaires étaient plus souvent de statut sérodivergent au leur, de même que dans des contextes à risque (par exemple, dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires tels que des saunas) (tableau 5.3). Les hommes ayant adopté cette pratique dans le cadre de leur couple et avec des partenaires occasionnels sont aussi plus nombreux à avoir des partenaires de statut sérodivergent et à avoir adopté la pratique dans des contextes à risque (tableau 5.4).

Les Montréalais fréquentent plus souvent les établissements gais, des saunas ainsi que des discothèques, bars ou cafés dans le but de rencontrer (tableau 6.1). En ce sens, il est probable que ces répondants fréquentent davantage ces lieux, car ils y ont davantage accès. Ces hommes sont également plus nombreux à utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant (tableau 6.2). Parmi les hommes ayant rapporté avoir eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe au cours des 12 derniers mois, les travailleurs du sexe montréalais ont plus souvent déclaré que ces activités représentent une large part de leur revenu (tableau 6.1).

Dans un autre ordre d'idées, les Montréalais sont plus nombreux à rapporter la consommation de substances au cours des 12 derniers mois (tableaux 7.1 et 7.2) et les hommes rapportant avoir consommé au moins une drogue ou 5 verres d'alcool et plus lors d'une même occasion sont plus nombreux à l'avoir fait à la maison ou en privé, dans des soirées ou établissements ou afin d'améliorer leurs performances ou sensations sexuelles (tableau 7.2).

Au niveau de leurs préoccupations, ces participants se disent plus anxieux, plus déprimés ou préoccupés de leur santé sexuelle, mais moins préoccupés de leur *coming out* que l'ensemble des Québécois (tableaux 8.2, 8.3 et 8.5).

Les Montréalais sont plus nombreux à s'être faits dépister pour le VIH au cours des 12 derniers mois et parmi ceux n'ayant pas été dépistés au cours de cette période, à penser être séronégatifs (tableau 9.1). Ils discutent plus souvent de leur statut sérologique avec leur entourage (tableau

9.2). Ils sont aussi plus nombreux à avoir été dépistés pour l'hépatite C (tableau 9.3) ainsi qu'à avoir eu au moins une ITS au cours des 12 derniers mois (tableau 9.4).

Par ailleurs, ces répondants se sont plus souvent dits déprimés (tableau 10.2). Du point de vue des objets de discrimination, ce qui semble ressortir le plus est que les Montréalais en ressentent plus au sein du milieu gai (tableaux 11.2 à 11.8), quoiqu'ils ne rapportent pas ces sentiments de discrimination dans des proportions très différentes de l'ensemble québécois (tableau 11.1). Cela semble cohérent du fait qu'ils fréquentent davantage des lieux et établissements gais dans le but de rencontrer, et qu'ils sont plus homocentrés en général.

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	38
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	11,1%
	Facebook	38,7%	45,9%
	Sites de rencontre	52,0%	43,0%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	78,6%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	6,5%
	Né à l'étranger	6,9%	15,0%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	0,9%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	54,1%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	63,2%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	4,0%
	Études à temps plein	21,4%	19,9%
	Travail à temps partiel	17,5%	17,5%
	Travail à temps plein	46,2%	46,9%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	9,7%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	4,2%
	Congé de maladie	1,8%	2,2%
	Retraite	11,6%	8,9%
	Autre	2,3%	3,4%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	55,8%
	En relation avec un homme	28,8%	31,0%
	En relation avec une femme	6,1%	4,2%
	Divorcé	5,0%	4,0%
	Marié avec une femme	3,9%	1,7%
	Marié avec un homme	2,9%	3,7%
	En union civile avec un homme	2,8%	2,4%
	Séparé	1,7%	0,9%
	Veuf	0,9%	1,1%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,5%
Enfants			
	Non	80,6%	87,2%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	8,7%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	4,0%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	42,4%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	24,9%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	7,8%
	Habite en colocation/amis	14,0%	18,5%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	5,5%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	3,5%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,2%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,2%
	Autres	0,9%	0,4%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne \pm écart-type)	19,21 \pm 7,70	18,40 \pm 5,96
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	74,7%
	Surtout envers les hommes	16,0%	14,5%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	8,4%
	Surtout envers les femmes	3,3%	2,4%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,1%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	82,5%
	Surtout avec des hommes	11,0%	8,8%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	5,7%
	Surtout avec des femmes	4,2%	2,9%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,1%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	81,0%
	Bisexuelle	17,4%	13,6%
	En questionnement	2,6%	2,8%
	Hétérosexuelle	0,7%	0,3%
	Queer	0,7%	1,3%
	Autres	0,6%	0,9%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	49,2%
	Oui	32,6%	42,0%
	Ne sait pas	11,7%	8,9%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	73,5%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	71,4%
	À la fratrie	61,5%	67,7%
	Aux collègues de travail	52,5%	60,5%
	Au médecin	48,7%	57,3%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	37,1%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	44,1%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	15,4%
	Sans amis	2,1%	1,8%
	Autres	1,1%	1,6%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	67,0%
	Ordinateur portable	61,2%	64,3%
	Téléphone mobile	49,2%	57,9%
	Tablette	23,0%	26,2%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	6,2%
	Télé numérique	4,3%	5,6%

Autres | 0,7% 0,8%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,8%
6 à 12 mois	3,7%	4,3%
1 à 3 ans	16,8%	15,0%
4 à 6 ans	21,8%	18,7%
7 ans et plus	55,1%	59,2%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	9,12 ± 11,16 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	63,0%
Pour du contenu pornographique	58,5%	61,9%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	33,7%
Pour des raisons affectives	23,1%	23,0%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	16,8%
Pour du cybersexe	14,8%	13,4%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	12,4%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	3,1%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	90,3%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 960
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	50,7%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	27,8%
Plusieurs fois par mois	9,5%	9,8%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	11,8%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	40,3%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	49,8%
Majoritairement homosexuel	7,6%	9,9%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	64,1%
	Rencontres en ligne	42,4%	42,8%
	Interactions en ligne	34,0%	34,3%
	Pornographie	30,2%	29,6%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	14,0%
	Plutôt positif	41,7%	42,6%
	Aucun effet	30,3%	28,1%
	Plutôt négatif	11,5%	13,5%
	Négatif	1,5%	1,8%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	86,6%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 921
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	13,32 ± 25,68 / 6,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	29,08 ± 47,37
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	6,13 ± 23,53
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	7,98 ± 13,98
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	40,87 ± 118,95

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 921
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	40,44 ± 116,40
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	24,0%
Plus jeunes	23,4%	38,0%
Plus âgés	20,3%	19,9%
D'âges variés	16,2%	18,2%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	79,5%
Bisexuels	20,1%	11,3%
Hétérosexuels	3,8%	3,2%
Ne sait pas	5,7%	6,1%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	17,8%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	32,8%
Non (relation exclusive)	18,9%	18,0%
Non (pas en couple)	48,3%	49,3%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 921
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	84,6%
Se faire sucer	73,9%	75,3%
S'embrasser	69,0%	70,8%
Masturbation réciproque	67,9%	66,9%
Se masser	32,7%	31,5%
Se faire pénétrer	32,6%	35,0%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	36,6%
Pénétrer	26,5%	27,6%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	14,0%
Sexe en groupe	4,4%	5,3%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	40,2%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	4,9%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	2,2%
Fist-fucking	1,3%	1,1%
Urophilie	1,6%	2,2%
Scatophilie	0,3%	0,6%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Condom pour fellation	6,7%	5,7%
	Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	22,0%
	Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	22,5%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
	Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 921
Relation anale avec partenaires occasionnels			
	Oui	71,7%	77,2%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels			
	Au moins une fois	57,5%	57,2%
	Régulièrement	16,6%	16,3%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
	Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
	<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 400
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif			
	Oui	12,6%	24,1%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu			
	Oui	43,2%	52,4%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif			
	Oui	58,0%	67,3%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

		Total	Région
	Statut sérologique	N = 3 669	n = 1 063
	Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine			
	Oui	11,7%	10,5%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 111
Nombre de partenaires occasionnelles féminines			
	Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,37 ± 2,21 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	31,5%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	50,5%
	Régulièrement	37,0%	?

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 56
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	1,8%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	55,4%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	17,9%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	51,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 542
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	35,14 ± 12,65
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	59,4%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	64,9%
	Plusieurs mois	27,8%	25,8%
	Plusieurs semaines	10,0%	9,2%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	73,8%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 542
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	71,7%
Non	18,7%	11,6%
Ne sait pas	18,4%	16,6%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 388
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	83,9%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,3%
Séropositif	6,6%	13,2%
Ne sait pas	3,6%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 156
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	74,4%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	4,5%
Séropositif	0,6%	1,9%
Ne sait pas	30,5%	19,2%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 542
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	76,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 414
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	77,1%
Régulièrement	58,2%	57,7%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 542
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	34,1%
Non	45,8%	44,9%
Ne sait pas	21,6%	21,0%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (<i>barebacking</i> dans le questionnaire)		
Non	66,3%	61,3%
Oui	33,7%	38,7%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	10,0%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	15,5%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	13,2%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple</i>	N = 350	n = 106
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	72,3%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	81,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	55,0%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	57,4%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 440	n = 165
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	86,8%
Séroinconnu	67,7%	67,5%
Sérodivergent	24,9%	31,6%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	38,5%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	52,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	59,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	63,8%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	72,9%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	92,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	59,9%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	46,3%
En association avec la consommation de substances	32,0%	32,2%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	42,4%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	31,7%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	16,1%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	10,0%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 140
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	93,3%
Séroinconnu	58,1%	56,5%
Sérodivergent	27,1%	36,9%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	34,7%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	78,8%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	74,2%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	70,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	69,9%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	98,6%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	49,6%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	42,6%
En association avec la consommation de substances	33,3%	40,6 %
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	40,2%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	31,5%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	22,6 %
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	9,8%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	23,0%
	Occasionnellement	41,4%	45,8%
	Jamais	43,9%	31,2%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	8,1%
	Occasionnellement	29,0%	33,0%
	Jamais	63,2%	58,9%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	8,5%
	Occasionnellement	26,2%	25,3%
	Jamais	63,8%	66,2%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	52,7%
	Occasionnellement	32,7%	33,1%
	Jamais	14,3%	14,2%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	20,9%
	Occasionnellement	39,3%	43,4%
	Jamais	44,8%	35,7%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	6,0%
	Occasionnellement	25,9%	26,5%
	Jamais	67,5%	67,5%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	10,9%
	Occasionnellement	24,0%	29,3%
	Jamais	68,0%	59,8%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	6,6%
	Occasionnellement	20,5%	23,0%
	Jamais	73,8%	70,4%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	3,0%

		N = 3 669	n = 1 063
Région socio-sanitaire		100%	29,0%
Proportion de l'échantillon			
	Occasionnellement	11,0%	12,1%
	Jamais	86,8%	84,9%
Sex club / backroom			
	Régulièrement	2,9%	3,3%
	Occasionnellement	8,3%	11,5%
	Jamais	88,8%	85,2%
Clubs échangistes			
	Régulièrement	1,5%	1,5%
	Occasionnellement	2,4%	2,7%
	Jamais	96,2%	95,8%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)			
	Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)	47,7%	54,8%
	Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)	58,4%	67,2%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	43,5%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant			
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux		N = 1 283	n = 462
	Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	77,1%
	Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	16,7%
	Ne souhaite pas être identifié	7,3%	6,2%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	27,3%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	23,2%
	Une fois par mois	17,3%	19,4%
	Une fois par semaine	15,7%	18,3%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	9,7%
	Tous les jours ou presque	1,4%	2,1%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	55,7%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
1 à 2 fois	12,2%	14,0%
3 à 9 fois	8,0%	10,7%
10 fois et plus	16,2%	19,6%
Poppers		
Jamais	75,2%	67,8%
1 à 2 fois	9,9%	11,6%
3 à 9 fois	6,2%	9,7%
10 fois et plus	8,6%	10,9%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	75,9%
1 à 2 fois	7,5%	8,7%
3 à 9 fois	6,2%	7,5%
10 fois et plus	6,3%	7,8%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	88,6%
1 à 2 fois	4,8%	6,2%
3 à 9 fois	2,6%	2,8%
10 fois et plus	2,6%	2,4%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	86,6%
1 à 2 fois	5,9%	7,5%
3 à 9 fois	2,3%	3,8%
10 fois et plus	1,4%	2,1%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	87,2%
1 à 2 fois	4,3%	5,4%
3 à 9 fois	2,2%	3,9%
10 fois et plus	1,9%	3,6%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	94,5%
1 à 2 fois	1,6%	2,2%
3 à 9 fois	0,8%	0,8%
10 fois et plus	3,0%	2,4%
MDMA		
Jamais	94,7%	89,8%
1 à 2 fois	3,5%	6,6%
3 à 9 fois	1,1%	2,5%
10 fois et plus	0,6%	1,0%
GHB		
Jamais	95,2%	90,8%
1 à 2 fois	2,7%	4,3%
3 à 9 fois	1,2%	2,7%
10 fois et plus	0,9%	2,2%
Kétamine		
Jamais	97,5%	94,5%
1 à 2 fois	1,4%	2,8%
3 à 9 fois	0,6%	1,6%
10 fois et plus	0,5%	1,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	95,6%
1 à 2 fois	1,0%	2,4%
3 à 9 fois	0,5%	1,3%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Crack	10 fois et plus	0,5%	0,8%
	Jamais	98,6%	97,6%
	1 à 2 fois	0,9%	1,7%
	3 à 9 fois	0,2%	0,3%
	10 fois et plus	0,4%	0,4%
Héroïne	Jamais	99,6%	99,5%
	1 à 2 fois	0,1%	0,3%
	3 à 9 fois	0,1%	0,0%
	10 fois et plus	0,2%	0,2%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
	Oui	58,7%	67,1%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		N = 657	n = 251
	Oui	2,5%	2,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		N = 2 988	n = 713
	À la maison ou en privé	63,5%	68,0%
	Dans des soirées / établissements	24,0%	29,8%
	Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	20,2%
	Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	5,1%
	Plusieurs produits simultanément	4,3%	6,9%
	Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	2,1%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe			
	Au moins une fois	9,0%	11,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>		N = 327	n = 119

Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle			
	Contre de l'argent	83,5%	84,9%
	Contre des services	15,0%	16,8%
	Contre des cadeaux	13,8%	10,1%
	Contre de la drogue	8,3%	8,4%
	Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	6,7%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe			
	Compensation reçue	37,9%	37,0%
	Compensation proposée	49,2%	52,1%
	Autres configurations	12,8%	10,9%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe		N = 124	n = 44
Activité représentant une large part du revenu			
	Oui	14,8%	19,6%
	Non	76,6%	69,6%
	Souhaite ne pas répondre	8,6%	10,9%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région	
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063	
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%	
Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2	
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe			
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	9,25 ± 17,77	
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	45,70 ± 11,02	
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi			
	Plus jeunes	4,0%	4,5%
	Environ du même âge	14,5%	4,5%
	Plus âgés	69,4%	72,7%
	D'âges variés	12,1%	18,2%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Gais	46,8%	50,0%
	Bisexuels	28,2%	18,2%
	Hétérosexuels	9,7%	4,5%
	Ne sait pas	15,3%	27,3%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe			
	Oui	4,8%	6,8%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	61,4%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	50,0%
	À partir de réseaux sociaux	25,8%	20,5%
	Par des sites spécialisés	13,7%	20,5%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	20,5%

Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	11,4%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	9,1%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	4,5%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	9,1%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 44
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	4,5%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	18,2%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	13,6%
Relation anale	73,2%	72,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 32
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	53,1%
Régulièrement	30,0%	37,5%
Consentie sans conditions	51,0%	47,1%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	52,9%
Imposée sans consentement	14,3%	5,9%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	5,9%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	53,1%
Non	52,2%	40,6%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	6,3%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79	n = 32
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	6,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	12,5%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	34,4%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 62
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	4,27 ± 5,61
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	28,52 ± 7,56
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	73,0%
Environ du même âge	15,4%	19,0%
Plus âgés	5,6%	3,2%
D'âges variés	3,1%	4,8%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	66,1%
Bisexuels	24,8%	21,0%
Hétérosexuels	5,6%	6,5%
Ne sait pas	11,2%	6,5%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	11,1%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	46,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	41,3%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	15,9%
Par des sites spécialisés	12,3%	7,9%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	15,9%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	11,1%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	6,3%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	6,3%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	1,6%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 62
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	11,1%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	17,5%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	9,5%
Relation anale	49,7%	53,2%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 33
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	57,6%
Régulièrement	25,6%	21,2%
Consentie sans conditions	59,6%	58,3%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	12,5%
Imposée sans consentement	4,3%	8,3%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	4,2%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	30,3%
Non	69,6%	66,7%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	3,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	12,1%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	27,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	36,4%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	50,8%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	30,4%
	Non, jamais	29,7%	18,8%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 863
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	82,7%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	5,0%
	Séropositif	7,0%	11,1%
	En attente des résultats	2,0%	0,9%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	0,2%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 200
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	86,0%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	4,0%
	Pense être séropositif	2,5%	2,0%
	Ne veut pas savoir	15,8%	11,0%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	2,2%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon		100%	29,0%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	15,9%
	Parfois	17,9%	17,3%
	Toujours	38,7%	45,8%
	Non concerné	21,2%	21,0%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	18,7%
	Parfois	25,4%	30,3%
	Toujours	28,8%	32,0%
	Non concerné	20,9%	19,1%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	41,8%
	Parfois	20,2%	25,9%
	Toujours	12,4%	14,6%
	Non concerné	22,2%	17,7%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	37,7%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	30,0%
	Non, jamais	30,8%	22,7%
	Ne sait pas	11,6%	9,6%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 721
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	5,0%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	1,1%
	Séronégatif	90,4%	91,7%
	Ne sait pas	4,2%	2,2%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 1 063 29,0%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	19,7%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	6,7%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	6,1%
	Chlamydia	4,2%	4,6%
	Syphilis	3,0%	4,8%
	Herpès génital	2,8%	3,5%
	Gonococcie rectale	1,0%	1,4%
	Hépatite B	1,0%	0,6%
	Hépatite A	0,9%	0,8%
	LGV	0,4%	0,3%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	69,5%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	85,2%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	3,3%
Assez importante	53,4%	50,8%
Très importante	32,4%	35,3%
Extrêmement importante	9,1%	10,6%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	44,5%
Je me suis senti déprimé	35,5%	42,4%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	14,4%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	88,6%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	85,3%
J'aime faire face à des défis	73,9%	77,8%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	71,5%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	43,4%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	36,7%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	23,0%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	17,7%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	2,0%
Surpoids	17,4%	18,1%
Manières	10,6%	10,4%
VIH+	3,5%	6,6%
Origine ethnoculturelle	3,4%	6,7%
Identité de genre	2,1%	2,0%

Travail du sexe	1,5%	1,9%
-----------------	------	------

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 242
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	14,5%
Au travail	27,5%	27,7%
Dans le milieu gai	9,5%	13,2%
Sur Internet	25,5%	27,3%
Ailleurs ou en général	50,4%	58,7%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 191
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	5,8%
Au travail	13,4%	12,6%
Dans le milieu gai	55,0%	66,5%
Sur Internet	50,9%	49,7%
Ailleurs ou en général	34,8%	34,0%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 110
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	14,5%
Au travail	24,7%	19,1%
Dans le milieu gai	23,4%	30,9%
Sur Internet	24,1%	25,5%
Ailleurs ou en général	47,8%	54,5%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 71
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	7,0%
Au travail	31,4%	35,2%
Dans le milieu gai	28,9%	38,0%
Sur Internet	33,9%	36,6%
Ailleurs ou en général	46,3%	43,7%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 21
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	14,3%
Au travail	22,4%	19,0%
Dans le milieu gai	17,1%	28,6%
Sur Internet	35,5%	33,3%
Ailleurs ou en général	40,8%	38,1%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 70
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	4,3%
Au travail	12,7%	11,4%
Dans le milieu gai	45,2%	58,6%
Sur Internet	46,0%	50,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	40,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 20
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	5,0%
Au travail	14,8%	20,0%
Dans le milieu gai	27,8%	40,0%
Sur Internet	40,7%	35,0%
Ailleurs ou en général	40,7%	40,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	43,3%
Relations de couple	27,2%	41,3%
Rupture d'une relation	22,1%	30,4%
Relations familiales	21,4%	37,0%
Recherche d'amis	18,0%	34,8%
Violence dans le couple	3,0%	5,2%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	45,3%
Dépression	20,0%	38,0%
Troubles de l'alimentation	18,5%	31,6%
VIH	5,2%	11,1%
Hépatite C	1,6%	3,4%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	49,6%
Solitude / isolement	22,7%	40,6%
<i>Coming out</i>	11,9%	13,9%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	16,7%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	16,1%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	6,6%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	2,4%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	43,8%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	38,3%
Sexualité compulsive	16,0%	32,4%
Tabagisme	15,4%	21,6%
Consommation d'alcool	7,8%	20,6%
Consommation de drogues	5,1%	12,1%
Jeu compulsif	1,3%	2,4%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 1 063
Proportion de l'échantillon	100%	29,0%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	35,2%
Prévention VIH	19,5%	31,0%
Dépistage VIH	19,1%	31,9%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	32,8%
Traitement des ITSS	11,8%	21,6%

Outaouais

Les hommes de cette région représentent environ le cinquième de l'échantillon (n = 97) et leur médiane d'âge est de 32 ans. Ils ont été recrutés via des sites d'informations et sur Facebook dans une plus grande proportion que chez l'échantillon québécois (tableau 1.1). Ils sont plus nombreux à avoir complété des études universitaires, mais moins à déclarer un revenu de 30 000\$ et plus par année (tableau 1.3). Ils sont moins souvent en relation avec un homme, mais plus souvent mariés à un homme ou une femme (tableau 1.4). Ils demeurent plus souvent en colocation ou avec des amis, chez leurs parents ainsi que qu'en couple avec une femme (tableau 1.5). Ils sont plus nombreux à avoir dévoilé leur orientation sexuelle à leurs amis hétérosexuels et à leurs collègues de travail, en plus d'être davantage nombreux à rapporter ne pas avoir d'amis (tableau 1.7). Du côté de leur utilisation d'Internet, ils utilisent moins ce dernier pour du cybersexe, mais plus pour du contenu pornographique (tableau 2.3). Ils sont moins nombreux à se dire dépendants aux interactions et aux rencontres en ligne ainsi qu'à la pornographie (tableau 2.5). Au niveau de leurs lieux de fréquentation dans le but de rencontrer, les hommes provenant de l'Outaouais fréquentent plus souvent des lieux mixtes et des peep shows (tableau 6.1), en plus d'utiliser les applications et sites de rencontres permettant la géolocalisation (tableau 2.5) dans une plus grande proportion. Ils s'identifient plus souvent sur ce type de technologie (tableau 6.2).

Globalement, ils sont moins nombreux à avoir eu un partenaire occasionnel au cours de la dernière année, mais ont eu plus de relations sexuelles avec ces derniers (tableau 3.1). Ces partenaires étaient en moyenne plus jeunes que chez l'échantillon québécois, mais étaient plus souvent plus âgés que le répondant. Ils se sont également plus souvent présentés comme des gais (tableau 3.2). Au niveau de leurs pratiques sexuelles, ils sont plus nombreux à s'être faits sucer et pénétrer ainsi qu'à avoir adopté des pratiques sexuelles alternatives (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM) (tableau 3.3). Ceux ayant eu au moins une partenaire occasionnelle féminine ont plus souvent eu des relations non protégées avec ces dernières et ont moins souvent développé des sentiments envers elles (tableau 3.6). Le statut sérologique de ces partenaires était plus souvent inconnu (tableau 3.7).

Les Outaouais ayant eu un partenaire stable ou de couple au cours de la dernière année ont eu un partenaire en moyenne plus jeune et moins souvent rencontré sur Internet. La relation de couple dure encore au moment de répondre à l'enquête chez une plus petite proportion d'hommes (tableau 4.1). Les partenaires de couple dépistés pour le VIH sont séronégatifs dans une plus grande proportion (tableau 4.3a). Les répondants pratiquent la pénétration anale avec leur partenaire moins souvent que l'ensemble des Québécois mais parmi ceux la pratiquant, celle-ci a plus souvent été non protégée (tableau 4.4). Les partenaires de couple ont eu d'autres partenaires sexuels lors de la relation dans un plus grand nombre (tableau 4.5).

Chez ceux ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) uniquement dans le cadre d'un couple, ils sont plus nombreux à avoir pratiqué l'éjaculation sans se retirer lors de ces relations (tableau 5.2). Ceux qui ont pratiqué la RAISC uniquement avec des partenaires occasionnels ont plus souvent eu des partenaires de statut sérodivergent dans le cadre de cette pratique. Ces partenaires ont également plus souvent éjaculé en eux (tableau 5.3).

Ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont, dans une proportion beaucoup plus grande à l'ensemble de l'échantillon, proposé une compensation, en plus d'avoir plus souvent échangé ces dernières contre de la drogue (tableau 6.1).

Du côté de leur consommation d'alcool et de drogues, ils sont plus nombreux à avoir consommé du Viagra ou du Cialis à 10 reprises et plus au cours de la dernière année (tableau 7.1). Ils consomment plus souvent à la maison ou en privé (tableau 7.2).

Du côté de leur santé sexuelle, ces répondants sont plus nombreux à n'avoir jamais été dépistés pour le VIH (tableau 9.1a) et le VHC au cours des 12 derniers mois (tableau 9.3). Parmi ceux dépistés pour le VIH, ils sont plus nombreux à être séropositifs, tandis que ceux n'ayant jamais été dépistés sont plus nombreux à ne plus être certains d'être séronégatifs (tableau 9.1a). Ils discutent plus souvent de leur statut sérologique avec leurs partenaires stables et leur famille (tableau 9.2).

En ce qui concerne leur santé mentale, ils se sont moins sentis déprimés et recherchent plus les sensations fortes (tableau 10.2). Dans un autre ordre d'idées, ils ont plus été

discriminés à l'égard de leur surpoids (tableau 11.1). Ce type de discrimination a plus souvent pris place ailleurs ou en général (tableau 11.3). Les Outaouais se sentent plus préoccupés par leur relation de couple (tableau 12.1).

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	32
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	16,5%
	Facebook	38,7%	48,5%
	Sites de rencontre	52,0%	35,1%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	85,6%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	6,2%
	Né à l'étranger	6,9%	8,2%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	1,0%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	44,3%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	53,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	6,2%
	Études à temps plein	21,4%	24,7%
	Travail à temps partiel	17,5%	17,5%
	Travail à temps plein	46,2%	44,3%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	7,2%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	3,1%
	Congé de maladie	1,8%	0,0%
	Retraite	11,6%	13,4%
	Autre	2,3%	3,1%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	50,5%
	En relation avec un homme	28,8%	23,7%
	En relation avec une femme	6,1%	7,2%
	Divorcé	5,0%	2,1%
	Marié avec une femme	3,9%	7,2%
	Marié avec un homme	2,9%	8,2%
	En union civile avec un homme	2,8%	2,1%
	Séparé	1,7%	2,1%
	Veuf	0,9%	1,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,0%
Enfants			
	Non	80,6%	79,4%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	14,4%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	6,2%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	22,7%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	19,6%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	22,7%
	Habite en colocation/amis	14,0%	19,6%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	14,4%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	3,1%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	3,1%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne \pm écart-type)	19,21 \pm 7,70	19,39 \pm 8,67
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	69,1%
	Surtout envers les hommes	16,0%	18,6%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	12,4%
	Surtout envers les femmes	3,3%	0,0%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	80,4%
	Surtout avec des hommes	11,0%	10,3%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	5,2%
	Surtout avec des femmes	4,2%	3,1%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	1,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	80,4%
	Bisexuelle	17,4%	13,4%
	En questionnement	2,6%	5,2%
	Hétérosexuelle	0,7%	0,0%
	Queer	0,7%	1,0%
	Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	48,5%
	Oui	32,6%	36,1%
	Ne sait pas	11,7%	15,5%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	70,1%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	72,2%
	À la fratrie	61,5%	60,8%
	Aux collègues de travail	52,5%	58,8%
	Au médecin	48,7%	50,5%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	45,4%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	39,2%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	6,2%
	Sans amis	2,1%	8,2%
	Autres	1,1%	1,0%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	58,8%
	Ordinateur portable	61,2%	75,3%
	Téléphone mobile	49,2%	53,6%
	Tablette	23,0%	18,6%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	4,1%
	Télé numérique	4,3%	3,1%

Autres | 0,7% 1,0%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	2,1%
6 à 12 mois	3,7%	4,1%
1 à 3 ans	16,8%	16,5%
4 à 6 ans	21,8%	24,7%
7 ans et plus	55,1%	52,6%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	9,79 ± 8,97 / 7,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	61,9%
Pour du contenu pornographique	58,5%	66,0%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	27,8%
Pour des raisons affectives	23,1%	23,7%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	17,5%
Pour du cybersexe	14,8%	7,2%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	15,5%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	3,1%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	89,7%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 87
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	56,3%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	31,0%
Plusieurs fois par mois	9,5%	5,7%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	6,9%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	49,4%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	41,4%
Majoritairement homosexuel	7,6%	9,2%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	62,9%
	Rencontres en ligne	42,4%	38,1%
	Interactions en ligne	34,0%	26,8%
	Pornographie	30,2%	23,7%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	20,6%
	Plutôt positif	41,7%	41,2%
	Aucun effet	30,3%	24,7%
	Plutôt négatif	11,5%	12,4%
	Négatif	1,5%	1,0%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	82,5%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 80
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	10,84 ± 15,99 / 5,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	35,08 ± 104,52
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	5,74 ± 14,15
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	7,50 ± 9,99
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,73 ± 0,35

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 80
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	33,07 ± 12,21
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	30,4%
Plus jeunes	23,4%	22,8%
Plus âgés	20,3%	27,8%
D'âges variés	16,2%	19,0%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	75,9%
Bisexuels	20,1%	12,7%
Hétérosexuels	3,8%	3,8%
Ne sait pas	5,7%	7,6%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	25,3%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	33,3%
Non (relation exclusive)	18,9%	16,0%
Non (pas en couple)	48,3%	50,7%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 80
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	88,8%
Se faire sucer	73,9%	85,0%
S'embrasser	69,0%	77,5%
Masturbation réciproque	67,9%	68,8%
Se masser	32,7%	35,0%
Se faire pénétrer	32,6%	37,5%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	30,0%
Pénétrer	26,5%	26,3%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	17,5%
Sexe en groupe	4,4%	0,0%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	37,5%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	3,8%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	0,0%
Fist-fucking	1,3%	0,0%
Urophilie	1,6%	3,8%
Scatophilie	0,3%	0,0%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	5,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	25,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	23,8%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 80
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	75,0%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	50,0%
Régulièrement	16,6%	18,3%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 30
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	13,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	40,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	56,7%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	9,3%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 9
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,21 ± 0,76 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	11,1%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	77,8%
	Régulièrement	37,0%	37,7%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
Statut sérologique		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>		N = 238	n = 7
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	42,9%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	28,6%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	55,7%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>		N = 1 882	n = 54
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	32,17 ± 13,94
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	51,9%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	63,0%
	Plusieurs mois	27,8%	35,2%
	Plusieurs semaines	10,0%	1,9%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	59,3%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 54
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	64,2%
Non	18,7%	17,0%
Ne sait pas	18,4%	18,9%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 34
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	97,1%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	2,9%
Ne sait pas	3,6%	0,0%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 19
Statut sérologique du partenaire de couple (présumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	73,7%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	0,0%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	26,3%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 54
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	67,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 36
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	83,3%
Régulièrement	58,2%	63,9%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 54
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	41,7%
Non	45,8%	30,6%
Ne sait pas	21,6%	27,8%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	65,0%
Oui	33,7%	35,0%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	11,3%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	9,3%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	14,4%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 11
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	80,0%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	90,0%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	66,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	55,6%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 9
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	88,9%
Séroinconnu	67,7%	44,4%
Sérodivergent	24,9%	44,4%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	0,0%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	55,6%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	77,8%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	44,4%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	62,5%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	33,3%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	33,3%
En association avec la consommation de substances	32,0%	33,3%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	33,3%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	22,2%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	22,2%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	11,1%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 14
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	100,0%
Séroinconnu	58,1%	46,2%
Sérodivergent	27,1%	8,3%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	0,0%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	84,6%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	58,3%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	61,5%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	50,0%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	23,1%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	15,4%
En association avec la consommation de substances	33,3%	25,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	23,1%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	15,4%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	15,4%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	8,3%

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	11,3%
	Occasionnellement	41,4%	43,3%
	Jamais	43,9%	45,4%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	9,4%
	Occasionnellement	29,0%	33,3%
	Jamais	63,2%	57,3%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	12,5%
	Occasionnellement	26,2%	26,0%
	Jamais	63,8%	61,5%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	59,8%
	Occasionnellement	32,7%	23,7%
	Jamais	14,3%	16,5%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	13,4%
	Occasionnellement	39,3%	47,4%
	Jamais	44,8%	39,2%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	7,2%
	Occasionnellement	25,9%	19,6%
	Jamais	67,5%	73,2%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	6,2%
	Occasionnellement	24,0%	19,6%
	Jamais	68,0%	74,2%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	8,2%
	Occasionnellement	20,5%	20,6%
	Jamais	73,8%	71,1%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	3,1%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	16,5%
	Jamais	86,8%	80,4%
	Régulièrement	2,9%	4,1%
Clubs échangistes	Occasionnellement	8,3%	10,3%
	Jamais	88,8%	85,6%
	Régulièrement	1,5%	1,0%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Occasionnellement	2,4%	3,1%
	Jamais	96,2%	95,9%
	Régulièrement	1,5%	1,0%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	39,2%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)		58,4%	63,9%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
Oui		35,2%	48,5%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 47
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
Oui, en mettant une photo du visage		77,2%	83,0%
Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé		15,5%	6,4%
Ne souhaite pas être identifié		7,3%	10,6%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
Jamais		30,9%	30,9%
Moins d'une fois par mois		26,2%	26,8%
Une fois par mois		17,3%	11,3%
Une fois par semaine		15,7%	17,5%
Plusieurs fois par semaine		8,4%	11,3%
Tous les jours ou presque		1,4%	2,1%
Cannabis			
Jamais		63,6%	64,9%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
1 à 2 fois	12,2%	12,4%
3 à 9 fois	8,0%	6,2%
10 fois et plus	16,2%	16,5%
Poppers		
Jamais	75,2%	79,4%
1 à 2 fois	9,9%	11,3%
3 à 9 fois	6,2%	4,1%
10 fois et plus	8,6%	5,2%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	75,3%
1 à 2 fois	7,5%	3,1%
3 à 9 fois	6,2%	7,2%
10 fois et plus	6,3%	14,4%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	89,7%
1 à 2 fois	4,8%	3,1%
3 à 9 fois	2,6%	4,1%
10 fois et plus	2,6%	3,1%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	93,8%
1 à 2 fois	5,9%	5,2%
3 à 9 fois	2,3%	0,0%
10 fois et plus	1,4%	1,0%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	94,8%
1 à 2 fois	4,3%	3,1%
3 à 9 fois	2,2%	1,0%
10 fois et plus	1,9%	1,0%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	96,9%
1 à 2 fois	1,6%	1,0%
3 à 9 fois	0,8%	0,0%
10 fois et plus	3,0%	2,1%
MDMA		
Jamais	94,7%	95,9%
1 à 2 fois	3,5%	2,1%
3 à 9 fois	1,1%	1,0%
10 fois et plus	0,6%	1,0%
GHB		
Jamais	95,2%	94,8%
1 à 2 fois	2,7%	4,1%
3 à 9 fois	1,2%	1,0%
10 fois et plus	0,9%	0,0%
Kétamine		
Jamais	97,5%	97,9%
1 à 2 fois	1,4%	2,1%
3 à 9 fois	0,6%	0,0%
10 fois et plus	0,5%	0,0%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	97,9%
1 à 2 fois	1,0%	1,0%
3 à 9 fois	0,5%	0,0%

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Crack	10 fois et plus	0,5%	1,0%
	Jamais	98,6%	100,0%
	1 à 2 fois	0,9%	0,0%
	3 à 9 fois	0,2%	0,0%
	10 fois et plus	0,4%	0,0%
Héroïne	Jamais	99,6%	100,0%
	1 à 2 fois	0,1%	0,0%
	3 à 9 fois	0,1%	0,0%
	10 fois et plus	0,2%	0,0%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois			
	Oui	58,7%	57,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>			
		N = 657	n = 20
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois			
	Oui	2,5%	10,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>			
		N = 2 988	n = 56
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À la maison ou en privé	63,5%	68,4%
	Dans des soirées / établissements	24,0%	25,3%
	Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	16,5%
	Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	6,3%
	Plusieurs produits simultanément	4,3%	3,8%
	Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	5,1%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe			
	Au moins une fois	9,0%	10,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>			
		N = 327	n = 10

Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle			
	Contre de l'argent	83,5%	80,0%
	Contre des services	15,0%	10,0%
	Contre des cadeaux	13,8%	0,0%
	Contre de la drogue	8,3%	20,0%
	Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe			
	Compensation reçue	37,9%	10,0%
	Compensation proposée	49,2%	80,0%
	Autres configurations	12,8%	10,0%
Parmi les répondants rapportant du travail du sexe		N = 124	n = 1
Activité représentant une large part du revenu			
	Oui	14,8%	100,0%
	Non	76,6%	0,0%
	Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 1
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	25,00 ± n/a
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	40,00 ± n/a
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
	Plus jeunes	4,0%
	Environ du même âge	14,5%
	Plus âgés	69,4%
	D'âges variés	12,1%
	0,0%	100,0%
	0,0%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
	Gais	46,8%
	Bisexuels	28,2%
	Hétérosexuels	9,7%
	Ne sait pas	15,3%
	0,0%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
	Oui	4,8%
	0,0%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
	Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%
	Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%
	À partir de réseaux sociaux	25,8%
	Par des sites spécialisés	13,7%
	Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%
	100,0%	100,0%

Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	100,0%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	0,0%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 1
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	0,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	0,0%
Relation anale	73,2%	100,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 1
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	100,0%
Régulièrement	30,0%	0,0%
Consentie sans conditions	51,0%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	100,0%
Imposée sans consentement	14,3%	100,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	100,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	0,0%
Non	52,2%	100,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79	n = 1
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	100,0%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	100,0%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 8
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	3,13 ± 3,04
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	29,00 ± 7,21
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	62,5%
Environ du même âge	15,4%	12,5%
Plus âgés	5,6%	12,5%
D'âges variés	3,1%	12,5%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	25,0%
Bisexuels	24,8%	25,0%
Hétérosexuels	5,6%	0,0%
Ne sait pas	11,2%	50,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	25,0%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	37,5%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	0,0%
Par des sites spécialisés	12,3%	12,5%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	25,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	37,5%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	37,5%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 8
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	12,5%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	0,0%
Relation anale	49,7%	37,5%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 3
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	33,3%
Régulièrement	25,6%	33,3%
Consentie sans conditions	59,6%	100,0%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	0,0%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	100,0%
Non	69,6%	0,0%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 3
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	0,0%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	38,1%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	23,7%
	Non, jamais	29,7%	38,1%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 60
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	85,0%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	0,0%
	Séropositif	7,0%	13,3%
	En attente des résultats	2,0%	0,0%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,7%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 37
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	78,4%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	18,9%
	Pense être séropositif	2,5%	0,0%
	Ne veut pas savoir	15,8%	16,2%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	1,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon		100%	2,6%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	16,5%
	Parfois	17,9%	14,4%
	Toujours	38,7%	45,4%
	Non concerné	21,2%	23,7%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	22,7%
	Parfois	25,4%	22,7%
	Toujours	28,8%	26,8%
	Non concerné	20,9%	27,8%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	36,1%
	Parfois	20,2%	22,7%
	Toujours	12,4%	10,3%
	Non concerné	22,2%	30,9%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	22,7%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	30,9%
	Non, jamais	30,8%	33,0%
	Ne sait pas	11,6%	13,4%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 52
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	1,9%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	1,9%
	Séronégatif	90,4%	96,2%
	Ne sait pas	4,2%	0,0%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 97 2,6%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	12,4%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	3,1%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	0,0%
	Chlamydia	4,2%	4,1%
	Syphilis	3,0%	3,1%
	Herpès génital	2,8%	2,1%
	Gonococcie rectale	1,0%	0,0%
	Hépatite B	1,0%	0,0%
	Hépatite A	0,9%	0,0%
	LGV	0,4%	0,0%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	66,0%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	80,4%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	5,2%
Assez importante	53,4%	49,5%
Très importante	32,4%	35,1%
Extrêmement importante	9,1%	10,3%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	38,1%
Je me suis senti déprimé	35,5%	29,9%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	13,4%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	84,5%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	83,5%
J'aime faire face à des défis	73,9%	69,1%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	71,1%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	46,4%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	30,9%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	20,6%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	14,6%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	1,0%
Surpoids	17,4%	23,7%
Manières	10,6%	8,2%
VIH+	3,5%	5,2%
Origine ethnoculturelle	3,4%	2,1%
Identité de genre	2,1%	3,1%

Travail du sexe | 1,5% 2,1%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 20
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	30,0%
Au travail	27,5%	25,0%
Dans le milieu gai	9,5%	10,0%
Sur Internet	25,5%	15,0%
Ailleurs ou en général	50,4%	60,0%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 23
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	13,0%
Au travail	13,4%	8,7%
Dans le milieu gai	55,0%	56,5%
Sur Internet	50,9%	39,1%
Ailleurs ou en général	34,8%	43,5%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 8
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	25,0%
Au travail	24,7%	37,5%
Dans le milieu gai	23,4%	12,5%
Sur Internet	24,1%	37,5%
Ailleurs ou en général	47,8%	62,5%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 2
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	0,0%
Au travail	31,4%	50,0%
Dans le milieu gai	28,9%	50,0%
Sur Internet	33,9%	50,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	100,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	0,0%
Dans le milieu gai	17,1%	0,0%
Sur Internet	35,5%	33,3%
Ailleurs ou en général	40,8%	100,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 5
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	20,0%
Au travail	12,7%	0,0%
Dans le milieu gai	45,2%	20,0%
Sur Internet	46,0%	20,0%
Ailleurs ou en général	43,7%	40,0%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 2
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	0,0%
Dans le milieu gai	27,8%	50,0%
Sur Internet	40,7%	50,0%
Ailleurs ou en général	40,7%	50,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	51,5%
Relations de couple	27,2%	40,2%
Rupture d'une relation	22,1%	39,2%
Relations familiales	21,4%	40,2%
Recherche d'amis	18,0%	33,0%
Violence dans le couple	3,0%	4,1%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	35,1%
Dépression	20,0%	34,0%
Troubles de l'alimentation	18,5%	26,8%
VIH	5,2%	9,3%
Hépatite C	1,6%	3,1%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	43,3%
Solitude / isolement	22,7%	32,0%
<i>Coming out</i>	11,9%	24,7%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	24,7%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	15,5%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	6,2%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	1,0%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	47,4%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	34,0%
Sexualité compulsive	16,0%	30,9%
Tabagisme	15,4%	20,6%
Consommation d'alcool	7,8%	10,3%
Consommation de drogues	5,1%	7,2%
Jeu compulsif	1,3%	2,1%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 97
Proportion de l'échantillon	100%	2,6%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	25,8%
Prévention VIH	19,5%	23,7%
Dépistage VIH	19,1%	24,7%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	20,6%
Traitement des ITSS	11,8%	12,4%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Saguenéens composent près de 5% de l'échantillon (n = 178). Leur médiane d'âge est de 33 ans. Le plus souvent, ils ont été recrutés via des sites de rencontres (tableau 1.1). Ils sont beaucoup moins nombreux à avoir complété des études universitaires ainsi qu'à rapporter un revenu de 30 000\$ et plus par an. Ils sont plus nombreux à être aux études à temps plein (tableau 1.3). Ils sont également plus nombreux à demeurer avec le père ou la mère (tableau 1.5).

Également, ils utilisent Internet plus souvent pour des aventures sexuelles ou du cybersexe (tableau 2.3). Leurs amis sur les réseaux sociaux sont plus souvent mixtes (tableau 2.4). Ils se disent moins nombreux à être dépendants aux rencontres en ligne ou au cybersexe (tableau 2.6).

Chez ceux ayant eu au moins un partenaire occasionnel masculin, les partenaires étaient en moyenne plus jeunes et ils sont moins nombreux à dire avoir eu des relations sexuelles avec ce type de partenaire alors qu'en couple (tableau 3.2). Du côté de leurs comportements sexuels avec ces partenaires, ils sont moins nombreux à utiliser le condom régulièrement pour les fellations, mais plus nombreux à éjaculer dans la bouche du partenaire et à pratiquer la pénétration anale non protégée (tableaux 3.3 et 3.4). Chez ceux ayant eu une partenaire occasionnelle féminine, ils sont plus nombreux à avoir pratiqué régulièrement des relations non protégées avec elles (tableau 3.6).

Parmi ceux ayant rapporté un partenaire stable ou de couple au cours de la dernière année, celui-ci est en moyenne plus jeune et a moins souvent été rencontré sur Internet (tableau 4.1). Les répondants ont plus souvent pratiqué la pénétration anale dans le cadre de leur couple, que cette dernière soit protégée ou non (tableau 4.4). Ces partenaires ont aussi plus souvent eu d'autres partenaires sexuels (tableau 4.5).

Ceux ayant pratiqué la relation anale intentionnellement sans condom (RAISC ou *barebacking*) uniquement avec des partenaires occasionnels ont eu davantage de partenaires de statut séroinconnu, ont davantage éjaculé sans se retirer de ces partenaires et lors de la pratique, ont plus souvent été plusieurs dans un contexte privé, dans une tournante où ils étaient le passif ou dans le cadre de relations sexuelles tarifées (tableau 5.3). Ceux ayant adopté la pratique dans le cadre d'un couple et auprès de partenaires occasionnels ont plus souvent eu des partenaires dont ils n'ont pas voulu connaître le statut sérologique ou de statut sérodivergent au leur. Les contextes

de pratique ont plus souvent été à risque (par exemple, dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires tels que des saunas) (tableau 5.4).

Au niveau des lieux de rencontres fréquentés dans le but de rencontrer des partenaires, ils fréquentent moins de lieux hétéros (tableau 6.1).

Ceux ayant eu au moins une relation sexuelle dans le cadre du travail du sexe ont plus souvent échangé les relations sexuelles contre des services et ont davantage reçu une compensation ou adopté une autre configuration d'échange (tableau 8.1).

Au niveau du dépistage du VIH, ils sont moins nombreux à avoir été dépistés il y a plus d'un an (tableau 9.1a).

Au niveau de leur santé mentale, ils sont plus nombreux à rechercher des sensations fortes (tableau 10.2). Du côté des discriminations ressenties, ils sont plus nombreux à avoir ressenti un sentiment de discrimination à l'égard de leur orientation sexuelle (tableau 11.1). Ce sentiment de discrimination s'est plus souvent fait ressentir à l'école, dans le milieu gai et sur Internet (tableau 11.2).

En somme, il semble que les caractéristiques différenciant les Saguenéens de l'ensemble des répondants québécois soient souvent dues au fait qu'ils sont plus jeunes que la moyenne de l'échantillon, et soient davantage aux études à temps plein.

Section 1 : Profil sociodémographique et sociosexuel

Tableau 1.1 Profil sociodémographique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Âge du répondant			
	Âge (médiane)	37	33
Site utilisé pour accéder au questionnaire			
	Sites d'information (Fugues et Google ADS)	9,3%	5,1%
	Facebook	38,7%	37,1%
	Sites de rencontre	52,0%	57,9%

Tableau 1.2 Profil ethnoculturel

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Lieu de naissance			
	Né au Canada de parents nés au Canada	89,3%	98,3%
	Né au Canada de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	3,8%	1,1%
	Né à l'étranger	6,9%	0,6%
Origine ethnoculturelle			
	Premières Nations (identifié par les autres)	1,2%	2,2%

Tableau 1.3 Situation socioprofessionnelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Scolarité			
	Études universitaires complétées	37,8%	23,0%
Revenu annuel			
	Revenu de 30 000\$ et plus	58,0%	46,6%
Situation professionnelle principale (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Études à temps partiel	4,1%	2,2%
	Études à temps plein	21,4%	30,3%
	Travail à temps partiel	17,5%	19,1%
	Travail à temps plein	46,2%	43,8%
	Chef d'entreprise / Indépendant	8,3%	3,9%
	Sans emploi (chômage)	4,3%	5,6%
	Congé de maladie	1,8%	2,2%
	Retraite	11,6%	9,6%
	Autre	2,3%	2,8%

Tableau 1.4 Situation familiale

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
État matrimonial actuel (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Célibataire	53,6%	56,7%
	En relation avec un homme	28,8%	31,5%
	En relation avec une femme	6,1%	2,2%
	Divorcé	5,0%	5,1%
	Marié avec une femme	3,9%	5,1%
	Marié avec un homme	2,9%	1,1%
	En union civile avec un homme	2,8%	1,7%
	Séparé	1,7%	1,7%
	Veuf	0,9%	0,0%
	En union civile avec une femme	0,8%	0,0%
Enfants			
	Non	80,6%	80,8%
	Oui, ils demeurent ailleurs	13,7%	15,3%
	Oui, ils demeurent avec vous	5,6%	4,0%

Tableau 1.5 Type de ménage

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Type de ménage ou habitation principale (la majorité du temps) (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Habite seul	38,6%	42,7%
	Habite en couple avec un homme	23,3%	21,9%
	Habite avec le(s) parent(s)	14,8%	21,9%
	Habite en colocation/amis	14,0%	9,6%
	Habite en couple avec une femme	9,3%	6,2%
	Habite avec un membre de la famille	4,4%	3,4%
	Habite en centre d'accueil/ d'hébergement	0,1%	0,0%
	Sans domicile fixe	0,1%	0,0%
	Autres	0,9%	1,1%

Tableau 1.6 Profil sociosexuel

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Âge à la première relation sexuelle consentie avec un homme			
	Âge (moyenne ± écart-type)	19,21 ± 7,70	19,17 ± 7,92
Attirance et désirs sexuels			
	Exclusivement envers les hommes	70,0%	66,9%
	Surtout envers les hommes	16,0%	18,5%
	Autant envers les hommes et les femmes	10,4%	11,8%
	Surtout envers les femmes	3,3%	2,8%
	Exclusivement envers les femmes	0,2%	0,0%

Comportements sexuels			
	Exclusivement avec des hommes	77,4%	75,3%
	Surtout avec des hommes	11,0%	14,0%
	Autant avec des hommes et des femmes	7,3%	9,0%
	Surtout avec des femmes	4,2%	1,7%
	Exclusivement avec des femmes	0,1%	0,0%
Orientation sexuelle			
	Homosexuelle	78,0%	79,2%
	Bisexuelle	17,4%	17,4%
	En questionnement	2,6%	2,8%
	Hétérosexuelle	0,7%	0,6%
	Queer	0,7%	0,0%
	Autres	0,6%	0,0%

Tableau 1.7 Sentiment d'appartenance au milieu gai et environnement social

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Sentiment de faire partie du milieu ou de la communauté gais			
	Non	55,7%	57,3%
	Oui	32,6%	28,7%
	Ne sait pas	11,7%	14,0%
Dévoilement de l'orientation sexuelle (c.-à-d. : relations affectives ou sexuelles avec d'autres hommes) par l'entourage (plusieurs réponses s'appliquent)			
	À 1 ou 2 parents	68,1%	65,2%
	Aux amis hétérosexuels	65,2%	64,0%
	À la fratrie	61,5%	60,1%
	Aux collègues de travail	52,5%	50,6%
	Au médecin	48,7%	45,5%
Composition du réseau d'amis			
	Majoritairement hétérosexuel	47,5%	49,4%
	Autant hétérosexuel qu'homosexuel	39,5%	41,6%
	Majoritairement homosexuel	9,7%	6,7%
	Sans amis	2,1%	1,1%
	Autres	1,1%	1,1%

Section 2 : Usage général du réseau Internet

Tableau 2.1 Moyens d'accès à Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Moyen d'accès à Internet (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Ordinateur personnel	70,1%	70,8%
	Ordinateur portable	61,2%	64,6%
	Téléphone mobile	49,2%	49,4%
	Tablette	23,0%	15,2%
	Appareil de jeux vidéo	6,1%	7,3%
	Télé numérique	4,3%	2,8%

Autres | 0,7% 0,6%

Tableau 2.2 Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales et sexuelles

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Nombre d'années d'utilisation d'Internet à des fins sociales/sexuelles		
Moins de 6 mois	2,7%	1,1%
6 à 12 mois	3,7%	3,4%
1 à 3 ans	16,8%	18,5%
4 à 6 ans	21,8%	27,0%
7 ans et plus	55,1%	50,0%

Tableau 2.3 Nombre d'heures et fréquence d'utilisation d'Internet selon divers motifs

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Nombre d'heure d'utilisation d'Internet par semaine		
Nombre d'heure (moyenne ± écart-type / médiane)	9,33 ± 11,51 / 5,00	10,65 ± 13,70 / 5,00
Utilisation régulière d'Internet (plusieurs réponses s'appliquent)		
Pour socialiser entre amis	62,8%	66,9%
Pour du contenu pornographique	58,5%	60,1%
Pour des aventures sexuelles	32,2%	38,8%
Pour des raisons affectives	23,1%	25,3%
Pour de l'information sur la communauté gaie	15,1%	11,8%
Pour du cybersexe	14,8%	21,9%
Pour des conseils médicaux ou informations sur la santé	11,6%	13,5%
Pour trouver des travailleurs du sexe ou des clients	2,7%	1,1%

Tableau 2.4 Usage des réseaux sociaux

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Avoir un compte sur les réseaux sociaux		
Oui	89,0%	91,0%
Parmi les répondants rapportant avoir un compte sur les réseaux sociaux	N = 3 240	n = 162
Fréquence des échanges sur ces réseaux sociaux		
Plusieurs fois par jour	48,9%	51,2%
Plusieurs fois par semaine	28,1%	29,6%
Plusieurs fois par mois	9,5%	6,2%
Moins d'une fois par mois ou de manière irrégulière	13,5%	13,0%
Composition du réseau d'amis sur les réseaux sociaux		
Majoritairement hétérosexuel	47,2%	43,8%
Autant hétérosexuel qu'homosexuel	45,2%	51,2%
Majoritairement homosexuel	7,6%	4,9%

Tableau 2.5 Perception d'avoir développé une forme de dépendance sur Internet

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Type de dépendance (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Cybersexe	60,6%	52,2%
	Rencontres en ligne	42,4%	37,6%
	Interactions en ligne	34,0%	32,0%
	Pornographie	30,2%	27,5%

Tableau 2.6 Effet d'Internet sur la vie sociale et sexuelle

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Effet d'Internet sur la vie sociale/sexuelle			
	Positif	15,0%	15,7%
	Plutôt positif	41,7%	42,1%
	Aucun effet	30,3%	28,7%
	Plutôt négatif	11,5%	11,8%
	Négatif	1,5%	1,7%

Section 3 : Rencontres avec partenaires occasionnels

Tableau 3.1 Caractéristiques des relations avec les partenaires occasionnels

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Avoir eu au moins un partenaire occasionnel			
	Oui	87,5%	91,6%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel		N = 3 183	n = 163
Comportements sexuels avec partenaire occasionnel			
	Nombre de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type / médiane)	9,45 ± 18,49 / 5,00	8,39 ± 9,63 / 5,00
	Nombre de relations sexuelles avec les partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	26,40 ± 52,27	28,48 ± 53,21
	Moyenne de relations sexuelles par partenaire (moyenne ± écart-type)	6,94 ± 26,16	7,43 ± 19,98
	Nombre de partenaires occasionnels rencontrés via Internet (moyenne ± écart-type)	6,17 ± 11,87	6,26 ± 8,48
	Proportion moyenne de partenaires occasionnels rencontrés via Internet sur le nombre total de partenaires occasionnels (moyenne ± écart-type)	0,68 ± 0,39	0,68 ± 0,37

Tableau 3.2 Caractéristiques des partenaires occasionnels et sentiments envers ces partenaires

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 163
Âge des partenaires occasionnels		
Âge (moyenne ± écart-type)	37,19 ± 81,20	30,92 ± 10,75
Âge des partenaires occasionnels comparativement à soi		
De votre âge	40,2%	39,6%
Plus jeunes	23,4%	22,6%
Plus âgés	20,3%	18,2%
D'âges variés	16,2%	19,5%
Orientation sexuelle des partenaires occasionnels		
Gais	70,4%	73,0%
Bisexuels	20,1%	18,9%
Hétérosexuels	3,8%	3,1%
Ne sait pas	5,7%	5,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnels		
Oui	21,1%	22,6%
Concomitance de partenaires occasionnels alors qu'en couple		
Oui (relation non-exclusive)	32,8%	26,8%
Non (relation exclusive)	18,9%	21,0%
Non (pas en couple)	48,3%	52,2%

Tableau 3.3 Pratiques et comportements sexuels avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel	N = 3 183	n = 163
Pratiques sexuelles régulières avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Sucer	84,4%	84,9%
Se faire sucer	73,9%	74,8%
S'embrasser	69,0%	76,1%
Masturbation réciproque	67,9%	77,4%
Se masser	32,7%	28,9%
Se faire pénétrer	32,6%	31,4%
Lécher l'anus (reçu ou donné)	31,9%	34,6%
Pénétrer	26,5%	27,0%
Relation anale intentionnellement sans condom	13,0%	14,5%
Sexe en groupe	4,4%	3,1%
Au moins une pratique sexuelle alternative régulière (gang-bang, fist-fucking, urophilie, scatophilie, BDSM)	32,6%	30,8%
Bondage, domination, soumission, sadomasochisme (pratiques BDSM)	3,8%	4,4%
Gang-bang (comme bottom)	2,4%	4,4%
Fist-fucking	1,3%	0,0%
Urophilie	1,6%	1,3%
Scatophilie	0,3%	0,0%

Comportements sexuels vécus régulièrement avec partenaires occasionnels (plusieurs réponses s'appliquent)		
Condom pour fellation	6,7%	1,9%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant	24,0%	27,0%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire	24,4%	31,4%

Tableau 3.4 Relation anale sans condom avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins un partenaire occasionnel</i>	N = 3 183	n = 163
Relation anale avec partenaires occasionnels		
Oui	71,7%	71,7%
Relation anale sans condom avec partenaires occasionnels		
Au moins une fois	57,5%	67,5%
Régulièrement	16,6%	26,3%

Tableau 3.5 Statut sérologique des partenaires occasionnels chez les répondants ayant pratiqué la relation anale sans condom

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué la relation anale sans condom avec un partenaire occasionnel au moins une fois</i>	N = 1 287	n = 77
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique positif		
Oui	12,6%	7,8%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique inconnu		
Oui	43,2%	33,8%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires occasionnels de statut sérologique négatif		
Oui	58,0%	51,9%

Tableau 3.6 Partenaires occasionnelles féminines

	Total	Région
Statut sérologique	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Avoir eu au moins une partenaire occasionnelle féminine		
Oui	11,7%	13,5%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une partenaire occasionnelle</i>	N = 424	n = 24
Nombre de partenaires occasionnelles féminines		
Nombre moyen (moyenne ± écart-type / médiane)	0,39 ± 3,16 / 0,00	0,22 ± 0,70 / 0,00

Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires occasionnelles féminines			
	Oui	29,8%	25,0%
Relation sexuelle vaginale ou anale non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Au moins une	56,3%	54,2%
	Régulièrement	37,0%	50,9%

Tableau 3.7 Relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine

		Total	Région
	Statut sérologique	N = 3 669	n = 178
	Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
	<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu au moins une relation sexuelle non-protégée avec une partenaire occasionnelle féminine</i>	N = 238	n = 13
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique positif			
	Oui	1,7%	0,0%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique négatif			
	Oui	51,3%	46,2%
Avoir eu une relation sexuelle non protégée avec des partenaires occasionnels féminines de statut sérologique inconnu			
	Oui	17,2%	15,4%

Section 4 : Relations stables ou de couple

Tableau 4.1 Situation relationnelle

		Total	Région
	Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
	Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Relation de couple avec un homme (développée ou maintenue)			
	Oui	51,7%	51,4%
	<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 91
Âge du dernier partenaire de couple			
	Âge (moyenne ± écart-type)	35,26 ± 14,08	32,37 ± 14,61
Lieu de rencontre du dernier partenaire de couple			
	Sur Internet	58,4%	44,0%
Durée de la dernière relation de couple			
	Plus d'un an	62,2%	62,6%
	Plusieurs mois	27,8%	27,5%
	Plusieurs semaines	10,0%	9,9%
Situation actuelle			
	Encore en relation de couple au moment de l'enquête	73,4%	75,8%

Tableau 4.2 Dépistage du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 91
Partenaire de couple dépisté pour le VIH		
Oui	63,0%	67,0%
Non	18,7%	22,0%
Ne sait pas	18,4%	11,0%

Tableau 4.3 Statut sérologique du partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple ayant été dépisté pour le VIH</i>	N = 1 183	n = 61
Statut sérologique du partenaire de couple (suite au dépistage du VIH)		
Séronégatif	89,5%	88,5%
Plus certain qu'il est séronégatif	0,3%	0,0%
Séropositif	6,6%	1,6%
Ne sait pas	3,6%	9,8%
<i>Parmi les répondants rapportant un partenaire de couple n'ayant pas été dépisté pour le VIH ou ne sachant pas</i>	N = 701	n = 30
Statut sérologique du partenaire de couple (préssumé par le répondant)		
Séronégatif	66,5%	60,0%
Plus certain qu'il est séronégatif	2,4%	3,3%
Séropositif	0,6%	0,0%
Ne sait pas	30,5%	36,7%

Tableau 4.4 Relation anale avec le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme</i>	N = 1 882	n = 91
Relation anale avec le partenaire de couple		
Oui	73,8%	82,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale avec un partenaire de couple</i>	N = 1 387	n = 75
Relation anale sans condom avec le partenaire de couple		
Au moins une fois	78,6%	77,6%
Régulièrement	58,2%	63,2%

Tableau 4.5 Partenaires occasionnels chez le partenaire de couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant au moins une relation de couple avec un homme	N = 1 882	n = 91
Partenaire de couple a eu d'autres partenaires sexuels		
Oui	32,6%	40,0%
Non	45,8%	40,0%
Ne sait pas	21,6%	20,0%

Section 5 : Relations anales intentionnellement sans condom

Tableau 5.1 Relations anales intentionnellement sans condom et type de partenaire

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom (barebacking dans le questionnaire)		
Non	66,3%	65,5%
Oui	33,7%	34,5%
Type de partenaire chez ceux qui rapportent avoir eu une relation anale intentionnellement sans condom, calculé sur l'échantillon total		
Dans le cadre d'un couple uniquement	9,6%	7,9%
Avec des partenaires occasionnels masculins uniquement	12,0%	11,8%
Dans le cadre d'un couple et avec des partenaires occasionnels masculins	12,1%	14,6%

Tableau 5.2 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement dans le cadre d'un couple	N = 350	n = 14
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	73,0%	71,4%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,3%	64,3%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	57,6%	57,1%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	59,3%	58,3%

Tableau 5.3 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues uniquement avec les partenaires occasionnels</i>	N = 436	n = 21
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	85,9%	94,7%
Séroinconnu	67,7%	80,0%
Sérodivergent	24,9%	17,6%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	36,7%	23,5%
Comportements sexuels survenus au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	57,3%	72,2%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	59,5%	47,4%
Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	61,6%	73,7%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,4%	55,6%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	93,9%	85,7%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	54,0%	47,4%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	39,3%	42,1%
En association avec la consommation de substances	32,0%	36,8%
À plusieurs dans un contexte privé	31,8%	60,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,5%	21,1%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	16,3%	30,0%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	7,6%	15,8%

Tableau 5.4 Caractéristiques des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant des relations anales intentionnellement sans condom survenues dans le cadre d'un couple et avec les partenaires occasionnels</i>	N = 442	n = 26
Statut sérologique des partenaires occasionnels avec qui il y a eu des relations anales intentionnellement sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Séroconvergent	92,4%	92,3%
Séroinconnu	58,1%	56,0%
Sérodivergent	27,1%	34,8%
Partenaire dont on n'a pas voulu connaître le statut	31,8%	42,8%
Comportements sexuels survenus régulièrement (plusieurs réponses s'appliquent)		
Éjaculation du répondant dans le partenaire (sans se retirer)	76,7%	73,9%
Éjaculation du partenaire dans le répondant (sans se retirer)	77,2%	73,1%

Retrait du répondant pour ne pas éjaculer dans le partenaire	66,8%	73,9%
Retrait du partenaire pour ne pas éjaculer dans le répondant	68,6%	80,8%
Contextes de pratique au moins une fois (plusieurs réponses s'appliquent)		
À deux dans un contexte privé	98,6%	100,0%
À partir de sites non spécialisés dans la pratique	42,1%	43,5%
Dans des établissements favorisant le recrutement de partenaires (ex. : saunas)	32,6%	39,1%
En association avec la consommation de substances	33,3%	40,0%
À plusieurs dans un contexte privé	36,8%	64,0%
À partir de sites spécialisés dans la pratique	24,4%	66,7%
Lors d'un « gang bang » où le répondant était le passif	21,6%	33,3%
Lors de relations dans le cadre du travail du sexe	10,9%	??

Section 6 : Espaces de rencontre et styles de vie associés

Tableau 6.1 Espaces de rencontres des partenaires

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Lieux ou établissements « gais »			
	Régulièrement	14,7%	11,2%
	Occasionnellement	41,4%	36,5%
	Jamais	43,9%	52,2%
Lieux ou établissements « mixtes »			
	Régulièrement	7,8%	7,9%
	Occasionnellement	29,0%	32,6%
	Jamais	63,2%	59,6%
Lieux ou établissements « hétéros »			
	Régulièrement	10,0%	19,1%
	Occasionnellement	26,2%	30,3%
	Jamais	63,8%	50,6%
Sites de rencontre sur Internet			
	Régulièrement	53,1%	53,9%
	Occasionnellement	32,7%	34,8%
	Jamais	14,3%	11,2%
Discothèques, bars ou cafés			
	Régulièrement	16,0%	19,7%
	Occasionnellement	39,3%	39,3%
	Jamais	44,8%	41,0%
Lieux extérieurs (parcs, toilettes, plages, etc.)			
	Régulièrement	6,6%	7,9%
	Occasionnellement	25,9%	27,0%
	Jamais	67,5%	65,2%
Saunas			
	Régulièrement	8,0%	6,7%
	Occasionnellement	24,0%	18,0%
	Jamais	68,0%	75,3%
Associations culturelles ou de loisir			
	Régulièrement	5,6%	4,5%
	Occasionnellement	20,5%	23,6%
	Jamais	73,8%	71,9%
Peep show / sex shop			
	Régulièrement	2,2%	2,2%

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Sex club / backroom	Occasionnellement	11,0%	12,9%
	Jamais	86,8%	84,8%
Clubs échangistes	Régulièrement	2,9%	3,4%
	Occasionnellement	8,3%	5,6%
	Jamais	88,8%	91,0%
Fréquentation au moins une fois d'un regroupement de lieux (variables recodées)	Régulièrement	1,5%	2,8%
	Occasionnellement	2,4%	2,2%
	Jamais	96,2%	94,9%
Fréquentation de lieux de sexualité sur place (sex club, saunas ou lieux extérieurs)		47,7%	42,1%
Fréquentation de lieux de socialisation (bars/discothèques ou association de loisirs)		58,4%	62,4%

Tableau 6.2 Applications et sites de rencontre gais géolocalisants

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Utilisation d'applications ou sites de rencontre gais géolocalisants			
	Oui	35,2%	35,4%
Parmi les répondants rapportant utiliser une application ou un site de rencontre gai géolocalisant		N = 1 283	n = 63
Dévoilement de l'identité sur ces réseaux			
	Oui, en mettant une photo du visage	77,2%	77,8%
	Partiellement, sans mettre de photo ou en refusant d'être localisé	15,5%	11,1%
	Ne souhaite pas être identifié	7,3%	11,1%

Section 7 : Consommation d'alcool et de drogues au cours des 12 derniers mois

Tableau 7.1 Prévalence de la consommation d'alcool et de drogues

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Consommation de 5 verres d'alcool ou plus lors d'une même occasion			
	Jamais	30,9%	28,1%
	Moins d'une fois par mois	26,2%	25,8%
	Une fois par mois	17,3%	14,0%
	Une fois par semaine	15,7%	21,3%
	Plusieurs fois par semaine	8,4%	8,4%
	Tous les jours ou presque	1,4%	2,2%
Cannabis			
	Jamais	63,6%	62,9%
	1 à 2 fois	12,2%	14,0%

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
3 à 9 fois	8,0%	7,9%
10 fois et plus	16,2%	15,2%
Poppers		
Jamais	75,2%	73,0%
1 à 2 fois	9,9%	11,2%
3 à 9 fois	6,2%	6,2%
10 fois et plus	8,6%	9,6%
Viagras / Cialis		
Jamais	80,0%	80,9%
1 à 2 fois	7,5%	4,5%
3 à 9 fois	6,2%	8,4%
10 fois et plus	6,3%	6,2%
Amphétamines		
Jamais	90,1%	86,0%
1 à 2 fois	4,8%	8,4%
3 à 9 fois	2,6%	3,4%
10 fois et plus	2,6%	2,2%
Ecstasy		
Jamais	90,4%	88,8%
1 à 2 fois	5,9%	9,6%
3 à 9 fois	2,3%	1,1%
10 fois et plus	1,4%	0,6%
Cocaïne		
Jamais	91,7%	92,1%
1 à 2 fois	4,3%	6,2%
3 à 9 fois	2,2%	1,1%
10 fois et plus	1,9%	0,6%
Produit pharmacologique (dilaudil, rivotril, ritalin, etc.)		
Jamais	94,6%	95,5%
1 à 2 fois	1,6%	1,1%
3 à 9 fois	0,8%	0,0%
10 fois et plus	3,0%	3,4%
MDMA		
Jamais	94,7%	97,8%
1 à 2 fois	3,5%	1,7%
3 à 9 fois	1,1%	0,0%
10 fois et plus	0,6%	0,6%
GHB		
Jamais	95,2%	97,2%
1 à 2 fois	2,7%	1,7%
3 à 9 fois	1,2%	0,6%
10 fois et plus	0,9%	0,6%
Kétamine		
Jamais	97,5%	98,9%
1 à 2 fois	1,4%	0,0%
3 à 9 fois	0,6%	0,6%
10 fois et plus	0,5%	0,6%
Crystal Meth		
Jamais	97,9%	98,3%
1 à 2 fois	1,0%	0,6%
3 à 9 fois	0,5%	0,6%
10 fois et plus	0,5%	0,6%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Crack			
Jamais		98,6%	98,3%
1 à 2 fois		0,9%	1,1%
3 à 9 fois		0,2%	0,0%
10 fois et plus		0,4%	0,6%
Héroïne			
Jamais		99,6%	98,9%
1 à 2 fois		0,1%	0,0%
3 à 9 fois		0,1%	0,6%
10 fois et plus		0,2%	0,6%

Tableau 7.2 Contexte d'usage d'alcool et de drogues

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Consommation de 5 verres d'alcool et plus ou d'au moins une drogue au cours des 12 derniers mois		
Oui	58,7%	57,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool) - variable ajoutée en cours de collecte de données</i>		
	N = 657	n = 30
Injection d'une substance au cours des 12 derniers mois		
Oui	2,5%	3,3%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir consommé au moins une fois une substance (drogue ou alcool)</i>		
	N = 2 988	n = 103
Contextes d'usage d'alcool et de drogues (plusieurs réponses s'appliquent)		
À la maison ou en privé	63,5%	56,6%
Dans des soirées / établissements	24,0%	27,3%
Pour améliorer performances ou sensations sexuelles	15,2%	14,7%
Consommation avec sentiment de dépendance	4,5%	7,7%
Plusieurs produits simultanément	4,3%	4,9%
Lors de relations sexuelles pratiquées dans le cadre du travail du sexe	1,9%	0,7%

Section 8 : Travail du sexe

Tableau 8.1 Portrait des échanges lors des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon	N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe		
Au moins une fois	9,0%	8,4%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir participé à des relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>		
	N = 327	n = 15
Type de compensation proposée ou reçue en échange d'une relation sexuelle		

Contre de l'argent	83,5%	80,0%
Contre des services	15,0%	20,0%
Contre des cadeaux	13,8%	6,7%
Contre de la drogue	8,3%	6,7%
Contre de l'argent pour de la drogue	5,2%	0,0%
Mode de compensation dans le cadre du travail du sexe		
Compensation reçue	37,9%	46,7%
Compensation proposée	49,2%	33,3%
Autres configurations	12,8%	20,0%
<i>Parmi les répondants rapportant du travail du sexe</i>	N = 124	n = 7
Activité représentant une large part du revenu		
Oui	14,8%	14,3%
Non	76,6%	85,7%
Souhaite ne pas répondre	8,6%	0,0%

8.2 Répondants travailleurs du sexe

Tableau 8.2.1 Caractéristiques des partenaires des travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 7
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	6,91 ± 13,07	2,43 ± 1,27
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	40,51 ± 12,30	36,00 ± 11,02
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	4,0%	14,3%
Environ du même âge	14,5%	14,3%
Plus âgés	69,4%	71,4%
D'âges variés	12,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	46,8%	42,95
Bisexuels	28,2%	57,1%
Hétérosexuels	9,7%	0,0%
Ne sait pas	15,3%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	4,8%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	66,9%	85,7%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,2%	57,1%
À partir de réseaux sociaux	25,8%	28,6%
Par des sites spécialisés	13,7%	0,0%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	17,7%	14,3%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	12,1%	14,3%

Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,7%	14,3%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,8%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	3,2%	0,0%

Tableau 8.2.2 Pratiques sexuelles rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir reçu une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 7
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	8,9%	14,3%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	30,1%	28,6%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	21,1%	42,9%
Relation anale	73,2%	85,7%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 90	n = 6
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	52,2%	50,0%
Régulièrement	30,0%	50,0%
Consentie sans conditions	51,0%	33,3%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	42,9%	33,3%
Imposée sans consentement	14,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	10,2%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	43,3%	66,7%
Non	52,2%	33,3%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	4,4%	0,0%

Tableau 8.2.3 Relations anales sans condom rapportées par les travailleurs du sexe dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe ...</i>	N = 79	n = 3
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,7%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	21,1%	16,7%

Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	27,8%	16,7%

8.3 Répondants clients

Tableau 8.3.1 Caractéristiques des répondants clients et de leurs partenaires travailleurs du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe	N = 161	n = 2
Caractéristiques des partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe		
Nombre de partenaires sexuels dans le cadre du travail du sexe (moyenne ± écart-type)	3,98 ± 4,82	4,67 ± 2,73
Âge approximatif des partenaires (moyenne ± écart-type)	29,17 ± 8,58	29,25 ± 9,88
Âge des partenaires dans le cadre du travail du sexe comparativement à soi		
Plus jeunes	75,9%	57,1%
Environ du même âge	15,4%	42,9%
Plus âgés	5,6%	0,0%
D'âges variés	3,1%	0,0%
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Gais	58,4%	28,6%
Bisexuels	24,8%	71,4%
Hétérosexuels	5,6%	0,0%
Ne sait pas	11,2%	0,0%
Développer régulièrement des sentiments envers les partenaires dans le cadre du travail du sexe		
Oui	10,4%	0,0%
Modes de recrutement des partenaires (plusieurs réponses s'appliquent)		
Par des sites de rencontre gais ou mixtes	51,9%	71,4%
Par Internet sur des sites de petites annonces généralistes (ex: <i>Craigslist</i>)	45,7%	28,6%
À partir de réseaux sociaux	13,6%	14,3%
Par des sites spécialisés	12,3%	14,3%
Dans des saunas, <i>sex club</i>	11,7%	0,0%
Dans des bars, clubs ou discothèques non spécialisés	9,9%	14,3%
Dans des espaces ou de lieux de rencontre publics (rue, toilettes, parcs, etc.)	9,9%	42,9%
Dans des salles de cinéma X ou de <i>peep shows</i>	4,3%	0,0%
Dans des clubs échangistes ou bars spécialisés	1,9%	0,0%

Tableau 8.3.2 Pratiques sexuelles des clients

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir offert une compensation lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 161	n = 5
Comportements sexuels dans le cadre du travail du sexe (plusieurs réponses s'appliquent)		
Utilisation du condom pour fellation (régulièrement)	9,9%	0,0%
Éjaculation du partenaire dans la bouche du répondant (régulièrement)	17,9%	57,1%
Éjaculation du répondant dans la bouche du partenaire (régulièrement)	15,4%	57,1%
Relation anale	49,7%	60,0%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir eu une relation anale lors de relations sexuelles dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 3
Fréquence et contexte des relations anales sans condom (plusieurs réponses s'appliquent)		
Au moins une fois	50,0%	100,0%
Régulièrement	25,6%	50,0%
Consentie sans conditions	59,6%	66,7%
Consentie dans un accord particulier ou tarifaire	17,0%	33,3%
Imposée sans consentement	4,3%	0,0%
Imposée dans un accord particulier ou tarifaire	2,1%	0,0%
Pratiques sexuelles différentes entre partenaires dans le cadre du travail du sexe et autres partenaires occasionnels		
Oui	27,8%	33,3%
Non	69,6%	66,7%
Pas de relations sexuelles avec des hommes hors d'un cadre professionnel	2,5%	0,0%

Tableau 8.3.3 Relation anale sans condom dans le cadre du travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant avoir pratiqué au moins une relation anale sans condom avec un partenaire dans le cadre du travail du sexe</i>	N = 79	n = 3
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique positif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	6,3%	0,0%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique inconnu dans le cadre du travail du sexe		
Oui	24,1%	33,3%
Avoir eu une relation anale sans condom avec des partenaires de statut sérologique négatif dans le cadre du travail du sexe		
Oui	22,8%	66,7%

Section 9 : Santé sexuelle

Tableau 9.1a. Dépistage du VIH

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Dépistage VIH			
	Oui, dans les 12 derniers mois	41,7%	43,3%
	Oui, il y a plus d'un an	28,7%	23,0%
	Non, jamais	29,7%	33,7%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage VIH		N = 2 554	n = 118
Résultat du dernier test VIH			
	Séronégatif et pense encore l'être	84,9%	86,4%
	Séronégatif, mais incertain de toujours l'être	4,9%	7,6%
	Séropositif	7,0%	2,5%
	En attente des résultats	2,0%	1,7%
	N'a pas souhaité connaître le résultat	1,3%	1,7%
Parmi les répondants rapportant n'avoir jamais fait un test de dépistage VIH		N = 1 079	n = 60
Au regard du VIH, actuellement (plusieurs réponses s'appliquent)			
	Pense être séronégatif	79,1%	78,3%
	N'est plus certain d'être séronégatif	5,9%	1,7%
	Pense être séropositif	2,5%	1,7%
	Ne veut pas savoir	15,8%	20,0%

Tableau 9.1b. Recours à la Prophylaxie Post-Exposition (PPE)

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Recours au traitement post-exposition (TPE) ou à la prophylaxie post-exposition (PPE) au cours des 12 derniers mois			
	Oui	1,3%	0,0%

Tableau 9.2 Discussion à l'égard du statut sérologique

		Total	Région
Région socio-sanitaire		N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon		100%	4,9%
Discuter du statut avec les partenaires stables			
	Jamais	22,2%	21,3%
	Parfois	17,9%	21,3%
	Toujours	38,7%	32,6%
	Non concerné	21,2%	24,7%
Discuter du statut avec les partenaires occasionnels			
	Jamais	24,9%	27,0%
	Parfois	25,4%	27,5%
	Toujours	28,8%	22,5%
	Non concerné	20,9%	23,0%

Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Discuter du statut avec les amis ou la famille			
	Jamais	45,2%	45,5%
	Parfois	20,2%	16,9%
	Toujours	12,4%	10,7%
	Non concerné	22,2%	27,0%

Tableau 9.3 Virus de l'hépatite C (VHC)

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Dépistage du VHC			
	Oui, dans les 12 derniers mois	31,1%	33,7%
	Oui, il y a plus d'un an	26,6%	22,5%
	Non, jamais	30,8%	30,9%
	Ne sait pas	11,6%	12,9%
Parmi les répondants rapportant avoir fait un test de dépistage du VHC		N = 2 102	n = 101
Statut VHC			
	Séropositif	4,2%	3,0%
	N'est plus certain d'être séronégatif	1,1%	3,0%
	Séronégatif	90,4%	84,2%
	Ne sait pas	4,2%	9,9%

Tableau 9.4 Autres ITSS au cours des 12 derniers mois

		Total	Région
Région socio-sanitaire Proportion de l'échantillon		N = 3 669 100%	n = 178 4,9%
Au moins une ITSS au cours des 12 derniers mois			
	Oui	14,5%	12,9%
Infections transmissibles sexuellement contractées (plusieurs réponses possibles)			
	Condylomes (VPH)	4,8%	6,7%
	Gonococcie, blennorragie, chaude pisse	4,3%	2,8%
	Chlamydia	4,2%	5,1%
	Syphilis	3,0%	1,1%
	Herpès génital	2,8%	0,6%
	Gonococcie rectale	1,0%	1,1%
	Hépatite B	1,0%	0,6%
	Hépatite A	0,9%	0,6%
	LGV	0,4%	0,6%

Section 10 : Santé mentale

Tableau 10.1 Apparence physique

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Satisfaction globale à l'égard de son apparence physique		
Oui	70,4%	73,0%
Importance accordée à l'aspect physique des partenaires		
Oui	82,3%	80,9%
Croyances du répondant quant à l'importance de son apparence physique pour les autres		
Pas du tout importante	5,1%	3,9%
Assez importante	53,4%	52,8%
Très importante	32,4%	29,2%
Extrêmement importante	9,1%	14,0%

Tableau 10.2 Santé psychologique et estime de soi

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Santé psychologique : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je me suis senti seul	40,8%	41,0%
Je me suis senti déprimé	35,5%	33,1%
J'ai eu des idées suicidaires	12,7%	12,9%
Estime de soi : « En accord » avec les énoncés suivants		
Je suis aussi valable que les autres	88,9%	85,4%
Je peux faire aussi bien que les autres	86,2%	82,6%
J'aime faire face à des défis	73,9%	75,3%
Dans l'ensemble je suis satisfait de moi-même	72,7%	71,9%
Je recherche les sensations fortes	40,7%	46,6%
Je prends des risques dans la vie	34,8%	32,0%

Section 11 : Discriminations

Tableau 11.1 Objets de la discrimination vécue

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Discriminations vécues quant à... (plusieurs réponses s'appliquent)		
Orientation sexuelle	21,9%	32,2%
Injures en raison de l'orientation sexuelle	17,4%	19,1%
Agression en raison de l'orientation sexuelle	2,1%	2,2%
Surpoids	17,4%	14,1%
Manières	10,6%	10,7%
VIH+	3,5%	1,7%
Origine ethnoculturelle	3,4%	0,6%
Identité de genre	2,1%	2,3%

Travail du sexe | 1,5% 1,1%

Tableau 11.2 Sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'orientation sexuelle</i>	N = 789	n = 57
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	26,4%	38,6%
Au travail	27,5%	21,1%
Dans le milieu gai	9,5%	24,6%
Sur Internet	25,5%	33,3%
Ailleurs ou en général	50,4%	49,1%

Tableau 11.3 Sentiment de discrimination lié au surpoids

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au surpoids</i>	N = 627	n = 25
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,1%	24,0%
Au travail	13,4%	24,0%
Dans le milieu gai	55,0%	44,0%
Sur Internet	50,9%	52,0%
Ailleurs ou en général	34,8%	40,0%

Tableau 11.4 Sentiment de discrimination lié aux manières

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié aux manières</i>	N = 381	n = 19
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	30,2%	47,4%
Au travail	24,7%	26,3%
Dans le milieu gai	23,4%	31,6%
Sur Internet	24,1%	36,8%
Ailleurs ou en général	47,8%	47,4%

Tableau 11.5 Sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'ethnicité ou à la culture</i>	N = 121	n = 1
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	12,4%	0,0%
Au travail	31,4%	0,0%
Dans le milieu gai	28,9%	0,0%
Sur Internet	33,9%	100,0%
Ailleurs ou en général	46,3%	0,0%

Tableau 11.6 Sentiment de discrimination lié à l'identité de genre

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié à l'identité de genre</i>	N = 76	n = 4
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	13,2%	0,0%
Au travail	22,4%	0,0%
Dans le milieu gai	17,1%	25,0%
Sur Internet	35,5%	75,0%
Ailleurs ou en général	40,8%	0,0%

Tableau 11.7 Sentiment de discrimination lié au VIH

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
<i>Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au VIH</i>	N = 126	n = 3
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	12,7%	0,0%
Dans le milieu gai	45,2%	66,7%
Sur Internet	46,0%	33,3%
Ailleurs ou en général	43,7%	33,3%

Tableau 11.8 Sentiment de discrimination lié au travail du sexe

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Parmi les répondants rapportant un sentiment de discrimination lié au travail du sexe	N = 54	n = 2
Contexte où est survenue la discrimination (plusieurs réponses s'appliquent)		
À l'école	5,6%	0,0%
Au travail	14,8%	0,0%
Dans le milieu gai	27,8%	0,0%
Sur Internet	40,7%	100,0%
Ailleurs ou en général	40,7%	0,0%

Section 12 : Préoccupations

Tableau 12.1 Préoccupations liées aux relations interpersonnelles et sociales

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Objets des préoccupations en lien avec les relations interpersonnelles et sociales (plusieurs réponses s'appliquent)		
Recherche de partenaires stables	31,0%	45,5%
Relations de couple	27,2%	39,2%
Rupture d'une relation	22,1%	28,4%
Relations familiales	21,4%	35,8%
Recherche d'amis	18,0%	28,4 %
Violence dans le couple	3,0%	8,5%

Tableau 12.2 Préoccupations liées à la santé physique et mentale

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé physique et mentale (plusieurs réponses s'appliquent)		
Anxiété	26,6%	36,9%
Dépression	20,0%	27,8%
Troubles de l'alimentation	18,5%	20,5%
VIH	5,2%	4,5%
Hépatite C	1,6%	0,6%

Tableau 12.3 Préoccupations liées au bien-être psychosocial

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Objets des préoccupations en lien avec le bien-être psychosocial (plusieurs réponses s'appliquent)		
Image corporelle	29,0%	46,0%
Solitude / isolement	22,7%	33,9%
<i>Coming out</i>	11,9%	18,4%
Acceptation de l'orientation sexuelle	11,3%	21,3%
Idées / tentatives suicidaires	8,3%	17,8%
Acceptation de l'identité de genre	4,1%	10,3%
Acceptation du travail du sexe	0,8%	3,4%

Tableau 12.4 Préoccupations liées aux habitudes de vie

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Objets des préoccupations en lien avec les habitudes de vie (plusieurs réponses s'appliquent)		
Dépendance à Internet	21,3%	42,0%
Dépendance aux images érotiques	18,4%	34,5%
Sexualité compulsive	16,0%	31,0%
Tabagisme	15,4%	19,0%
Consommation d'alcool	7,8%	21,8%
Consommation de drogues	5,1%	14,4%
Jeu compulsif	1,3%	2,3%

Tableau 12.5 Préoccupations liées à la santé sexuelle

	Total	Région
Région socio-sanitaire	N = 3 669	n = 178
Proportion de l'échantillon	100%	4,9%
Objets des préoccupations en lien avec la santé sexuelle (plusieurs réponses s'appliquent)		
Comportements sexuels à risque	19,7%	31,0%
Prévention VIH	19,5%	26,4%
Dépistage VIH	19,1%	27,6%
Dépistages des autres ITSS	18,4%	26,4%
Traitement des ITSS	11,8%	20,1%