



HAL
open science

Portrait des participant×e×s âgé×e×s de plus de 60 ans selon leur statut sérologique au VIH

Alain Al Léobon, Eugénie Samson-Daoust

► **To cite this version:**

Alain Al Léobon, Eugénie Samson-Daoust. Portrait des participant×e×s âgé×e×s de plus de 60 ans selon leur statut sérologique au VIH. 2022. halshs-03929482

HAL Id: halshs-03929482

<https://shs.hal.science/halshs-03929482v1>

Preprint submitted on 8 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



PORTRAIT DES PARTICIPANT·E·S·ÂGE·E·S
DE PLUS DE 60 ANS SELON
LEUR STATUT SÉROLOGIQUE AU VIH

Auteurs : Alain Léobon (CNRS) – Eugénie Samson Daoust (UDM)
CNRS URM ESPACES ET SOCIÉTÉS DU CNRS

PORTRAIT CONTRASTE ISSU DES DONNÉES DU NET GAY BAROMÈTRE 2018 DES PARTICIPANT·E·S ÂGE·E·S DE PLUS DE 60 ANS SELON LEUR STATUT SÉROLOGIQUE AU VIH

Méthodologie

Parmi les répondant·e·s au NGB2018 français, nous cherchons à identifier les différences statistiquement significatives entre des personnes de 60 ans et plus vivant avec le VIH (senior·e·s PVVIH) et des senior·e·s séronégatif·ve·s au VIH au moment de leur complétion de l'étude. Ces résultats préliminaires se basent sur des Chi2 et des analyses de variance.

Sociodémographie, partenaires et sexualité

Par rapport aux senior·e·s séronégatif·ve·s, les senior·e·s PVVIH rapportent une orientation majoritairement homosexuelle (92,6% vs. 66,6%), un plus grand sentiment d'appartenance à la communauté LGBTQI (52,8% vs. 38,9%), plus de partenaires occasionnels masculins dans les 12 derniers mois (en moyenne 26 vs. 13), moins de partenaires occasionnelles féminines (en moyenne moins d'une vs. 3), plus d'activité sur les applications de rencontre (49,4% vs. 33,7%), au moins une pratique sexuelle marginale parfois à toujours (89,6% vs. 67,1%), plus de pénétrations anales non protégées (PANP) parfois à toujours avec leurs partenaires occasionnels masculins (75,0% vs. 32,6%), ainsi qu'une plus forte adhésion à la culture de sexe bareback (84,6% vs. 67,7%). Ils rapportent 100% de séroconvergence avec leurs partenaires occasionnels masculins et ont tous·tes pratiquement une charge virale indétectable (97,2%), alors que leurs partenaires de couple sont, eux aussi, plus souvent séropositifs (40,3% vs. 9,0%).

Consommation de substances.

Les senior·e·s PVVIH rapportent plus souvent la consommation de substances psychoactives que les senior·e·s séronégatif·ve·s dans les 12 derniers mois (29,5% vs. 11,3%), plus de polyconsommation de substances (47,2% vs. 28,0%) dont, particulièrement, au moins une fois le poppers (86,8% vs. 63,1%), les cathinones (37,7% vs. 9,7%), le crystal meth (17,0% vs. 3,9%) et le GHB/GBL (34,0% vs. 14,6%), et, conséquemment, il·elle·s pratiquent plus souvent le chemsex (18,8% vs. 3,7%) et, dans ce cadre, l'injection de ces substances (4,5% vs. 0,6%).

Santé sexuelle.

Sur le plan de leur santé sexuelle, il·elle·s déclarent plus souvent avoir contracté une hépatite C (24,2% vs. 9,6% parmi les testé·e·s) et des IST (42,0% vs. 20,6% au moins une), ayant une meilleure connaissance (en moyenne 7 vs. 6), mais une moins grande application des stratégies de réduction des risques VIH (fréquence moyenne de 6 vs. 7,5).

Santé mentale et discrimination.

Sous l'angle psychosocial, il·elle·s déclarent plus souvent avoir un sentiment de solitude (35,4% vs. 25,6%), plus de recherche de sensations fortes (58,9%) et de prise de risques dans la vie en général (39,4% vs. 30,3%) et plus d'importance accordée à la sexualité (60,3% vs. 48,6% la disent indispensable). Au regard des discriminations ressenties, il·elle·s rapportent plus souvent avoir ressenti de la sérophobie dans les 12 derniers mois (22,9% vs. 1,1%), et moins de discrimination par rapport à un surpoids (12,0% vs. 20,4%).

Préoccupations en santé.

Leurs préoccupations en santé concernent notamment : le VIH (17,7% vs. 2,3%) et les IST (21,7% vs. 13,1%). Il·elle·s présentent plus de préoccupations par rapport à l'anxiété (19,4% vs. 12,6%), la dépression (17,7% vs. 9,4%), la solitude (24,6% vs. 16,0%). Leurs préoccupations concernent plus souvent leur image corporelle (24,0% vs. 17,3%), leur consommation de drogue (4,0% vs. 0,4%), mais il·elle·s sont moins souvent préoccupé·e·s par l'acceptation de l'orientation sexuelle (1,1% vs. 6,8%).

Discussion – limites

Ces résultats contrastent sur un certain nombre de variables que nous avons dégagées dans d'autres analyses et qui semblent communes aux PVVIH, tout âge confondu. Nous devons donc appliquer un modèle de régression multivariée par la suite, ou bien effectuer une autre analyse contrastant, entre eux, les répondant·e·s PVVIH à savoir les senior·e·s aux plus jeunes.

Le document proposé page suivantes contraste les répondant·e·s senior·e·s, toute sérologie au VIH confondue, aux plus jeunes participant·e·s à l'enquête.

PORTRAIT BRUT XLS (AVEC DES CHI-CARRÉS ET DES ANOVAS)
COMPARANT LES REpondants ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS À LEURS
CADETS

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Âge moyen	35,74 (12,48)	65,51 (4,86)	38,47 (14,74)	
Site de provenance				
Facebook	61,9%	31,3%	59,1%	< 0,001
Sites de rencontre HSH généralistes	21,5%	26,9%	22,0%	
Site de rencontre BDSM	12,7%	38,3%	15,0%	
Site de rencontre bareback	4,0%	3,5%	4,0%	
Pays de résidence				
En France	98,1%	96,7%	97,9%	< 0,001
Dans un pays limitrophe (Espagne, Belgique, Suisse)	1,3%	3,0%	1,5%	
À l'étranger	0,6%	0,3%	0,6%	
Type de région de résidence	N = 9616	N = 955	N = 10571	
Rurale	7,5%	9,9%	7,7%	0,007
Urbaine	92,5%	90,1%	92,3%	
Lieu de résidence	N = 9806	N = 988	N = 10794	
Région parisienne	26,0%	24,0%	25,8%	0,176
Autre	74,0%	76,0%	74,2%	
Identité de genre	N = 9703	N = 975	N = 10678	
Homme cis	95,8%	96,9%	95,9%	0,001
Homme trans	1,4%	0,0%	1,3%	
Femme trans	0,6%	1,0%	0,6%	
Non binaire	2,2%	2,1%	2,2%	
Appartenance à une religion				
N'appartient à aucune religion	65,4%	41,9%	63,2%	< 0,001
Appartient à une religion	34,6%	58,1%	36,8%	
Importance accordée à sa religion	N = 3497	N = 581	N = 4078	
Accorde peu ou pas d'importance	71,3%	66,1%	70,6%	0,010
Accorde de l'importance	28,7%	33,9%	29,4%	
Pays de naissance	N = 9829	N = 989	N = 10818	
Né en France de parents nés en France	86,4%	87,4%	86,5%	< 0,001
Né en France de parents nés à l'étranger (au moins un des deux)	7,2%	2,6%	6,8%	
Né à l'étranger	6,3%	10,0%	6,7%	
Identifié par les autres comme une minorité visible	N = 9781	N = 987	N = 10768	
Oui	8,9%	2,5%	8,4%	< 0,001
Non	91,1%	97,5%	91,6%	
Niveau d'études validé	N = 9829	N = 990	N = 10819	
Bac ou inférieur	33,4%	39,7%	33,9%	< 0,001
Études supérieures	66,6%	60,3%	66,1%	
Revenu mensuel net	N = 9826	N = 989	N = 10815	
Faibles revenus (moins de 1000 €)	27,5%	7,4%	25,7%	< 0,001
Revenus moyens (1000 à 1599 €)	24,2%	22,6%	24,1%	
Revenus confortables (1600 € et plus)	48,3%	70,0%	50,3%	
Situation professionnelle	N = 9811	N = 989	N = 10800	
Sans emploi	7,6%	3,6%	7,2%	< 0,001
Situation familiale				
En couple, pacsé ou marié	44,1%	48,6%	44,5%	0,006
A des enfants à sa charge (à la maison ou ailleurs)	8,8%	9,5%	8,9%	0,484

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Comportements sexuels				
Exclusivement avec des hommes	77,0%	67,9%	76,1%	< 0,001
Orientation sexuelle	N = 9828	N = 990	N = 10818	
Homosexuel	77,6%	71,3%	77,0%	< 0,001
Bisexuel	16,5%	25,6%	17,3%	
Autre orientation sexuelle	6,0%	3,1%	5,7%	
Sentiment d'appartenance				

Communauté LGBTQI	37,5%	41,4%	37,9%	0,040
Dévoilement	N = 9829	N = 990	N = 10819	
Relations sexuelles avec des hommes connus par quelqu'un	83,8%	66,9%	82,2%	< 0,001
Activité sexuelle dans les 12 derniers mois	N = 9827	N = 988	N = 10815	
Actif	97,5%	97,4%	97,5%	0,775
Attirance sexuelle pour les personnes trans	N = 9829	N = 990	N = 10819	
Hommes trans	17,0%	19,8%	17,3%	0,026
Femmes trans	8,1%	6,2%	7,9%	0,035

INTERNET

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Moyenne d'heures d'utilisation d'Internet par semaine	N = 9585	N = 944	N = 10529	
À des fins de relations sociales	12,23 (15,30)	9,77 (11,81)	12,01 (15,03)	< 0,001
	N = 9430	N = 939	N = 10369	
À des fins de rencontres sexuelles	6,84 (11,04)	8,69 (11,20)	7,01 (11,07)	< 0,001
Utilisation d'Internet				
A un compte sur les réseaux sociaux	90,5%	69,2%	88,5%	< 0,001
Utilise les applications mobiles de rencontre	66,4%	36,6%	63,7%	< 0,001

PARTENAIRES OCCASIONNELS MASCULINS

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Partenaires occasionnels masculins dans les 12 derniers mois	N = 9822	N = 987	N = 10809	
Nombre de relations sexuelles	27,11 (56,69)	25,06 (46,12)	26,92 (55,81)	0,272
	N = 9823	N = 986	N = 10809	
Nombre moyen de partenaires	16,21 (35,63)	15,12 (34,36)	16,11 (35,52)	0,360
Nombre de partenaires	N = 9825	N = 986	N = 10811	
4 partenaires et moins	42,1%	40,5%	41,9%	0,013
Entre 5 et 9 partenaires	16,9%	20,9%	17,2%	
Entre 10 et 49 partenaires	33,2%	31,8%	33,1%	
50 partenaires et plus	7,8%	6,8%	7,7%	
	N = 7056	N = 735	N = 7791	
Âge moyen des partenaires	33,43 (10,08)	43,53 (10,42)	34,38 (10,54)	< 0,001
Développer des sentiments, relations affectives ou amicales avec partenaires occasionnels masculins	N = 8677	N = 890	N = 9567	
Jamais	18,3%	15,7%	18,1%	0,072
Rarement	25,7%	24,6%	25,6%	
Régulièrement, parfois à très souvent	56,0%	59,7%	56,3%	
Pratiques sexuelles marginales avec partenaires occasionnels masculins	N = 8651	N = 889	N = 9540	
Au moins une dans les 12 derniers mois	74,0%	84,6%	75,0%	< 0,001
Au moins une parfois à toujours dans les 12 derniers mois	56,6%	71,2%	58,0%	< 0,001
Pénétrations anales non protégées (PANP) avec partenaires occasionnels masculins	N = 6985	N = 594	N = 7579	
Au moins une dans les 12 derniers mois	61,3%	61,6%	61,4%	0,891
Fréquence des PANP avec partenaires occasionnels masculins	N = 6985	N = 594	N = 7579	
Jamais	38,7%	38,4%	38,6%	0,971
Rarement	19,4%	19,2%	19,4%	
Parfois à toujours	41,9%	42,4%	42,0%	

PARTENAIRES OCCASIONNELLES FÉMININES

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Partenaires occasionnelles féminines dans les 12 derniers mois	N = 932	N = 87	N = 1019	
Nombre de femmes cis	4,05 (10,04)	2,95 (4,57)	3,96 (9,70)	0,314

	N = 919	N = 88	N = 1007	
Nombre de femmes trans	1,74 (5,43)	1,81 (4,00)	1,74 (5,32)	0,904
Développer des sentiments, relations affectives ou amicales avec partenaires occasionnelles féminines cis	N = 779	N = 68	N = 847	
Jamais	22,2%	16,2%	21,7%	0,224
Rarement	16,3%	23,5%	16,9%	
Régulièrement, parfois à très souvent	61,5%	60,3%	61,4%	
Développer des sentiments, relations affectives ou amicales avec partenaires occasionnelles féminines trans	N = 389	N = 39	N = 428	
Jamais	54,0%	28,2%	51,6%	0,009
Rarement	12,1%	20,5%	12,9%	
Régulièrement, parfois à très souvent	33,9%	51,3%	35,5%	
Pénétrations non protégées (PNP) avec partenaires occasionnelles féminines cis	N = 777	N = 68	N = 845	
Jamais	40,7%	42,6%	40,8%	0,737
Rarement	10,3%	7,4%	10,1%	
Régulièrement, parfois à toujours	49,0%	50,0%	49,1%	
Pénétrations non protégées (PNP) avec partenaires occasionnelles féminines trans	N = 389	N = 39	N = 428	
Jamais	61,4%	48,7%	60,3%	0,026
Rarement	6,4%	17,9%	7,5%	
Régulièrement, parfois à toujours	32,1%	33,3%	32,2%	

COUPLE

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Développement ou maintien d'une relation stable avec homme ou personne trans dans les 12 derniers mois	N = 9829	N = 990	N = 10819	
Oui	51,8%	39,2%	50,7%	< 0,001
Non	48,2%	60,8%	49,3%	
Pénétration anale ou vaginale sans préservatif avec partenaire stable	N = 4307	N = 276	N = 4583	
Jamais	17,9%	15,9%	17,8%	0,688
Rarement	5,0%	5,4%	5,0%	
Parfois à très souvent	77,1%	78,6%	77,2%	

BAREBACK

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Pratique du barebacking au sein du couple	N = 4965	N = 363	N = 5328	
Oui, exclusivement	41,3%	30,9%	40,6%	< 0,001
Oui, non exclusivement	26,4%	31,4%	26,7%	
Non, ne concerne que partenaires occasionnels	32,3%	37,7%	32,7%	
Risque de transmission VIH avec partenaires occasionnels lors du bareback (séroinconnu, sérodivergent ou ne souhaite pas savoir son statut sérologique)	N = 2792	N = 231	N = 3023	
Aucun risque rapporté	31,7%	28,1%	31,4%	0,267
Au moins un partenaire à risque de transmission	68,3%	71,9%	68,6%	
Barebacking avec partenaire sous PrEP	N = 2793	N = 231	N = 3024	
Jamais	29,4%	32,0%	29,6%	0,016
Au moins rarement	53,0%	44,2%	52,3%	
Non concerné	17,6%	23,8%	18,1%	
Barebacking en contexte de consommation de substances dans les 12 derniers mois	N = 2786	N = 231	N = 3017	
Au moins une fois	33,1%	26,8%	32,6%	0,053

Variables	59 ans et moins	60 ans et plus	Total	Sig.
-----------	-----------------	----------------	-------	------

	(N = 9 830)	(N = 990)	(N = 10 820)	
Fréquentation de sites ou d'applications de rencontre	N = 9829	N = 989	N = 10818	
Régulièrement	66,0%	64,2%	65,8%	0,268
Fréquentation de lieux de rencontre chargés sexuellement (lieux extérieurs, saunas, sexe-clubs, peep-show, clubs échangistes)	N = 9830	N = 989	N = 10819	
Régulièrement	22,3%	34,6%	23,4%	< 0,001

DROGUES

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Consommation de substances dans les 12 derniers mois	N = 9806	N = 988	N = 10794	
Autre que l'alcool	34,9%	14,5%	33,0%	< 0,001
	N = 8497	N = 941	N = 9438	
Autre qu'alcool, cannabis, Poppers ou Viagra	21,4%	7,5%	20,0%	< 0,001
Polyconsommation	N = 3489	N = 153	N = 3642	
Jamais	52,1%	54,9%	52,3%	0,787
Oui	36,3%	34,6%	36,2%	
Non concerné	11,6%	10,5%	11,5%	
Consommation en contexte sexuel	N = 3386	N = 141	N = 3527	
Jamais ou non concerné	65,0%	55,3%	64,6%	0,018
Au moins une fois	35,0%	44,7%	35,4%	
Consommation d'au moins une drogue dure (exclut cannabis, poppers et viagra) en contexte sexuel	N = 3153	N = 122	N = 3275	
Non concerné, jamais ou rarement en contexte sexuel	78,9%	71,3%	78,6%	0,045
Parfois à très souvent en contexte sexuel	21,1%	28,7%	21,4%	
Mode de consommation de substances	N = 2922	N = 129	N = 3051	
Injection	5,3%	10,1%	5,5%	0,021
Autre	94,7%	89,9%	94,5%	
	N = 161	N = 13	N = 174	
Injection de substances dans un cadre sexuel non solitaire	81,4%	92,3%	82,2%	0,321
Impact de la consommation	N = 3402	N = 142	N = 3544	
Au moins un effet positif rapporté	57,7%	59,2%	57,8%	0,736
Au moins un effet négatif rapporté	32,5%	22,5%	32,1%	0,013

TRAVAIL DU SEXE

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Configuration des échanges de faveurs sexuelles, la plupart du temps	N = 1134	N = 101	N = 1235	
Reçoit compensation	49,9%	8,9%	46,6%	< 0,001
Proposait compensation	43,0%	76,2%	45,7%	
Autre arrangement	7,1%	14,9%	7,7%	
Travailleur·euse·s du sexe (12 derniers mois)	N = 549	N = 9	N = 558	
Nombre de partenaires rencontrés dans le cadre de relations sexuelles tarifées	15,60 (45,21)	25,11 (37,64)	15,75 (45,08)	0,530
	N = 485	N = 6	N = 491	
Âge moyen des partenaires, la plupart du temps	43,04 (9,98)	45,83 (16,56)	43,07 (10,07)	0,500
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre de travail du sexe	N = 557	N = 9	N = 566	
Plutôt gays	49,6%	22,2%	49,1%	0,258
Plutôt bisexuels	25,3%	33,3%	25,4%	
Plutôt hétérosexuels	13,6%	33,3%	14,0%	
Ne sait pas	11,5%	11,1%	11,5%	

Développer des sentiments, des relations affectives ou amicales lors des relations sexuelles tarifées	N = 557	N = 9	N = 566	
Jamais	68,4%	66,7%	68,4%	0,762
Rarement	17,1%	11,1%	17,0%	
Régulièrement, parfois à très souvent	14,5%	22,2%	14,7%	
Pénétrations non protégées (PNP) dans le cadre du travail du sexe	N = 422	N = 6	N = 428	
Jamais	44,3%	16,7%	43,9%	0,130
Rarement	13,0%	0,0%	12,9%	
Régulièrement, parfois à toujours	42,7%	83,3%	43,2%	
Pratiques sexuelles différentes d'à l'habitude lors de relations sexuelles tarifées	N = 552	N = 9	N = 561	
Oui	38,9%	22,2%	38,7%	0,497
Non	58,7%	77,8%	59,0%	
Pas de relations sexuelles avec des hommes en-dehors de ce cadre professionnel	2,4%	0,0%	2,3%	
Client·e-s du travail du sexe (12 derniers mois)	N = 483	N = 77	N = 560	
Nombre de partenaires rencontrés dans le cadre de relations sexuelles tarifées	6,82 (20,09)	4,96 (4,80)	6,56 (18,75)	0,420
	N = 447	N = 76	N = 523	
Âge moyen des partenaires, la plupart du temps	27,87 (7,23)	29,70 (6,43)	28,14 (7,15)	0,039
Orientation sexuelle des partenaires dans le cadre de travail du sexe	N = 488	N = 77	N = 565	
Plutôt gays	50,2%	55,8%	51,0%	0,030
Plutôt bisexuels	31,1%	39,0%	32,2%	
Plutôt hétérosexuels	11,7%	3,9%	10,6%	
Ne sait pas	7,0%	1,3%	6,2%	
Développer des sentiments, des relations affectives ou amicales lors des relations sexuelles tarifées	N = 488	N = 77	N = 565	
Jamais	53,5%	32,5%	50,6%	< 0,001
Rarement	22,3%	18,2%	21,8%	
Régulièrement, parfois à très souvent	24,2%	49,4%	27,6%	
Pénétrations non protégées (PNP) dans le cadre du travail du sexe	N = 378	N = 63	N = 441	
Jamais	44,7%	39,7%	44,0%	0,755
Rarement	15,6%	17,5%	15,9%	
Régulièrement, parfois à toujours	39,7%	42,9%	40,1%	
Pratiques sexuelles différentes d'à l'habitude lors de relations sexuelles tarifées	N = 484	N = 77	N = 561	
Oui	24,8%	16,9%	23,7%	0,156
Non	72,7%	77,9%	73,4%	
Pas de relations sexuelles avec des hommes en-dehors de ce cadre professionnel	2,5%	5,2%	2,9%	

SANTÉ SEXUELLE

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Test de dépistage du VIH	N = 9825	N = 989	N = 10814	
Oui, au cours des 12 derniers mois	56,6%	48,2%	55,8%	< 0,001
Oui, il y a plus un an	27,3%	34,7%	27,9%	
Non, jamais	16,1%	17,1%	16,2%	
Nombre de tests VIH effectués dans les 12 derniers mois	N = 9830	N = 990	N = 10820	
Aucun	45,0%	53,9%	45,8%	< 0,001
Un test	20,1%	19,0%	20,0%	
Deux tests	16,4%	16,5%	16,4%	
Trois tests et plus	18,5%	10,6%	17,8%	

	N = 9830	N = 990	N = 10820	
Séropositif au VIH (parmi les testés)	8,9%	17,8%	9,7%	< 0,001
	N = 1616	N = 171	N = 1787	
Statut VIH supposé si aucun test: séropositif ou incertain d'être toujours séronégatif	13,4%	15,2%	13,5%	0,504
Traitement d'urgence post-exposition au VIH dans les 12 derniers mois	N = 9824	N = 990	N = 10814	
Oui	5,1%	1,9%	4,8%	< 0,001
Non, sans situation à risque	63,7%	63,0%	63,6%	
Non, avec situation à risque	16,7%	11,3%	16,2%	
Non concerné	14,5%	23,7%	15,4%	
	N = 880	N = 174	N = 1054	
Traitement antirétroviral VIH	95,5%	97,7%	95,8%	0,176
Dernière charge virale VIH déterminée dans les 12 derniers mois	N = 877	N = 177	N = 1054	
Détectable	3,4%	2,8%	3,3%	0,055
Indétectable	93,5%	97,2%	94,1%	
Ne sait pas	3,1%	0,0%	2,6%	
Test de dépistage VHC	N = 9824	N = 988	N = 10812	
Oui, ces 12 derniers mois	44,3%	35,0%	43,4%	< 0,001
Oui, avant	25,2%	30,4%	25,7%	
Non, jamais	20,8%	25,8%	21,3%	
Ne sait pas	9,7%	8,8%	9,6%	
Diagnostic positif VHC	N = 6893	N = 654	N = 7547	
Oui	4,2%	13,1%	4,9%	< 0,001
Non	93,3%	79,2%	92,1%	
Ne sait pas	2,5%	7,6%	3,0%	
Statut actuel VHC	N = 327	N = 95	N = 422	
Porteur du VHC	14,1%	10,5%	13,3%	0,782
Guéri suite à un traitement	37,6%	37,9%	37,7%	
Guéri sans traitement	28,4%	28,4%	28,4%	
Ne sait pas	19,9%	23,2%	20,6%	
	N = 9812	N = 988	N = 10800	
Au moins une infection sexuellement transmissible (IST, exclut VIH et VHC) au cours des 12 derniers mois	24,5%	24,4%	24,5%	0,940
	N = 9812	N = 988	N = 10800	
Nombre total d'infections sexuellement transmissibles (exclut VIH et VHC) contractées dans les 12 derniers mois	0,54 (1,71)	0,58 (1,42)	0,55 (1,68)	0,475

STRATÉGIES DE RÉDUCTION DES RISQUES

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Préservatif et lubrifiant	N = 9823	N = 990	N = 10813	
Stratégie inconnue	1,1%	1,8%	1,1%	< 0,001
Connue sans être appliquée	10,5%	12,5%	10,7%	
Connue parfois appliquée	21,0%	23,8%	21,2%	
Connue souvent/toujours appliquée	62,8%	54,3%	62,0%	
Non concerné	4,6%	7,5%	4,9%	
Retrait avant éjaculation	N = 9823	N = 990	N = 10813	
Stratégie inconnue	4,5%	4,9%	4,5%	< 0,001
Connue sans être appliquée	28,9%	20,2%	28,1%	
Connue parfois appliquée	29,4%	27,8%	29,3%	
Connue souvent/toujours appliquée	22,3%	26,1%	22,7%	
Non concerné	14,9%	21,0%	15,4%	
Adoption de pratiques à faible risque (ex: masturbation mutuelle, sexe oral, positionnement stratégique, etc.)	N = 9822	N = 988	N = 10810	
Stratégie inconnue	5,0%	5,4%	5,0%	< 0,001
Connue sans être appliquée	21,7%	16,3%	21,2%	
Connue parfois appliquée	28,9%	26,0%	28,6%	
Connue souvent/toujours appliquée	30,6%	37,2%	31,2%	

Non concerné	13,9%	15,1%	14,0%	
Adaptation de l'usage du préservatif aux contextes et lieux de rencontre	N = 9823	N = 990	N = 10813	
Stratégie inconnue	6,1%	4,5%	5,9%	< 0,001
Connue sans être appliquée	13,9%	11,3%	13,7%	
Connue parfois appliquée	13,4%	16,8%	13,7%	
Connue souvent/toujours appliquée	30,4%	40,5%	31,3%	
Non concerné	36,2%	26,9%	35,3%	
Consommation à moindre risque	N = 9824	N = 990	N = 10814	
Stratégie inconnue	8,8%	7,4%	8,6%	< 0,001
Connue sans être appliquée	15,7%	8,9%	15,1%	
Connue parfois appliquée	11,0%	8,0%	10,7%	
Connue souvent/toujours appliquée	17,3%	18,7%	17,4%	
Non concerné	47,3%	57,1%	48,2%	
Réduction du nombre de partenaires	N = 9822	N = 990	N = 10812	
Stratégie inconnue	5,6%	7,4%	5,7%	< 0,001
Connue sans être appliquée	31,6%	23,6%	30,8%	
Connue parfois appliquée	16,5%	16,8%	16,5%	
Connue souvent/toujours appliquée	24,5%	26,2%	24,7%	
Non concerné	21,8%	26,1%	22,2%	
Séropositionnement (positionnement stratégique actif/passif selon risques)	N = 3999	N = 358	N = 4357	
Stratégie inconnue	21,7%	8,9%	20,6%	< 0,001
Connue sans être appliquée	22,5%	19,6%	22,3%	
Connue parfois appliquée	8,3%	12,8%	8,7%	
Connue souvent/toujours appliquée	14,5%	23,5%	15,3%	
Non concerné	33,0%	35,2%	33,2%	
Sécurité négociée (entente après dépistage)	N = 9818	N = 989	N = 10807	
Stratégie inconnue	4,9%	6,1%	5,0%	< 0,001
Connue sans être appliquée	17,4%	16,7%	17,3%	
Connue parfois appliquée	13,4%	12,2%	13,3%	
Connue souvent/toujours appliquée	38,5%	29,9%	37,7%	
Non concerné	25,8%	35,1%	26,7%	
Sérotriage (favoriser situations de séroconvergence et éviter sérodivergence VIH)	N = 9815	N = 989	N = 10804	
Stratégie inconnue	12,6%	11,3%	12,5%	0,012
Connue sans être appliquée	22,9%	19,1%	22,5%	
Connue parfois appliquée	12,1%	12,2%	12,1%	
Connue souvent/toujours appliquée	23,9%	24,4%	24,0%	
Non concerné	28,5%	33,0%	28,9%	
Considération de la charge virale VIH	N = 9818	N = 989	N = 10807	
Stratégie inconnue	18,1%	14,6%	17,8%	< 0,001
Connue sans être appliquée	21,3%	18,1%	21,0%	
Connue parfois appliquée	8,2%	8,5%	8,3%	
Connue souvent/toujours appliquée	12,5%	17,1%	12,9%	
Non concerné	39,9%	41,8%	40,1%	
Prophylaxie pré-exposition (PrEP)	N = 9817	N = 987	N = 10804	
Stratégie inconnue	15,0%	18,3%	15,3%	< 0,001
Connue sans être appliquée	34,8%	24,1%	33,8%	
Connue parfois appliquée	4,4%	3,6%	4,3%	
Connue souvent/toujours appliquée	10,1%	8,9%	10,0%	
Non concerné	35,8%	45,0%	36,6%	

PrEP

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Avez-vous déjà utilisé la PrEP dans votre vie?	N = 7557	N = 646	N = 8203	
Oui	7,9%	2,3%	7,5%	< 0,001
Non	92,1%	97,7%	92,5%	

Schéma de prise de PrEP habituel	N = 606	N = 17	N = 623	
En continu	49,7%	35,3%	49,3%	0,321
Intermittent ou à la demande	48,3%	58,8%	48,6%	
Autre	2,0%	5,9%	2,1%	
Impact PrEP: Utilisation du préservatif	N = 601	N = 17	N = 618	
A beaucoup diminué	41,8%	41,2%	41,7%	0,100
A diminué	28,1%	29,4%	28,2%	
Est restée la même	28,3%	23,5%	28,2%	
A augmenté	1,3%	0,0%	1,3%	
A beaucoup augmenté	0,5%	5,9%	0,6%	
Impact PrEP: Fréquence de dépistage du VIH	N = 601	N = 17	N = 618	
A beaucoup diminué	1,7%	0,0%	1,6%	< 0,001
A diminué	1,8%	23,5%	2,4%	
Est restée la même	29,1%	23,5%	29,0%	
A augmenté	33,1%	23,5%	32,8%	
A beaucoup augmenté	34,3%	29,4%	34,1%	
Impact PrEP: Qualité de vie en général	N = 599	N = 17	N = 616	
Beaucoup moins bonne	0,5%	0,0%	0,5%	0,059
Moins bonne	2,7%	0,0%	2,6%	
La même	62,6%	35,3%	61,9%	
Meilleure	21,2%	29,4%	21,4%	
Bien meilleure	13,0%	35,3%	13,6%	
Impact PrEP: Qualité de vie sexuelle	N = 598	N = 17	N = 615	
Beaucoup moins bonne	0,2%	0,0%	0,2%	0,433
Moins bonne	1,7%	0,0%	1,6%	
La même	23,9%	29,4%	24,1%	
Meilleure	38,6%	17,6%	38,0%	
Bien meilleure	35,6%	52,9%	36,1%	

PSYCHOSOCIAL

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Satisfaction globale de votre apparence physique	N = 9814	N = 985	N = 10799	
Oui	65,3%	70,1%	65,7%	0,003
Non	34,7%	29,9%	34,3%	
Apparence physique ou image corporelle dépréciée	N = 9823	N = 989	N = 10812	
Oui	36,3%	31,9%	35,9%	0,005
Non	63,7%	68,1%	64,1%	
Injurié en raison de l'orientation sexuelle dans les 12 derniers mois	N = 9818	N = 988	N = 10806	
Oui	25,2%	8,8%	23,7%	< 0,001
Non	74,8%	91,2%	76,3%	
Agressé en raison de l'orientation sexuelle dans les 12 derniers mois	N = 9812	N = 988	N = 10800	
Oui	3,2%	1,1%	3,0%	< 0,001
Non	96,8%	98,9%	97,0%	
Déprimé dans les 12 derniers mois	N = 9815	N = 988	N = 10803	
En désaccord	42,3%	62,2%	44,1%	< 0,001
Ni en accord, ni en désaccord	15,5%	18,2%	15,8%	
En accord	42,2%	19,5%	40,1%	
Idées suicidaires dans les 12 derniers mois	N = 9812	N = 986	N = 10798	
En désaccord	74,9%	81,3%	75,5%	< 0,001
Ni en accord, ni en désaccord	10,5%	10,5%	10,5%	
En accord	14,6%	8,1%	14,0%	
S'est senti seul dans les 12 derniers mois	N = 9813	N = 988	N = 10801	
En désaccord	43,2%	58,8%	44,7%	< 0,001
Ni en accord, ni en désaccord	14,0%	13,9%	14,0%	
En accord	42,8%	27,3%	41,3%	
Aime faire face à des défis, de façon générale	N = 9815	N = 989	N = 10804	

En désaccord	15,2%	15,1%	15,2%	0,001
Ni en accord, ni en désaccord	24,3%	29,7%	24,8%	
En accord	60,5%	55,2%	60,0%	
Recherche les sensations fortes, de façon générale	N = 9814	N = 988	N = 10802	
En désaccord	27,5%	22,9%	27,1%	0,003
Ni en accord, ni en désaccord	30,5%	30,6%	30,5%	
En accord	42,1%	46,6%	42,5%	
Prend des risques dans la vie, de façon générale	N = 9815	N = 989	N = 10804	
En désaccord	34,9%	33,8%	34,8%	0,243
Ni en accord, ni en désaccord	31,7%	34,3%	31,9%	
En accord	33,5%	32,0%	33,3%	
Satisfait de sa vie sexuelle	N = 9808	N = 985	N = 10793	
Non, peu ou pas satisfait	29,5%	26,2%	29,2%	0,029
Oui, assez ou très satisfait	70,5%	73,8%	70,8%	

DISCRIMINATIONS

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
Discrimination, à quelque part, dans les 12 derniers mois, sur la base de...	N = 9815	N = 988	N = 10803	
Orientation sexuelle	25,9%	8,8%	24,3%	< 0,001
	N = 9813	N = 988	N = 10801	
Identité de genre	3,3%	1,6%	3,1%	0,004
	N = 9813	N = 987	N = 10800	
"Manières"	15,0%	3,3%	13,9%	< 0,001
	N = 9812	N = 988	N = 10800	
Statut sérologique VIH	4,8%	5,0%	4,8%	0,812
	N = 9809	N = 988	N = 10797	
Travail du sexe	1,7%	0,5%	1,6%	0,005
	N = 9809	N = 988	N = 10797	
Origine ethnoculturelle	6,2%	2,6%	5,9%	< 0,001
	N = 9813	N = 987	N = 10800	
Apparence physique	27,7%	19,8%	27,0%	< 0,001
	N = 9814	N = 987	N = 10801	
Surpoids	19,1%	18,9%	19,1%	0,922
	N = 9808	N = 986	N = 10794	
Âge	28,0%	57,7%	30,7%	< 0,001
	N = 9812	N = 987	N = 10799	
Classe sociale	7,8%	5,5%	7,6%	0,008
	N = 9814	N = 987	N = 10801	
Religion ou croyances	3,4%	1,4%	3,2%	0,001
	N = 9797	N = 982	N = 10779	
Indice du nombre d'objets de discriminations différents ressentis	1,43 (1,62)	1,24 (1,32)	1,41 (1,60)	0,110
Lieux de discriminations dans les 12 derniers mois	N = 9816	N = 989	N = 10805	
S'est senti discriminé au moins une fois à l'école	13,6%	3,7%	12,7%	< 0,001
S'est senti discriminé au moins une fois au travail	15,2%	6,0%	14,3%	< 0,001
S'est senti discriminé au moins une fois dans son quartier	9,0%	5,0%	8,6%	< 0,001
S'est senti discriminé au moins une fois dans le milieu gay	30,0%	38,6%	30,7%	< 0,001
S'est senti discriminé au moins une fois sur Internet	33,4%	35,1%	33,6%	0,298
S'est senti discriminé au moins une fois dans l'espace public	23,9%	12,1%	22,8%	< 0,001
Ne s'est pas senti discriminé à quelque part	41,2%	37,1%	40,8%	0,012
	N = 9808	N = 987	N = 10795	
Indice du nombre de lieux différents où la discrimination a été ressentie	1,66 (1,10)	1,38 (0,73)	1,64 (1,07)	< 0,001

PARCOURS DE TRANSITION

Variables	59 ans et moins (N = 9 830)	60 ans et plus (N = 990)	Total (N = 10 820)	Sig.
	N = 436	N = 39	N = 475	
Se présente dans genre souhaité: en toutes circonstances	41,5%	30,8%	40,6%	0,191
	N = 412	N = 37	N = 449	
Engagé-e dans parcours / processus de transition	30,8%	5,4%	28,7%	0,001
	N = 436	N = 39	N = 475	
Prend hormones actuellement	23,2%	10,3%	22,1%	0,063
	N = 436	N = 39	N = 475	
A subi au moins une chirurgie dans le cadre de la transition	15,1%	5,1%	14,3%	0,087
	N = 55	N = 8	N = 63	
Démarche diagnostique de transsexualisme ou de trouble de l'identité de genre chez un médecin psychiatre	50,9%	50,0%	50,8%	0,962
Comment avez-vous vécu l'ensemble de votre parcours médical et psychologique de transition?	N = 51	N = 8	N = 59	
Très bien	9,8%	25,0%	11,9%	0,596
Plutôt bien	51,0%	37,5%	49,2%	
Assez mal	19,6%	25,0%	20,3%	
Très mal	19,6%	12,5%	18,6%	